

М. Э. ОГАНЕСЯН

М. Э. ОГАНЕСЯН

РОД *ANISANTHA* К. КОХ В АРМЕНИИ

Приводится конспект рода *Anisantha* в Армении. Установлено, что в регионе род представлен 3 видами. Вид *A. rubens* (L.) Nevski приводится впервые для Южного Закавказья (Армении и Нахичевана).

Նվիաննիսյան Մ. Է. *Anisantha* К. Koch ցեղը Հայաստանում: Բերվում է *Anisantha* ցեղի կոնսպեկտը Հայաստանում: Հասարակված է, որ փարածրում ցեղը ներկայացված է 3 տեսակով: *A. rubens* (L.) Nevski տեսակը Հարավային Անտրոպոկլիպսի (Հայաստանի եւ Նախիջևանի) համար բերվում է առաջին անգամ:

Oganesian M. E. Genus *Anisantha* K. Koch in Armenia. The checklist of the genus *Anisantha* in Armenia is given. In the region the genus is represented by 3 species. *A. rubens* (L.) Nevski is reported for the first time from Southern Transcaucasia (Armenia and Nakhichevan).

Род обработан для 11 тома "Флоры Армении" и приводится в форме, принятой в этом издании. Изучен материал гербариев ERE, LE, TBI и TGM.

Anisantha K. Koch 1848, Linnaea 21: 394

1. *A. tectorum* (L.) Nevski 1934, Тр. Среднеаз. унив. сер. 8в, 17: 22. – *Bromus tectorum* L. 1753, Sp. Pl.: 77. – *Zerna tectorum* (L.) Lindm. 1918, Svensk. Fanerogamfl.: 101. – *Anisantha pontica* K. Koch 1848, Linnaea 21: 394.

От предгорий до субальпийского пояса, на высоте 400–2600 м над ур. м. На каменистых склонах, песках, осыпях, скалах, лугах, в полевой полупустыне, фриганоидах, горной степи, редколесьях, обычно в сорных местообитаниях. Цв. IV–VII. Пл. (IV) V–VIII (IX). – Все районы.

Кавказ (все р-ны), Европа, Азия (кроме Южн.), Сев. Африка. Описан из Европы [lecto (Smith 1985, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 42: 500): Hb. Linn. 93/25].

2. *A. rubens* (L.) Nevski 1934, Тр. Среднеаз. унив. сер. 8в, 17: 19. – *Bromus rubens* L. 1755, Cent. Pl. 1: 5. – *Zerna rubens* (L.) Grossh. 1939, Фл. Кавк. 2, 1: 306.

В предгорьях, на высоте 500–600 м над ур. м. На каменистых и мелкоземистых склонах, песках, галечниках, осыпях, часто как сорное. Цв. IV–V. Пл. V–VI. – Мегри. (между гор. Мегри и с. Карчеван)

Кавказ [Вост. Кавк. (Каспийское побереж.), Вост. и Южн. (включая Нахичеван) Закавказья], Южн. Европа, Зап. и Ср. Азия, Сев. Африка. Описан из Испании [neo (Smith 1985, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 42: 500): Loefling 84 (Hb. Linn. 39/28)].

Впервые приводится для флоры Армении: "Мегринский р-н, берег р. Аракс между г. Мегри и с. Карчеван, 4.05.1967, Э. Габриэлян, П. Гамбарян", ERE 152866! По р. Аракс распространен и выше в Нахичеване: "Нахичеванский край. Неграм. 25.05.1919", колл. неизв., TGM 52094! Для Нахичевана также публикуется впервые.

3. *A. sterilis* (L.) Nevski 1934, Тр. Среднеаз. унив. сер. 8в, 17: 20. – *Bromus sterilis* L. 1753, Sp. Pl.: 77. – *Zerna sterilis* (L.) Panz. 1814, Denkschr. Akad. Wiss. München 4: 309. – *Bromus amplus* K. Koch 1848, Linnaea 21: 418.

От предгорий до верхнего горного пояса, на высоте 700–2300 м над ур. м. В ущельях, шибляке, лесах, на сухих склонах, как сорное у дорог, в полях и садах. Цв. V–VI. Пл. VI–VII. – Иджев., Апар., Ерев., Дар., Занг., Мегри.

Кавказ (все р-ны, кроме Вост. Предкавказья) и Юго-зап. Закавказья, Европа, Зап. и Ср. Азия, Сев. Африка. Описан из Испании [lecto (Smith 1985, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 42: 500): Loefling 82 (Hb. Linn. 93/19)].

Таким образом, установлено, что в Армении род представлен 3 видами. Вид *A. rubens* (L.) Nevski приводится впервые для Южного Закавказья (Армении и Нахичевана).

Работа выполнена при поддержке гранта NFSAT BO 063-02 / CRDF 12013.

Институт ботаники НАН РА, Ереван, 375063,
e-mail: m_ogan02@yahoo.com

РОД *BROMUS* L. s. str. В АРМЕНИИ

Приводится конспект рода *Bromus* L. s. str. в Армении. Установлено, что в регионе род представлен 9 видами. Вид *B. lanceolatus* Roth исключен из флоры Южного Закавказья (Армении и Нахичевана), а южнозакавказские образцы, ранее определяемые как *B. lanceolatus*, отнесены к виду *B. pseudodanthoniae* Drobow.

Նվիաննիսյան Մ. Է. *Bromus* L. s. str. ցեղը Հայաստանում: Բերվում է *Bromus* L. s. str. ցեղի կոնսպեկտը Հայաստանում: Հասարակված է, որ փարածրում ցեղը ներկայացված է 9 տեսակով: *B. lanceolatus* Roth տեսակը Հարավային Անտրոպոկլիպսում (Հայաստանում եւ Նախիջևանում) չի աճում, իսկ նախկինում որպես *B. lanceolatus* որոշված Հարավանտրոպոկլիպսային նմուշները պարկանում են *B. pseudodanthoniae* տեսակին:

Oganesian M. E. Genus *Bromus* L. s. str. in Armenia. The checklist of the genus *Bromus* L. s. str. in Armenia is given. In the region the genus is represented by 9 species. *B. lanceolatus* Roth is excluded from the flora of Southern Transcaucasia (Armenia and Nakhichevan) and the S. Transcaucasian specimens previously determined as *B. lanceolatus* are treated as *B. pseudodanthoniae* Drobow.

Род обработан для 11 тома "Флоры Армении" и представлен в форме, принятой в этом издании. Изучен материал гербариев ERE, LE, TBI и TGM.

Bromus L. 1753, Sp. Pl.: 76; idem, 1754,
Gen. Pl. ed. 5: 33; s. str.

1. *B. arvensis* L. 1753, Sp. Pl.: 77.

В предгорьях и нижнем горном поясе, на высоте 600–1000 м над ур. м. В качестве сорного на увлажненных, заболоченных местах, на прибрежных песках. Цв. VI. Пл. VII. – Ерев.

Кавказ (все р-ны), Европа, Вост. и Южн. Анатолия, Сев., Ср. (заносн.) и Вост. Азия, Сев. Америка. Описан из Европы: "in Europa" [lecto (Smith 1985, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 42: 499): Hb. Linn. 93/21].

2. *B. commutatus* Schrad. 1806, Fl. Germ. 1: 353. – *B. racemosus* L. subsp. *commutatus* (Schrad.) Maire & Weiller 1955, in Maire, Fl. Afr. Nord. 3: 246.

От предгорий до среднего горного пояса, на высоте 600–1700 (2000) м над ур. м. В лесах, на опушках, на лугах, в шибляке. Цв. VI–VII. Пл. VII–VIII. – ?Шир., Иджев., Апар. (с. Цилкар), Занг. (с. Гехи). Рассеянно.

Кавказ (все р-ны, кроме Предкавказья), Юго-зап. Закавказья и Нахичеван, Европа, Зап. и Ср. Азия, Сев. Африка, Кипр. Описан из Германии: "inter segetes, ad vias, sepes", Schrader.

3. *B. mollis* L. 1762, Sp. Pl. ed. 2: 112. – *B. hordaceus* L. 1753, Sp. Pl.: 77, p. p., excl. typo. – *B. hordaceus* subsp. *mollis* (L.) Nylander 1945, Uppsala Univ. Arsskr. 1945: 84.

В среднем горном поясе, на высоте 1100–1500 м над ур. м. На лугах, в кустарниках, лесах, часто в качестве сорного. Цв. (VI) VII. Пл. VIII. – Лори. (Лорийский совхоз), Иджев. (Сисимадан, с. Качачкут, гор. Дилижан).

Кавказ [Зап. и Вост. Предкавказья, Вост. Кавказ, Сев.-зап., Зап., Центр., Вост. (восток) и Южн. (север) Закавказья, Талыш], Европа, Зап. Азия, Сев. Африка. Занесен во многие внетропические страны. Описан из Южной Европы: "Habitat in Europae australioris siccis".

4. *B. japonicus* Thunb. 1784, in Murr., Syst. Veg. ed. 14: 119.

a. subsp. *japonicus*. – *B. patulus* Mert. & W. D. J. Koch 1823, in Roehl., Deutschl. Fl. 1: 685. – *B. phrygius* Boiss. 1859, Diagn. Pl. Or. ser. 2 (4): 140.