С. Н. Авакян

Получение смешанных диаминовых соединений хлорида кадмия*

Смешанные диаминовые соединения галогенидов кадмия описаны очень мало. Поэтому объектом настоящего исследования мы выбрали смешанные пиридинанилиновые и пиридиндиметиланилиновые комплексные соединения хлорида кадмия, поскольку в настоящее время в литературе описаны только пиридиновые [1] и анилиновые [2], но не смешанные пиридинанилиновые соединения.

Метод получения смешанных диаминовых соединений кадмия разработан нами при изучении кривых нагревания дипиридингалогенидов кадмия [3], снятых пирометром Курнакова. Оказалось, что дипиридинхлорид кадмия при нагревании подвергается ступенчатой диссоциации с образованием монопиридинового соединения [4]. Наши исследования показали, что монопиридинхлорид кадмия является как бы ненасыщенным соединением и способен присоединять молекулу амина (аммиак, анилин, 1-диметиламино-2-бутин и т. д.).

Действуя на монопиридинхлорид кадмия избытком анилина и диметиланилина, мы получили смешанные пиридинанилиновые и пиридиндиметиланилиновые комплексные соединения хлорида кадмия. Комплексные соединения галогенидов кадмия используются в органической химии как катализаторы [5]. Получение новых комплексных соединений кадмия представляет, как нам кажется, также и научный интерес.

Экспериментальная часть

Получение пиридинанилинового соединения хлорида кадмия.
Взято 3,5 г чистой сухой соли монопиридинхлорида кадмия [4], к ней при комнатной температуре (20°) прибавлен в небольшом избытке против эквимолекулярного количества спиртовой раствор анилина. Реакционная смесь непрерывно перемешивалась. После двухдневного стояния вещество высушено до постоянного веса в сушильном шкафу при 50°. Полученное соединение представляет собой белое блестящее мелкоигольчатое кристаллическое вещество, плохо растворяющееся в холодной воде, спирте, толуоле и феноле. По внешнему виду и физико-химическим свойствам оно отличается от монопиридинхлорида кадмия.

* Доложено на восьмом совещании по химии комплексных соединений в г. Кневе.

Найдено %: Cd 31,48; Cl 19,74; N 8,04
 $\text{CdCl}_2(\text{C}_5\text{H}_5\text{N}) \cdot (\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2)$. Вычислено %: Cd 31,61; Cl 19,94; N 7,87.

Данные анализов подтверждают, что полученное соединение имеет состав, отвечающий простейшей формуле $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2)\text{Cl}_2$.

Таким образом, нам удалось впервые получить смешанное анилинпиридиновое соединение хлорида кадмия.

Реакцию образования смешанного анилинпиридинового соединения можно выразить следующим уравнением:

Кристаллооптические свойства. Чтобы судить о веществе, отвечающем составу $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2)\text{Cl}_2$, были изучены его кристаллооптические свойства и определены показатели преломления. Получены следующие результаты: под микроскопом кристаллы однородны и имеют игольчатую форму; показатели преломления $n_g = 1,768$, $n_p = 1,625$.

Эти данные подтверждают, что полученное вещество является индивидуальным химическим соединением.

Определение плотности. Плотность кристаллов $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2)\text{Cl}_2$ определялась пикнометрическим способом по толуолу при 25° , $d = 2,06 \text{ г/см}^3$. Из полученного нами значения плотности кристаллов следует, что $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2)\text{Cl}_2$ имеет меньшую плотность, чем плотность исходного $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})\text{Cl}_2$ ($d = 2,33 \text{ г/см}^3$). Молярный объем $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2)\text{Cl}_2$ ($172,60 \text{ см}^3$), напротив, больше ($112,62 \text{ см}^3$).

Молекулярная рефракция. Из значений показателей преломления и величины плотности кристаллов была вычислена молекулярная рефракция для $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2)\text{Cl}_2$.

Так как измерить третий показатель преломления не оказалось возможным, то при вычислении рефракции вместо n_m было взято среднее арифметическое величин n_g и n_p . Вычисленная таким образом молекулярная рефракция $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2)\text{Cl}_2$ для линии Na_D оказалась равной $66,12 \text{ см}^3$. Результаты определения молекулярной электропроводности: $v = 2000 \text{ л/мол}$, $\tau = 10 \text{ минут}$, $\mu = 253 \text{ ом}^{-1} \cdot \text{см}^2$.

Термографическое исследование. Приведенная на рисунке 1 кривая нагревания $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2)\text{Cl}_2$ характеризуется пятью эндотермическими эффектами при 195 , 240 , 292 , 338 и 370° .

Для выяснения процессов, отвечающих этим эффектам, нами проводился ступенчатый нагрев соли с последующими ее взвешиваниями. Как показали определения потерь в весе (табл. 1), при нагревании до 245° монопиридинанилинхлорид кадмия теряет одну молекулу анилина. Химический анализ полученного продукта дал следующие результаты.

Найдено %: Cd 42,65; Cl 26,86; N 5,57
 $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})\text{Cl}_2$. Вычислено %: Cd 42,83; Cl 27,03; N 5,34.

Таким образом, первый и второй эффекты на кривой нагревания $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2)\text{Cl}_2$ при 195 и 240° соответствуют процессу отщепления одной молекулы анилина с образованием монопиридинхлорида кадмия по уравнению:

Рис. 1. Кривая нагревания $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2)\text{Cl}_2$.

Таблица 1

№ п/п	Навеска образца в г	Потери в весе				Примечание
		г	вес. %	моли анилина	моли пиридина	
1	0,1887	0,0491	26,0	1,0	—	после 2-го эффекта на кривой нагрев. (245°)
1	0,1887	0,0911	48,3	1,0	1,0	после эффекта на кривой нагрев. (370°)
2	0,1486	0,0391	26,3	1,0	—	после 2-го эффекта на кривой нагрев. (245°)
2	0,1486	0,0715	48,1	1,0	1,0	после эффекта на кривой нагрев. (370°)

Повторное нагревание получившегося продукта дало кривую нагревания, на которой отсутствовали два первых термических эффекта (195, 240°), соответствующих разложению пиридинанилинового соединения. Это показывает, что на первой и второй ступени разложения $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2)\text{Cl}_2$ анилин удаляется полностью.

Последние три эффекта связаны с потерей пиридина. Каждому эффекту отвечает удаление части пиридина.

После нагревания $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2)\text{Cl}_2$ до 370° остается только CdCl_2 , что подтверждается химическим анализом и хорошей растворимостью в воде.

Следовательно, при третьем, четвертом и пятом эффектах (292, 338 и 370°), как видно из кривых нагревания, отщепляется и удаляется из соли одна молекула пиридина. Соединение $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2)\text{Cl}_2$ разлагается не плавясь. Полученное соединение можно выразить следующей координационной структурой:

Получение пиридиндиметиланилиновых соединений хлорида кадмия. Монопиридиндиметиланилинхлорид кадмия получается точно таким же способом, как описанный выше монопиридинмоноанилинхлорид кадмия. Для получения $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})[(\text{CH}_3)_2\text{NC}_6\text{H}_5]\text{Cl}_2$ в качестве исходного вещества взято 1,2 г чистой соли $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})\text{Cl}_2$ и к ней, как и в случае синтеза смешанного анилинпиридинового хлорида кадмия, при комнатной температуре прибавлен в небольшом избытке против эквимолекулярного количества спиртовый раствор диметиланилина. Реакционная смесь перемешана стеклянной палочкой. После двухдневного стояния полученный продукт высушен до постоянного веса в сушильном шкафу при 35°.

Полученное соединение представляет собой бледно-зеленое мелкоигольчатое кристаллическое вещество, плохо растворимое в холодной воде и толуоле. По внешнему виду и физико-химическим свойствам оно отличается от исходного монопиридинового соединения.

Для определения его состава произведен анализ на содержание в нем кадмия, хлора и азота.

Найдено %: Cd 29,50; Cl 18,25; N 7,12
 $\text{CdCl}_2(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})[(\text{CH}_3)_2\text{NC}_6\text{H}_5]$. Вычислено %: Cd 29,33; Cl 18,49; N 7,3.

Данные анализов подтверждают, что полученное вещество имеет состав, отвечающий простейшей формуле $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})[(\text{CH}_3)_2\text{NC}_6\text{H}_5]\text{Cl}_2$.

Реакцию образования смешанного анилинпиридинового соединения можно выразить следующим уравнением:

Кривая нагревания комплексного соединения монопиридинмонодиметиланилинхлорида кадмия приведена на рисунке 2; она характеризуется четырьмя эндотермическими эффектами при 85, 293, 340 и 362°.

Первый эффект при 85° соответствует процессу отщепления одной молекулы диметиланилина. Как показало исследование, последние три эффекта, при 293, 340 и 362°, связаны с потерей пиридина. После нагревания $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})[(\text{CH}_3)_2\text{NC}_6\text{H}_5]\text{Cl}_2$ до 362° остается только CdCl_2 .

При нагревании монопиридинмонодиметиланилинхлорид кадмия разлагается с выделением диметиланилина с образованием исходного монопиридинхлорида кадмия: $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})[(\text{CH}_3)_2\text{NC}_6\text{H}_5]\text{Cl}_2 = \text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})\text{Cl}_2 + (\text{CH}_3)_2\text{NC}_6\text{H}_5$.

Плотность кристаллов $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})[(\text{CH}_3)_2\text{NC}_6\text{H}_5]\text{Cl}_2$ определена пикнометрически по толуолу при 20° , $d=1,91 \text{ г/см}^3$. Исходя из значения плотности, рассчитан молярный объем, равный $200,84 \text{ см}^3$.

Рис. 2. Кривая нагревания $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})[(\text{CH}_3)_2\text{NC}_6\text{H}_5]\text{Cl}_2$.

Изучение электропроводности $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})[(\text{CH}_3)_2\text{NC}_6\text{H}_5]\text{Cl}_2$ показало, что соединение в водном растворе распадается на три иона. Результаты определения молекулярной электропроводности: $\nu=1500 \text{ л/мол}$, $\tau=10 \text{ минут}$, $\mu=248 \text{ ом}^{-1} \cdot \text{см}^2$.

Выводы

1. В результате взаимодействия монопиридинхлорида кадмия с анилином и диметиланилином получают новые смешанные аминовые соединения хлорида кадмия: $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})[(\text{CH}_3)_2\text{NC}_6\text{H}_5]\text{Cl}_2$ и $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2)\text{Cl}_2$.

2. Определены некоторые физико-химические константы полученных соединений: показатели преломления, плотность кристаллов, молекулярная электропроводность, молярный объем.

3. Термографические исследования показали, что: а) полученные соединения при нагревании разлагаются ступенчато, б) благодаря ступенчатому разложению $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2)\text{Cl}_2$ и $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})[(\text{CH}_3)_2\text{NC}_6\text{H}_5]\text{Cl}_2$ в качестве промежуточного соединения получается монопиридинхлорид кадмия. Следовательно, в соединениях пиридин термически более прочно соединен с кадмием, чем анилин, а анилин прочнее, чем диметиланилин.

4. Как следует из данных молекулярной электропроводности, оба исследованных соединения в воде распадаются на три иона.

Ս. Ն. Յ. վազյան

ԿԱԴՄԻՏՈՒՄԻ ՔԼՈՐԻԴԻ ԽԱՌԸ ԳԻԱՄԻՆԱՑԻՆ
ՄԻԱՑՈՒՅՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Ինչպես հայտնի է գրականությունից, դեռևս չեն ստացվել ու ուսումնասիրվել կադմիումի քլորիդի խառը պիրիդին-անիլինային և պիրիդին-դիմեթիլանիլինային կոմպլեքսային միացությունները: Այդ պատճառով էլ մենք ստացել և ուսումնասիրել ենք համապատասխան՝ $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2)\text{Cl}_2$ և $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})[(\text{CH}_3)_2\text{NC}_6\text{H}_5]\text{Cl}_2$ կոմպլեքսային միացությունները:

Վերոհիշյալ միացությունների համար որոշված են՝ բյուրեղների խտությունը, մոլեկուլային էլեկտրահաղորդականությունը, հաշված է մոլյար ծավալը ու ռեֆրակցիան, շրջառոտ են բերված տաքացման կորերը:

Թերմիկ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ երկու միացություններն էլ դիսոցվում են աստիճանականորեն առանց հալվելու: Շնորհիվ $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2)\text{Cl}_2$ և $\text{Cd}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})[(\text{CH}_3)_2\text{NC}_6\text{H}_5]\text{Cl}_2$ աստիճանական՝ դիսոցման. որպես միջանկյալ պրոդուկտ ստացվում է կադմիումի քլորիդի մոնոպիրիդինային միացությունը: Հետևաբար նշված միացություններում պիրիդինը կադմիումի հետ ավելի ամուր է կապված, քան անիլինը և դիմեթիլանիլինը:

Մոլյար էլեկտրահաղորդականության տվյալները ցույց են տալիս, որ նրանք ջրային միջավայրում տրոհվում են երեք իոնի:

ЛИТЕРАТУРА

1. H. M. Schiff, *С.* т. 56, 269 (1863).
2. W. Lang, *Ber.* 21, 1584 (1888).
3. В. В. Лебединский, И. С. Рассонская, С. Н. Авакян, *ДАН СССР* 94, 245 (1954).
4. В. В. Лебединский, С. Н. Авакян, *Изв. АН АрмССР, ХН* 11, 321 (1958).
5. S. Reddelien, *Lieb. Ann.* 388, 196 (1912).