

ԿԵՐԻ ԱՐՏԱԳՐԱԿՆԵՐԻ ԿՐՈՇ ՀԱՐՑՆԵՐԸ

Հ. Գ. Կուրդիմյան

ՑԱՆՔԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵԳԻՊՏԱՑՈՐՆԵՐԻ
ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Պարտիան ու կառավարությունը մեծ նշանակություն են տալիս եգիպտացորենի մշակությանը, որպես հատիկային, հատիկափութաժային և սիլոսային կուլտուրայի:

Ընկ. Խրուշչևը 1955 թ. ՄԽԿՊ Հունվարյան պլենումում խնդիր զրկեց՝ բնդարձակել եգիպտացորենի ցանքային տարածությունները և պատշաճ վերաբերմունք ունենալ այդ կուլտուրայի հանդեպ:

Մեր սեպտեմբրիկայում եգիպտացորենը մշակվում է ջրովի և անջրովի պայմաններում: Ջրովի շրջաններում այն մշակվում է ինչպես գարնանա-ցան, նույնպես և խոզանացան, իսկ խոնավ անտառային շրջաններում ան-ջրգի պայմաններում միայն գարնանացան:

Եգիպտացորենի բերքատվությունը բարձրացման համար մեծ նշանա-կություն ունի ցանքի ճիշտ ժամանակի որոշումն ըստ զոնաների և շրջանների:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Նպատակ ունենալով որոշել եգիպտացորենի ցանքի ճիշտ ժամանակը սեպտեմբրիկայի տարբեր շրջաններում, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 և 1954 թվականներին տարբեր ժամկետներում ցանք կատարեցինք սեպտեմբրիկայի ցածրագի՝ Արարատյան հարթավայրում, 1954 թ. խոնավ անտառային՝ Այսովերգու շրջանի Այգեհատ գյուղի կոլտնտեսության հոգամասում:

1944—1946 թվականներին Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հախկին երկրագործության ինտիտուտի՝ Կարմիր-Բյուրի փորձադաշտում փորձերը կատարվել են 2—4 ժամկետներում, յուրաքանչյուր ժամկետում 4 կրկնողու-թյամբ: Ամեն մի մարդի տարածությունը եղել է 100 քմ: Յանքը կատարվել է ձևաքով, շարքը շարքից 70, բույսը բույսից 40 սմ հեռավորությամբ: Յուրաքանչյուր բնում ցանվել է 3—4 սերմ, հետագայում կատարվել է նոսրացում և թողնվել է 2 բույս: Հատիկը ցանվել է 3—8 սմ խորությամբ:

1947 թվականին Արաաշատի շրջանի Այգեհատի գյուղում ցանքը կատարվել է 2 ժամկետով, 4 կրկնողությամբ, յուրաքանչյուր մարդի մեծու-թյունը 100 քմ, շարքը շարքից 70, բույսը բույսից 40 սմ հեռավորու-թյան վրա, ամեն մի բնում նոսրացվելուց հետո թողնվել է 2 սերմ, հա-տիկների խորությունը 8—10 սմ:

1948 թվականին Մխչյան գյուղում փորձերը զրվել են հուլյն մեթոդի-կայով ինչ և Այգեհատի գյուղում, այստեղ ցանքը կատարվել է 5 ժամ-

կետներում՝ ապրիլի 25-ին, մայիսի 15-ին, հունիսի 5-ին, հունիսի 16-ին և հուլիսի 3-ին: Յանքը կատարվել է առաջին ժամկետից հետո ամիսը մեկ անգամ, բացի 1948 թվականից, երբ ջանքը կատարվել է 20 օրը մեկ անգամ, որպեսզի եզրպտացորեն ուսումնասիրվեր նաև խողանացանի պայմաններում:

Արավերդու շրջանի Այգեհատ գյուղում ջանքը կատարվել է 2 ժամկետում՝ մայիսի 10-ին և 20-ին, Յուրաքանչյուր մարզի մեծությունը 50 քմ, 4 կրկնություն, ջանքը կատարված է քառակուսի բնային եղանակով, շարքը շարքից, բունը բնից 70 սմ (70×70) հեռավորության վրա: Փորձառոգամասը քառակուսիների է բաժանվել տրակտորի կուլտիվատորի միջոցով: Յանքը կատարվել է ձեռքով, հատիկների խորությունը հողում եղել է 6—8 սմ: Հետագայում միջառքային տարածությունները մշակվել են ձեռքով:

1944, 1945, 1946, 1947 և 1948 թվականների տվյալներն ունեն համարյա նույն պատկերը, ուստի բերում ենք միայն 1948 թ. տվյալները:

Եզրպտացորենի կուլտուրան որպես խողանացան մեկը ջանել ենք Արատյան դաշտավայրում 1944—45 թթ. Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի նախկին Երկրագործություն ինստիտուտի փորձնակախի հողամասում (Կարմիր-Բլուր), իսկ 1948 թվականին՝ Արտաշատի շրջանի Միսյան գյուղում: Յանքերը կատարել ենք աշանացան ցորենի բերքահավաքից հետո հուլիսի 3-ին (1948 թ.), հուլիսի 7 ու 31-ին (1945 թ.) և հուլիսի 15-ին (1944 թ.):

Յանքը կատարել ենք (ջրովի հողամասում) 1944 և 1948 թթ. մեկ ժամկետով, 1945 թ.՝ 2 ժամկետով: Յուրաքանչյուր մարզի մեծությունը եղել է 50 քմ, մարդում ջանել ենք 4 շարք, շարքը շարքից 70 սմ, բունը բնից 30 սմ հեռավորության վրա: Հատիկների խորությունը 8—10 սմ: Յուրաքանչյուր բնում նոսրացումից հետո թողել ենք 2 բույս: Վեգետացիայի ընթացքում տվել ենք 2 ջուր, կատարել ենք մեկ բուկից և ձեռքի հողորոգներով 2 անգամ քաղհան: Կանաչ մասսայի հաշվառումը կատարել ենք հոբանների 10 տոկոսը երեւալու ժամանակ:

ՓՈՐՁԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Խնչակա դրականություն, այնպես էլ մեր փորձերը ցույց տվեցին, որ օպտիմալ ժամկետից վաղ կատարված ջանքի դեպքում եզրպտացորենի սերմի ծլումը ձգձգվում է:

Սա բացատրվում է նրանով, որ այդ ժամանակ հողը սառն է լինում, իսկ սառը հողում եզրպտացորենի հատիկները ժամանակին չեն ծլում, երկար ժամանակ մնում են հողում, որի հետևանքով հաճախ հատիկները կորցնում են իրենց ծլունակությունը և ոչնչանում: Բացի սրանից այդ ժամանակ մոլախոտերը, որոնք ալիւի քիչ պահանջկոտ են ջերմության նկատմամբ, տալիս են համեմատաբար ծիւրը: Եզրպտացորենի ծիւրը դուրս գալու պահին դաշտը մասամբ ծածկված է լինում մոլախոտերով, որոնք խանգարում են եզրպտացորենի ծիւրերի դուրս գալուն, իսկ դուրս եկածներն էլ լինում են թույլ զարգացած:

Արարատյան հարթավայրում ցանքից մինչև ծլելու սկիզբն բնկած ժամանակաշրջանը ավելի երկար է տևում (16—17 օր) ցանքի վաղ ժամկետներում (ապրիլ—մայիս), երբ եղանակն ավելի զով է, իսկ մնացած ժամկետներում, երբ հատիկը գտնվում է ավելի շոգ պայմանների մեջ ծլում է կարճ ժամկետում, 8—10 օրում: Նույն պատկերն է ստացվում նաև Ալավերդու շրջանում: Յանքի 10 օր ուշացումը 3 օրով կրճատում է սերմերի ծլելու ժամանակը: Բացի դրանից փոխվում է նաև ինչպես արական, այնպես և իգական ծաղիկների կազմակերպման ժամանակը, այսինքն՝ ծլումից մինչև ծաղիկը աստիճանաբար արագանում է մինչև հուլիսի սկզբներին կատարված ցանքերում, իսկ նրանից ավելի ուշացած այն է՝ օգոստոսի սկզբի ցանքերում ծաղիկումը նորից սկսում է ուշանալ:

Ծաղկումից մինչև հասունացման փուլը ցանքի այդ նույն ժամկետներում, ընդհանրապես, բույսի զարգացումը դանդաղում է, որովհետև ընթանում է առավել կարճացող օրվա և ցածրացող ջերմաստիճանի պայմաններում:

Բայց, վերջին հաշիվով, բնագնաներ վեգետացիայի տևողությունը մինչև հուլիսի սկզբները կատարված ցանքերում կարճանում է, իսկ դրանից հետո կատարված ցանքերում բույսերի մեծագույն մասը չի հասունանում: Բացի դրանից, դեբիև բոլոր տարիներին ուշ ժամկետների ցանքերում, կապված օգի ու հողի ջերմաստիճանի բարձրացման հետ, կրճատվում են բույսի զարգացման ֆենոֆազաները՝ հետևապես և վեգետացիայի տևողությունը: Նույն օրինակաբանությունն է նկատվում նաև Ալավերդու շրջանում:

Հետաքրքիրն այն է, որ կարճ օրվա բույս համարվող եգիպտացորենը այս պայմաններում իրեն պահում է որպես երկար օրվա բույս:

Աղյուսակ 1

Մորֆոլոգիական հատկանիշները ցանքի տարբեր ժամկետներում
Ալավերդու շրջանում

Սերմի անվանումը	Յանքի ժամանակը	Բույսի բարձրու- թյունը սմ-ով	Տ ե Ր Է	
			երկարու- թյունը սմ-ով	լայնու- թյունը սմ-ով
Գորեց վաղահաս	10/5	153,0	70,0	9,4
» »	20/5	142,4	69,0	9,8

Աղյուսակից երևում է, որ մորֆոլոգիական հատկանիշներով՝ բույսի բարձրությունը, տերևի լայնությունը ու երկարությունը, ավելի բարձր ցուցանիշներ ապիս է եգիպտացորենի մայիսի 10-ի ցանքը:

Բույսի աճման ու զարգացման ցուցանիշները ուսումնասիրել ենք ցանքի տարբեր ժամկետներում, Արարատյան հարթավայրում (աղ. № 2):

Աղյուսակ 2-ից երևում է, որ մայիսի 15-ի ցանքը, համեմատած հունիսի 5-ի ցանքի հետ, տալիս է մի շարք գրական փոփոխություններ, այն է՝ կողերը երկարել են 3,8 սմ-ով, գերիշխում է կողերի գլանային ձևը, փոխվում է հատիկի կռոպին հարսաբերությունը ստանցքի համեմատությամբ՝ հօգուտ հատիկի (հատիկի ելը 79 % փխսարեն գաղնում է 81,30%), զգալի չափով փոխվում է 1000 հատիկի քաշը (291,3 գրամի դիմաց ստացվում է 330 գր):

ԿՅԺԺ ԳՃԻԺ ԻՍԻՅ ՈՒՄ ԶՅ ԼԵԻԶԱՌԱՆ ՍՃԶԱՊԿԻՄՐ
ՔՈՆՈՊԿ ԿՈՎ ԴՈՒ ԶԶԵԻ Զ ԼԵԻԶ ԶՒՄ ԵՐԱՊԿԻՄՐ ԶՎԺՃԻ ԴՄՃՄՈՒՄԶԵԵՄ Զ
ԼԵԻԶ ՄՃՈՒ ԴՈՒ ԶԶԵԻ ՄՅ ՄՈՒՄԻՄԶ ԻՒՄ (ԼՎԻՄՈՒ) ԵՐԱՊԿԻՄՐ ԶՎԺՈՒՅՍ ԻՍՎԶԱԶԵ
ՍԶԱՐԺԻՄՃՄՈՒ ՎՃԻՍԻ ԶՎԺՈՒՄ ԵՐԱԻՍԻ Զ ԶՎ ԴՄՃԱՊԿԻՄՐ ՄՈՂ

Երևանի մարզպետի պալատի և Երևանի մարզպետի պալատի
 Երևանի մարզպետի պալատի և Երևանի մարզպետի պալատի
 Երևանի մարզպետի պալատի և Երևանի մարզպետի պալատի

Հայկական Բանկը	Բանկի համար	Հայկական Բանկի համար	Հայկական Բանկի համար	Հայկական Բանկի համար	Հայկական Բանկի համար
25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
15,5	263,2	29,0	4,8	81,3	18,7
5,6	270,0	25,2	3,1	79,7	20,3
293,0	293,0	293,0	293,0	293,0	293,0

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱՆԴԱՐԱՆԻ ՊՐԵՍԻԴԵՆՏԻ ԿԱՆՈՒՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՄԸ

ևնվզանք ռազմատու մարտեր կրչ. մեկ ու մշտե կտջմտեմս միմիջկիտուչ ն յառաջըլտ ն իսմհոտոյոյս
 ամե. ուրախամսկի 'կվնարաւ մկկտ ոչ յառաւտե ժգումն միջք ա զհրաքիաւ
 չյտ միմիջկիտուչ յառիկմտքիչ ոչ զմքիւսմսմսի 'միմիջկիտուչ տոյ
 չմիմիջ միմիջիւր ասմից ում ն կիմիւտտաւ զմտ յամիջկիտուչ հմսմսմ
 'հմսմիմիջ զմտապ կտ 'մ-ՇԷ ն կրտուչ (տվտուչ) յառապիտուչ հմսմիմիջ 'Է
 կիմիջ ն մտտտիւտ զմտ (միմիւտ) յառապիտուչ զմիմիւտ 'միմիջ միմիջկիտուչ
 ասի միմիւտ ուտուչ ն յառապիտուչ իսմիւտ միմիւտ յառապիտուչ յառապիտուչ
 ամիմիւտուչ միմիւտ միմիւտուչ

§ 4. *Implication*

Երեսուցի՝ Կոնստանտին Կոնստանտինովիչ Կոնստանտինով
 ղարկաբան և ղարկաբանական գործերի վարչության պետ

Գնական արժեքը	Բնակարանի արժեքը	Բնակարանի արժեքը	Բնակարանի արժեքը	Բնակարանի արժեքը	Բնակարանի արժեքը	Բնակարանի արժեքը	Բնակարանի արժեքը
105	153,0	22,0	82,5	17,5	17,8	210	9,0
205	142,4	13,0	82,2	17,8	224	2,3	

[illegible]

ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

Եգիպտացորենի բերքատվությունը ուսումնասիրել ենք ըստ ցանքի ժամկետների: Բերքատվության տվյալները Արարատյան հարթավայրում բերվում են № 4 աղյուսակում:

Աղյուսակից երևում է, որ եգիպտացորենից բարձր բերք ստացվում է ապրիլի վերջի (25/IV) և մայիսի առաջին կեսի (15/5) ցանքերում, երբ հեկտարից ստացվում է կողքերի 81,8—82,5 ց և վեզետատիվ մասսայի 522—559 ց բերք: Իսկ հունիսի ցանքում դպարի հափով իջնում է բերքատվությունը՝ կողքերի 72,5 ց և վեզետատիվ մասսայի 467 ց:

Եգիպտացորենի բերքատվությունը ցանքի տարբեր ժամկետներում հաշվի է առնված Ալավերդու շրջանում:

Տվյալները բերվում են աղյուսակ 5-ում:

Ինչպես նախորդ աղյուսակները, այնպես էլ աղյուսակ 5-ից երևում է, որ Ալավերդու շրջանում և՛ կանաչ մասսա, և՛ հատիկ ստանալու համար եգիպտացորենը պետք է ցանել վաղ ժամկետում (մայիսի 1-ի տոմսն օրյակում):

Վաղ ժամկետում ցանք կատարելու դեպքում բույսի սկզբնական աճն ու զարգացումը համընկնում են ձմռան ընթացքում հողի մեջ կուտակված խոնավության ու վաղ գարնան տեղումների մաքսիմում չափին, իսկ ուշ ժամկետում ցանք



Նկ. 1. Դաշտի բնոգնանուր տեսքը հուլիսի 1-ին ցանքի ժամկետում
Պուրա դաշտ մոմենտին ցանքի 1 ժամկետում
Ալավերդու շրջանում:

Աղյուսակ 4

Յանքի ժամկետների ազդեցությունը բերքատվության վրա

Յանքի ժամանակը	Ժամկետ	Բերքը ց/հ		Ծանոթություն
		կողքեր	մասսա	
25/4	1	81,6	522,0	5 ժամկետում ցանքը կատարվել է խոցանացան, նպատակն է եղել ստանալ կանաչ մասսա
15/5	2	82,5	559,0	
5/6	3	72,5	467,5	
16/6	4	40,2	150,0	
3/7	5	—	450	

կատարելու դեպքում բույսերը զրկվում են հողի խոնավությունից (մասամբ արդեն գոլորշիացած է լինում) և վաղ գարնանային տեղումներից

(որոնք արդեն չկան): Եթե դրա հետ մեկտեղ նկատի ունենանք, որ Ալավերդու շրջանը լրիվ ապահովված չէ ջրով և կերային կուլտուրաների ոռոգմանը չափ ուշ հերթ է հասնում կամ բոլորովին չի հասնում, ապա պետք է ասել, որ այդ շրջանում եգիպտացորենի ցանքը անհրաժեշտ է կատարել անպայման վաղ ժամկետում (մինչև մայիսի 10-ը):

Աղյուսակ 5

Բերքատվությունը ցանքի տարրեր ժամկետներում
Ալավերդու շրջանում

Սորտի անվանումը	Ցանքի ժամանակը	Բերքը գ/հ	
		կանաչ մասսա	կոդերը
Գորեց	10/5	293,3	51,5
Վաղահաս	20/5	166,0	26,0

Մենք ուսումնասիրել ենք նաև եգիպտացորենը որպես խոզանացան կուլտուրա:

Խոզանացան եգիպտացորենը, ըստ տարրեր տարիների տվյալների, հասունանում է 82—120 օրում, իսկ այդ ժամանակաշրջանը լրիվ ապահովում է մեր օռնադուրլիկայի Արարատյան հարթավայրում, որտեղ աշունը բավական երկար է, և աշնանացանների բերքահավաքից հետո դարձյալ մնում է 3—3,5 ամիս տաք օրեր:

1945 թվականի փորձերը ցույց տվեցին, որ որքան ուշ է կատարվում խոզանացան եգիպտացորենի ցանքը, այնքան շուտ են ծլում սերմերը: Այն դեպքում, երբ 1945 թվականի հուլիսի 7-ի ցանքում եգիպտացորենի սերմերը ծլեցին 11—13 օրում, հուլիսի 31-ի ցանքում ծլեցին 5—7 օրում:

Ծիրերի արագ դուրս գալու հետ փոխվում է բույսի բարձրությունը, որը պարզ երևում է մորֆոլոգիական հատկանիշների ուսումնասիրությունից (տվյալները բերվում են աղյուսակ 6-ում):

Աղյուսակ 6

Խոզանացան եգիպտացորենի մորֆոլոգիական փոփոխությունները

Սորտերի անվանումը	Տարեթիվ	Ցանքի ժամանակը	Բույսի բարձրությունը սմ-ով	Հանգուցիկների թիվը	Տ եր հ	
					երկարություն սմ-ով	լայնություն սմ-ով
Կարծր	1944	15/7	105	—	—	—
Ատամնաձև		15/7	100	—	—	—
Կարծր	1945	7/7	91	9	49	8,5
		31/7	133	9	77	9,5
Ատամնաձև		7/7	160	16	80	7,0
		31/7	163	16	81,2	8,5

Աղյուսակից երևում է, որ խոզանացան եգիպտացորենի բույսերը ունենում են բավական մեծ բարձրություն (91—163 սմ), երկար ու լայն տերևներ, որոնք կազմում են կանաչ վարթամ սաղարթ, բարձրացնելով կանաչ մասսայի բերքատվությունը:

Կանաչ մասսայի բերքի հաշվառման ավյալները բերվում են ազյուսակ 7-ում:

Ազյուսակ 7

Կանաչ մասսայի բերքը			
Սորտերի անվանումը	Տարեթիվ	Ցանքի ժամանակը	Կանաչ մասսայի բերքը ց/հ
Կարծր	1945	7/7	257,3
	»	31/7	270
Ատամնաձև		7/7	434,1
		31/7	400,1
Ատամնաձև	1948	3/7	450,0

Ինչպես մեր, նույնպես էլ ուրիշների հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ Արարատյան հարթավայրում ջրովի պայմաններում եգիպտացորենը լավագույն կուլտուրա է խոզանացան մշակության համար, նա տալիս է 400—450 ց կանաչ (սիլոսային) մասսա:

Մեր փորձերի արդյունքներից ելնելով դալիս ենք հետևյալ եզրակացության.

1. Արարատյան հարթավայրում եգիպտացորենը կարելի է դանել ապրիլի 25-ից—մայիսի 15-ը:

2. Խոնավ անտառային շրջաններում եգիպտացորենի ցանքը պետք է կատարել ոչ շուտ և ոչ քան մայիսի առաջին տասնօրյակում:

Երկու դեպքում էլ պետք է անպայման հաշվի առնել դարձան բացվելը (վաղ թե ուշ):

3. Արարատյան հարթավայրում ջրովի պայմաններում եգիպտացորենը լավագույն կուլտուրա է խոզանացան մշակության համար:

4. Արարատյան հարթավայրում եգիպտացորենի խոզանացան մշակության լավագույն ժամկետ պետք է համարել հուլիսի առաջին տասնօրյակը՝ աշնանացան հացահատիկների և վաղ հալածվող կուլտուրաների բերքահավաքից անմիջապես հետո, երբ ստացվում է 400—450 ց սիլոսանյութ:

5. Որպես խոզանացան լավ է մշակել տաամնաձև խմրի սորտերը, որոնք ունեն կանաչ փարթամ սաղարթ և տալիս են ավելի բարձր բերք:

Р. Г. Кургиян

Влияние сроков сева на урожайность кукурузы

Р е з ю м е

Перед нами стояла задача — изучить и найти такие оптимальные сроки посева, при которых возможно получить высокий урожай кукурузы.

Посевы были произведены в 1944 и 1948 годах, в различные сроки: в апреле, мае, июне, июле; опыты были заложены в 1945—1946

годах в мае и июне в Араратской низменности, в 1944, 1945 и 1946 годах на опытном поле Кармир-блур бывшего Института земледелия АН АрмССР, в 1947—1948 годах в сел. Айгестан и Мхчян Арташатского района.

Урожайность зависит от сроков посева: при посеве 25 апреля она составила 81,6 ц початков и 522 ц вегетативной массы с гектара; при посеве 15 мая—82,5 ц початков и 559 ц вегетативной массы; при посеве 15 июля соответственно—72,5 ц и 467 ц; при посеве 16 июля—40,3 и 150 ц; при посеве 3 июля получен был урожай зеленой массы в 450 ц с гектара.

В 1954 году посевы произведены 10 и 20 мая в сел. Айгеат Алавердского района (влажно-лесной район).

При посеве 10 мая собран урожай в 51,5 ц початков и 293,3 ц зеленой массы, а при посеве 20 мая—36 ц початков и 266 ц зеленой массы.

В 1944, 1945 и 1948 гг. в Араратской низменности мы изучали кукурузу, как пожнивную культуру.

Наши опыты показали, что кукуруза успешно развивается при пожнивном возделывании и дает около 400—450 ц зеленой массы с гектара.

Наши опыты привели к следующим выводам:

1. Для хлопкосеющих районов республики, где весна наступает рано, лучшие сроки посева кукурузы—в период с 20 апреля по 10 мая, которые обеспечивают высокую урожайность—от 72,5 до 82,5 ц початков и 559 ц вегетативной массы с гектара.

2. Во влажных лесных районах сроки посева—до 10 мая, когда получается 5,5 ц початков и 293,3 ц зеленой массы (разные опыты).

3. Кукуруза при пожнивном возделывании дает обильную зеленую массу.

4. Для пожнивного посева и получения высокого урожая хорошим временем можно считать начало июля, после уборки озимых.

5. Для пожнивного посева надо взять сорта из зубовидной группы, которые имеют мощную зеленую массу и дают до 45 тонн зеленой массы с гектара.