ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

В. И. Исагулянц, академик АН Армянской ССР, и Т. А. Азизян

К вопросу об окислении хлоридов винильного типа

II. Синтез и окисление некоторых замещенных в ядре γ -хлоркротиловых эфиров фенолов

(Представлено 1. II 1960)

Ранее было показано (¹), что при окислении производных 1,3-дихлорбутена-2, направление реакции и природа образующихся продуктов зависят от характера заместителя, занимающего место первичного атома хлора в 1,3-дихлорбутене-2.

Изучение реакции окисления хлоридов винильного типа привело нас к удобному методу синтеза ароксикислот, используемых в качестве стимуляторов роста растений и гербицидов(²).

Арокси- $\text{CH}_2\text{—CH=CCl—CH}_3$ $\xrightarrow{\text{окисление}}$ Арокси- $\text{CH}_2\text{—COOH}$.
 Углубляя наши исследования в области синтеза и окисления хлоридов винильного типа, мы синтезировали ряд различных моно- и ди-производных 1,3-дихлорбутена-2 и изучили механизмы реакции окисления этих соединений. В настоящей статье описываются результаты исследований в области синтеза и окисления некоторых замещенных в ядре моно- и ди γ -хлоркротиловых эфиров фенолов.

Превращение алкилированных ароматических соединений при окислении в соответствующие кислоты, как известно, происходит легко. Ароматические соединения с длинными боковыми цепями также легко при окислении дают карбоновые кислоты вероятно вследствие того, что воздействие окислителя всегда начинается с активированного положения соседнего с бензольным кольцом. Подобного рода окисление показано и для ароматических соединений, содержащих двойную связь в боковой цепи. Так при окислении 2-метокси-4-метил-6-аллилфенола, после предварительного метилирования, была получена 2,3-диметокси-4-метил-бензойная кислота(³).

Эти данные также свидетельствуют об активирующем влиянии ароматического ядра на α -углеродный атом, вследствие чего окисление хотя и идет по месту двойной связи, однако в результате получается соответствующая бензойная кислота.

Аналогичным образом окисляются и исследованные нами замещенные фенолы с γ -хлоркротильным радикалом в ароматическом ядре. Однако прямое окисление гомологов фенола в соответствующие оксикислоты не дает желаемых результатов, так как действие окислителя направляется не только на боковую цепь, но и на фенольный гидроксил, вследствие чего реакция приводит к разрыву бензольного кольца. Поэтому окислению были подвергнуты не свободные алкилированные в ядре фенолы, полученные непосредственным алкилированием фенолов 1,3-дихлорбутеном-2 в присутствии хлористого алюминия, а их эфиры. Так при окислении γ -хлоркротил фенола марганцевокислым калием в ацетоне была получена пара-этоксibenзойная кислота⁽⁴⁾.

Тем самым подтверждено, что при алкилировании фенола и его эфиров 1,3-дихлорбутеном-2 γ -хлоркротильный радикал вступает в пароположение по отношению к гидроксильной или алкоксильной группе. Изучение реакции окисления алкилированного в ядре, 1,3-дихлорбутеном-2, γ -хлоркротилового эфира фенола, полученного взаимодействием 1,3-дихлорбутена-2 с γ -хлоркротилфенолом⁽⁵⁾ в растворе ацетона в присутствии поташа, показало на одном и том же объекте, что хлоркротильный радикал, замещающий водород бензольного кольца, подвергся полному окислению, с образованием бензойной кислоты в то время, как вторая цепь, замещающая водород фенольного гидроксила, окислилась только по месту двойной связи, в результате чего была получена пара-карбокси-фенокснуксусная кислота.

Такое направление окисления является доказательством того, что наличие кислородного атома исключает возможность активирования соседнего с кислородом углеродного атома ароматическим ядром.

Это заключение подкрепляется полученными нами данными окисления γ -хлоркротилового эфира, γ -хлоркротил 2-метил фенола, полученного взаимодействием 1,3-дихлорбутена-2 с γ -хлоркротил-2-метил фенолом в среде ацетона в присутствии поташа.

В результате окисления была получена 4-карбокси-2-метил феноксиуксусная кислота.

И в данном случае боковая углеродная цепь подверглась полному разрушению благодаря активирующему влиянию фенильного радикала, наличие же кислородного атома исключило возможность активирования ароматическим ядром соседнего с кислородом углеродного атома.

Образование 2-метил-4-карбоксифеноксиуксусной кислоты явилось также доказательством строения исходного 2-метилхлоркротил фенола.

Окислением γ -хлоркротилового эфира 2-метил фенола была получена 2-метил феноксиуксусная кислота. Тот факт, что окисление фениловых эфиров аллильного типа останавливается по месту двойной связи с образованием феноксиуксусных кислот из-за наличия кислородного атома, отделяющего α -углеродный атом от фенильного

ядра подтверждается результатами исследованной нами реакции окисления γ -хлоркротилового эфира бензильного и β -фенил этилового спиртов. В обоих случаях имело место полное окисление боковых цепей с образованием бензойной и уксусной кислот.

В этих случаях действие окислителя направляется не только на этиловую связь, но и на активированную ароматическим ядром метиленовую группу, в результате чего боковая цепь подвергается полному разрушению с образованием бензойной кислоты.

Полученные данные дают возможность предположить, что результатами реакции дипроизводных, каковыми являлись ди- γ -хлоркротилового эфиры двуатомных фенолов, будут соответствующие изомерные фенилен О-О-диуксусные кислоты.

Так, при окислении ди- γ -хлоркротилового эфира пирокатехина, полученного взаимодействием 1,3-дихлорбутена-2 с пиоркатехином в среде ацетона в присутствии поташа, была получена 1,2-О-О диуксусная кислота.

В данном случае оба γ -хлоркротильных радикала, связанные с ароматическим ядром посредством атомов кислорода, окислялись только по месту двойной связи с образованием фенилен-1,2-О-О-диуксусной кислоты.

Исследование реакции окисления хлорированного в ядре γ -хлоркротилового эфира (2, 4, 5 трихлорфенола) дало возможность предложить новый путь синтеза ценного стимулятора роста растений и гербицида, каким является 2, 4, 5-трихлорфеноксиуксусная кислота.

Новые замещенные в ядре γ -хлоркролиловые эфиры фенолов и замещенный фенол

Формула соединения*	Физико-химические константы				Молекулярная рефракция		Анализ		Выход вещества в %
	т. кип.	г. пл. н° С	удельный вес	показатель преломления	найдено MR_D	вычислено MR_D	содержание Cl в %		
							найдено Cl %	вычислено Cl %
102–104°/ 3 м.м	—	d_4^{19} 1,08724	n_D^{19} 1,5372	56,1	55,4	17,90 17,77	18,06	71,42
130–131°/ 5 м.м	—	d_4^{24} 1,1223	n_D^{24} 1,1523	55,92	55,34	18,43 18,40	18,09	16,0
160–161°/ 4 м.м	—	d_4^{15} 1,1504	n_D^{15} 1,5519	75,21	73,70	25,94 25,99	26,19	30,60
165–166°/ 5 м.м	—	d_4^{22} 1,12947	n_D^{22} 1,5468	79,9	78,3	24,67 24,84	24,91	64,80
170–171°/ 5 м.м	—	d_4^{18} 1,1956	n_D^{18} 1,5538	79,67	75,34	24,58 24,62	24,73	73,05
155–156°/ 4 м.м	47–48	—	—	—	—	49,13 49,30	49,65	79,57

Таблица 2

Арокснуксусные кислоты

Формула соединения	Т. плавления в °С	Кислотное число		Молекулярный вес		Элементарный анализ				Выход кислоты гм в %
		найдено	вычислено	найдено	вычислено	найде-	найде-	вы-	вы-	
						но	но	числе-	числе-	
С %	Н %	С %	Н %
150—151	337,4 337,6	337,35	165,97 165,87	166	—	—	—	—	40,29
HOOC- -O-CH ₂ COOH	277—278	—	—	—	—	55,00 55,00	4,30 4,33	55,10	4,08	40,9
HOOC- -O-CH ₂ COOH	279—280	—	—	—	—	56,97 57,05	5,11 5,00	57,14	4,76	38,0
173—174	495,62 496,58	495,17	225,97 225,54	226	—	—	—	—	360
158	218,6 218,9	219,17	256,10 255,70	255,5	—	—	—	—	560

Синтез γ -хлоркротилфенолов был проведен непосредственным алкилированием соответствующих фенолов 1,3-дихлорбутена-2 в ацетоне в присутствии хлористого алюминия.

Синтез замещенных в ядре γ -хлоркротиловых эфиров фенолов был осуществлен нагреванием смеси замещенных фенолов и 1,3-дихлорбутена-2 в ацетоне в присутствии углекислого калия.

В табл. 1 показаны свойства и выходы синтезированных нами не описанных в литературе замещенных в ядре γ -хлоркротиловых эфиров фенолов и алкил фенола.

Замещенные в ядре ароксиксусные кислоты были получены окислением γ -хлоркротиловых эфиров марганцевокислым калием в ацетоне при перемешивании и охлаждении реакционной смеси льдом.

Реакционная смесь оставлялась на ночь и на следующий день бесцветный раствор отфильтровывался. Высушенный осадок перекиси марганца выщелачивался горячей водой при слабом нагревании, отфильтровывался, а фильтрат после выпаривания подкислялся минеральной кислотой. Выделенная ароксиксусная кислота после перекристаллизации из соответствующего растворителя идентифицировалась определением температуры плавления, кислотного числа, молекулярного веса и данными элементарного анализа.

Окислением замещенных в ядре γ -хлоркротиловых эфиров был получен ряд замещенных в ядре ароксиксусных кислот, свойства и выходы которых показаны в табл. 2.

Выводы. 1. Исследована реакция и предложено объяснение механизма реакции окисления замещенных в ядре γ -хлоркротиловых эфиров фенолов.

2. Установлено, что окислением алкилированных в ядре γ -хлоркротиловых эфиров фенолов образуются соответствующие карбоксилированные в ядре ароксиксусные кислоты.

3. Показано, что окислением ди- γ -хлоркротиловых эфиров фенолов образуются фениен-О-О-диуксусные кислоты.

4. Предложен новый вариант синтеза важного стимулятора роста растений и гербицида 2, 4, 5—трихлорфеноксиксусной кислоты, окислением γ -хлоркротилового эфира 2, 4, 5—трихлорфенола.

5. Синтезированы новые, не описанные в литературе, соединения: 2-метил 4- γ -хлоркротил фенол, γ -хлоркротиловый эфир 2-метилфенола, γ -хлоркротиловый эфир 4- γ хлоркротилфенола.

γ -хлоркротиловый эфир 4-хлоркротил 2-метил фенола, γ -хлоркротиловый эфир 2, 4, 5-трихлорфенола, ди- γ -хлоркротиловый эфир пирокатехина.

Институт органической химии
Академии наук Армянской ССР

Վ. Ի. ԻՍԱԳՈՒԼՅԱՆՑ ԵՎ Թ. Ա. ԱԶԻՋՅԱՆ

Վրենիայի Խիմի Էլոմիգրեերի Օգիգայցման Իստց Ի Տուրքս 11

Օղակուճ տեղակալված Վի շարք γ -քլորկրոտիլալին էֆիրների սինթեզը 4 օրիգա-
ցուճքի

Նախորդ հազորգումներում ցույց էր տրված, որ 1,3-դիբրոբրուտեն 2-ի ածանցյալների օքսիդացման սեպտիկայի ուղղությամբ կախված է առաջնային քլորի ատոմը փոխարկվող խմբերի բնույթից:

Վիսիլային տիպի քլորիդների օքսիդացման սեպտիկայի ուսումնասիրությունը հանդեպից արօքսիդացախաթթուների սինթեզի նոր մեթոդի:

Հայտնի է, որ արօքսի քացախաթթուները և նրանց ածանցյալները կիրառվում են գյուղատնտեսությունում մեծ, որպես հերքիցիդներ և բույսերի աճը նպաստող նյութեր: Ներկա աշխատանքը նվիրված է արոմատիկ օդարկում փոխարինված մոնո- և դի-քլորկրոտիլային էֆիրների սինթեզին և օքսիդացման սեպտիկայի ուսումնասիրությանը, տրված է այդ միացությունների օքսիդացման մեխանիզմի բացատրությունը:

Սինթեզված են դրականության մեջ շնկարագրված հետևյալ միացությունները-2-մեթիլ-4-քլորկրոտիլ ֆենոլը, 2-մեթիլ-7-քլորկրոտիլային էֆիրը, 4-քլորկրոտիլֆենոլի 7-քլորկրոտիլային էֆիրը, 2-մեթիլ-4-քլորկրոտիլֆենոլի 7-քլորկրոտիլային էֆիրը, 2, 4, 5-տրիբրոֆենոլի 7-քլորկրոտիլային էֆիրը, պիրոկատեխինի դի-քլորկրոտիլային էֆիրը:

Ցույց է տրված, որ 2-մեթիլ ֆենոլի 7-քլորկրոտիլային էֆիրի օքսիդացման դեպքում ստացվում է 2-մեթիլ ֆենոքսի քացախաթթու, իսկ դի-քլորկրոտիլային էֆիրների օքսիդացումը բերում է ֆենիլեն դիքացախաթթուների դոյացմանը:

Այն հանգամանքը, որ այդպիսին տիպի 7-քլորկրոտիլային էֆիրների օքսիդացումը կանգ է առնում կրկնակի կապի տեղում, դոյացնելով արօքսիդացախաթթուներ, օդակի հետ ամիջականորեն կապված թթվածնի ներկայության շնորհիվ, ապացուցված է մեր կողմից ուսումնասիրված բենզիլ և 3-ֆենիլ 7-քլորկրոտիլային էֆիրների օքսիդացման սեպտիկայի արդյունքներով:

Բենզիլ և 3-ֆենիլ 7-քլորկրոտիլային էֆիրների օքսիդացման արդյունքն եղել է բենզոյական թթուն:

Օդակում 7-քլորկրոտիլ խմբով տեղակալված 7-քլորկրոտիլային էֆիրների օքսիդացման դեպքում ստացվում են օդակում կարբօքսիլացված արօքսի քացախաթթուներ:

Տվյալ դեպքում օդակի հետ անմիջականորեն կապված 7-քլորկրոտիլային խումբը ենթարկվում է լրիվ օքսիդացման, մինչդեռ ևրկրորդ 7-քլորկրոտիլային խումբը, որը կապված է օդակի հետ թթվածնի ատոմի միջոցով, օքսիդանում է կրկնակի կապի տեղում:

Մեր հետազոտությունների հիման վրա առաջարկված է հայտնի հերքիցիդի և բույսերի աճը նպաստող 2, 4, 5-տրիբրոֆենոքսի քացախաթթվի սինթեզի նոր եղանակ:

ЛИТЕРАТУРА — ԿՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

- ¹ В. И. Исагулянц и Т. А. Азизян, «Известия АН АрмССР», т. III, № 8 (1950).
² Т. А. Азизян, Диссертация, г. Ереван, 1954. ³ Д. Г. Флетчер, Д. С. Тарбел, J. Am. chem. Soc. 65, 1431 (1943) ⁴ В. И. Исагулянц и Т. А. Азизян, ДАН АрмССР т. VII, № 1, 21 (1947). ⁵ В. И. Исагулянц и Т. А. Азизян, «Известия АН АрмССР» (естественные науки) № 4 (1947).