УДК 537.144.2

БИОХИМИЯ

Р. А. Захарян, А. С. Сафарян, Э. Г. Захарян,
 В. С. Сафарян, К. С. Карагезян, В. В. Носиков

Структурный анализ ДНК фага Mdp8

Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР Э. Г. Африкяном 3/IV 1978)

Для физико-химической характеристики, анализа структуры и функции ДНК различных репликаонов успешно применен рестрикционный анализ эндонуклеазами-рестриктазами II типа. Использование эндонуклеаз рестрикции позволяет провести физическое картирование линейной структуры ДНК, топографический анализ взаиморасположения генов, локализовать в структуре репликаона сайты инициации транскрипции и репликации, изучить последовательность экспрессии генома. Рестрикционный анализ незаменим для установления гомологий в структуре ДНК и изоляции специфических генов в целях генной инженерии.

Натанс и сотр. ⁽¹⁾ одни из первых установили карту участков транскрипции ДНК вируса SV-40 с помощью эндонуклеазы *Haemophilus influenzae*, фрагментирующей ДНК SV-40 в 10 участках. Полное картирование этой же ДНК и ДНК фага ФХ174 успешно было осуществлено анализом перекрывающихся фрагментов, продуцируемых двумя различными ферментами ⁽²⁾.

Ферменты рестрикции из *Haemophilus parainfluenzae* I и II и рестриктаза E_{co} RI успешно были использованы для картирования митохондриальной ДНК; была установлена уникальность сайтов рестрикции в структуре ДНК для данного организма ⁽³⁾. Большая часть физической карты цистрона, кодирующего 42-S рибосомальный предшественник, была расшифрована с помощью ⁽⁴⁾ рестрикционных эндонуклеаз E_{co} RI; Hind II, Hind III—⁽⁴⁾. Рестрикционные эндонуклеазы успешно были использованы в нескольких работах Дюерфлер, посвященных характеристике внутриклеточных форм ДНК Ad2, а также уточнению транскрипционной карты ДНК Ad2 ⁽⁵⁾.

Описано физическое картирование целого ряда R-плазмид ⁽⁶⁾.

В данном сообщении электрофоретически изучены продукты рестрикционного расщепления ДНК фага Mdp8 ферментами-рестриктазами E_{co} RI, Hind III, Sal I, Hpa I, Pst I, BamH I, Kpn I. Фаг Mdp8 принадлежит к группе родственных фагов группы Mdp1—8, выделенных из

лизогенных штаммов *Salmonella derby* (7). В плане структурного анализа изучение ДНК этих родственных фагов представляет определенный интерес и позволит оценить общность и различия структурной организации единиц оперона в составе структуры различных репликонов.

Фаг Mdp8 выделен из лизата индикаторного штамма K89S *derby*; ДНК фага Mdp8 и «лямбда» получали из фаголизатов по Мак-Хетье (8). Ферменты-рестриктазы *Eco* RI; *Hind* III; *Sal* I; *Hpa* I; *Pst* I, *Bam*H I, *Kpn* I, выделены в лаборатории биокатализа Института молекулярной биологии АН СССР из соответствующих штаммов, по специфической методике выделения для каждого энзима, включающих как обязательные следующие последовательные этапы очистки: ионообменная хроматография на DEAE-целлюлозе и КМ-целлюлозе; Р-целлюлозе и хроматография на гидроксипаттите.

Препараты ДНК инкубировали в соответствующей инкубационной среде для каждого энзима, и после рестрикции полученные фрагменты фракционировали электрофорезом в 0,8%-ном агарозном геле с бромидом этидия при напряжении в 20 в; время электрофореза—16 часов. Рестрицированные фрагменты выявляли в геле в спектре ультрафиолета 250—320 мкм. Фрагменты ДНК фага «лямбда», генерируемые рестриктазами, были использованы в качестве маркеров для определения молекулярных весов фрагментов ДНК фага Mdp8.

ДНК фага Mdp8 расщепляется при действии используемого набора рестриктаз на различное количество фрагментов, рис. 1.

Рестрикционный анализ ДНК Mdp8 энзимом *Pst* I свидетельствует о наличии в структуре ДНК фага Mdp8 четырех сайт-специфических нуклеотидных последовательностей 5'ЦТГЦАГ3' с осью симметрии вто-

рого порядка, рекогниция и рестрикция которых эндонуклеазой *Pst* I образует 5 фрагментов с когезивными концами.

Рестриктаза *Eco* RI расщепляет ДНК Mdp8 на пять относительно крупных фрагментов, что также указывает на присутствие в структуре ДНК четырех специфических палиндромов со следующей последова-

Наибольшее число фрагментов образуется при действии рестриктазы *Hpa* I. Эти фрагменты перекрывают область молекулярных весов от $7,5 \cdot 10^6$ до $0,4 \cdot 10^6$ дальтон. Насчитывается около 25 фрагментов при неполном гидролизе и 13 при полном расщеплении, что указывает на присутствие в структуре ДНК Mdp8, по крайней мере около 24 палин-

с осью симметрии первого порядка.

Рестриктаза *Bam*HI, расщепляющая последовательность $\overset{|}{\text{Г.Г.АТЦЦ}}$
 ЦЦТАГГ , как и рестриктаза *Kpn*I не имеет участков узнавания на
ДНК фага *Mφ*8.

Рестриктаза *Sal*I расщепляет ДНК фага *Mφ*8 по полиндрому
 $5'\text{ГТЦГАЦЗ}'$, по-видимому, в нескольких точках с формированием
 $3'\text{ЦАГЦТГ5}'$

↑
крупных фрагментов, которые ввиду близости молекулярных весов не
фракционируются в геле.

Рис. 1 Электрофоретическое распределение фрагментов ДНК фага *Mφ*8 и фага «лямбда», рестрицированных рестриктазами.

1—ДНК фага *Mφ*8; 2—ДНК *Mφ*8 рестрицированная эндонуклеазой *Pst*I; 3—эндонуклеазой *Eco*RI; 4—*Hpa*I; 5—*Bam*HI; 6—*Hind*III; 7—*Kpn*I; 8—*Sal*I; 9—ДНК фага «лямбда», рестрицированная эндонуклеазой *Sal*I; 10—ДНК «лямбда», рестрицированная ферментом *Eco*RI; 11—ферментом *Bam*HI; 12—ферментом *Hind*III

Рестриктаза *Hind*III расщепляет ДНК фага *Mφ*8 на три относительно крупных фрагмента. Сайт-специфическая последовательность оснований, полиндром: $5'\text{ААГЦТТЗ}'$ встречается в структуре данной
 $3'\text{ТТЦГАА5}'$

ДНК, по-видимому, в двух точках, хотя и второй фрагмент от старта обнаруживается в относительно меньшем количестве.

В последующих гелях на рис. 1 показано распределение в качестве маркеров по молекулярному весу фрагментов ДНК «лямбда», рестрицированных ферментами *Sal* I, *Eco* R I, *Bam* H I и *Hind* III (9).

На рис. 2 изображено электрофоретическое распределение в агарозном геле фрагментов ДНК *Mdr* 8, продуцируемых совместно двумя различными ферментами.

Совместное расщепление ДНК *Mdr* 8 двумя энзимами *Hind* III и *Eco* R I свидетельствует о том, что из получаемых пяти фрагментов (гель 4) два первых фрагмента находятся в составе первого фрагмента (гель 3), а три последующих фрагмента в составе второго относительно крупного фрагмента геля 3.

Рис. 2. Электрофоретическое распределение фрагментов ДНК фага *Mdr* 8, рестрицированных совместным действием двух рестриктаз.

1—ДНК «лямбда», рестрицированная *Hind* III
2—*Eco* RI; 3—ДНК *Mdr* 8, рестрицированная
Sal I + *Eco* RI; 4—*Sal* I; 5—*Bam* I + *Eco* RI; 6—*Bam* I,
7—*Kpn* I + *Eco* RI; 8—*Kpn* I; 9—*Eco* RI + *Hind* III,
10—*Hind* III; 11—*Eco* RI; 12—ДНК *Mdr* 8

Совместное расщепление ДНК *Mdr* 8 энзимами *Eco* R I и *Kpn* I, *Bam* I и *Eco* R I еще раз подтверждает, что в данной ДНК отсутствуют

сайты расщепления для Kpn I и Bam I; в то же время совместное действие Sal I и EcoRI действительно указывает на то, что цилиндры, специфичные для Sal I, присутствуют в ДНК Mdp8 в малом числе и на их основе при рестрикции получают крупные фрагменты, обнаруживающие себя при совместном действии с энзимом EcoRI. Данные рисунка 2 в определенной степени конкретизируют распределение соответствующих цилиндрических нуклеотидных последовательностей в структуре ДНК Mdp8.

Молекулярные веса фрагментов расщепленной ДНК Mdp8

Рестрикция ферментом	Величина молекулярных весов ($\times 10^6$ дальтон) фрагментов ДНК Mdp8	Молекулярный вес Mdp8 $\times 10^6$ дальтон
Hpa I	6.5; 4.0; 3.5; 2.2; 1.9; 1.6; 1.2; 1.0; 0.9; 0.8; 1.0;	23.6
EcoRI	11.0; 7.5; 4.0; 2.7; 0.8;	26.0
PstI	20.0; 6.0; 5.5; 1.1; 0.8;	33.4
Hind III	15.0; 6.0; 3.8;	24.8

Молекулярные веса фрагментов ДНК Mdp8, генерируемых соответствующими рестриктазами, оценены относительно подвижности фрагментов ДНК λ (⁹) и приведены в таблице.

Молекулярный вес ДНК Mdp8 вычислен около $(28 \pm 2) \times 10^6$ дальтон.

Авторы благодарят Ж. А. Кцюян за предоставление фаголизата Mdp8.

Институт экспериментальной биологии
Академии наук Армянской ССР

Ռ. Ա. ԶԱՔԱՐՅԱՆ, Ա. Ա. ՍԱՅԱՐՅԱՆ, Է. Կ. ԶԱՔԱՐՅԱՆ, Վ. Ս. ՍԱՅԱՐՅԱՆ,
Կ. Ս. ԿԱՐԱՅԵԶՅԱՆ, Վ. Վ. ՆՈՍԻԿՈՎ

'ԻՆՔ'-ի Mdp8 ֆազի ստրուկտուրային անալիզը

Ճարրերը սեպիլիկոններով 'ԻՆՔ'-ի ստրուկտուրայի և ֆունկցիայի ֆիզիկա-րիմիական բնութագրի համար հաջող օգտագործվում է սեսարիկցիոն անալիզի 2-րդ տիպի էնդոնուկլեազ-ոնսարիկտազաներով:

Այս աշխատանքում կատարված է 'ԻՆՔ'-ի Mdp8 ֆազի սեսարիկցիա 2-րդ տիպի մի շարք ֆերմենտներով: EcoRI, HpaI, PstI, Hind III, KpnI, SalI: Որոշվել է ստացված ֆրագմենտների մոլեկուլային կշիռը: 'ԻՆՔ'-ի Mdp8 ֆազի մոլ. կշիռը կազմում է $28 \pm 2 \times 10^6$ գալտոն:

Л И Т Е Р А Т У Р А — Ц И Ц Ы О Р Ы В И Р Ы

- ¹ G. Khoury, M. Martin, T. Lee, K. Danna, D. Nathans, J. Mol. Biol. 78, 377 (1973) ² A. S. Lee, R. L. Sinshelmer, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 71, 2882 (1974). ³ F. M. DeFillippes, M. M. Nass, Hand. of genetics 5, 477 (1976). ⁴ I. H. Meyerink, J. Retel, R. J. Planta, Molecular Biology Reports, 2, 391 (1976). ⁵ W. Doerfler, Abstracts X internat. Biochem. congress, Hamburg (1976). ⁶ N. Tanaka, J. H. Cramer, R. Rownd, J. Bacteriol. 127, 619 (1976). ⁷ М. К. Вартимян, Б. П. Карабеков, Вопросы молекулярно-клеточной биологии и иммунологии, 97, Ереван, 1970. ⁸ Mc Chetija, J. Mol. Biol., 23, 355 (1967). ⁹ R. J. Roberts, Critical Reviews In Biochem., 4, 2, 123 (1976).