Относительно (условного) закона распределения этой случайной величины легко доказывается

Лемма 1. Пусть в некоторой системе координат с центром в точке A выпуклый контур C задан уравнениями

$$\begin{cases} x = x(s) \\ y = y(s) \end{cases}, \quad 0 \leq s < L,$$

где s — длина контура C , отсчитываемая от A в направлении поиска. Тогда

$$\Phi_c(s) = P \left\{ \tau_c < s \mid \text{обнаружение произошло} \right\} = \frac{s + r_c(s)}{L}, \quad (2)$$

где $r_c(s) = \sqrt{x^2(s) + y^2(s)}$.

Заметим, что из этой леммы легко получить следующий результат. Предположим, что поиск по C производится таким образом, что при первом обнаружении хорды происходит возвращение в A кратчайшим (по прямой) путем. Обозначим через T_c полное время, затраченное на поиск при таком способе поиска. Как и раньше, если поиск не увенчался успехом, положим $T_c = \infty$. Тогда $\Phi_{T_c}(s) = P \{ T_c < s \mid \text{обнаружение произошло} \} = \frac{s}{L}$, $0 \leq s \leq L$, т. е. закон распределения T_c

не зависит от выбранной траектории C . Это утверждение является следствием нашей леммы и очевидного равенства

$$T_c = \tau_c + r_c(\tau_c). \quad (3)$$

Вернемся к нашей задаче оптимизации поиска, взяв за основу критерия оптимальности функционалы от траекторий C , связанные со случайной величиной τ_c . Пусть $d_A(G)$ — длина максимальной хорды области G , проходящей через точку A . В зависимости от соотношения между L , $L(G)$ и $d_A(G)$ возможны 3 случая:

$$1) 0 \leq L \leq 2d_A(G), \quad 2) 2d_A(G) < L < L(G), \quad 3) L = L(G).$$

Случай 3) неинтересен, поскольку здесь мы имеем единственную траекторию C , совпадающую с контуром области G . Рассмотрим случай 1). В качестве функционала оптимизации выберем (условную) функцию распределения $\Phi_c(s)$ и покажем, что существует такая траектория C_0 , что для всех C и s , $0 \leq s \leq L$:

$$\Phi_{C_0}(s) \geq \Phi_c(s). \quad (4)$$

Из формулы (2), задающей $\Phi_c(s)$, следует, что поставленная задача сводится к максимизации величины $r_c(s)$ одновременно для всех s , $0 \leq s \leq L$. Легко видеть, что для $s \leq \frac{L}{2}$ максимальное значение $r_c(s)$ будет достигаться на прямолинейных (радиальных) участках

траекторий, для которых $r_c(s) = s$. Пусть $s > \frac{L}{2}$. Положим $s = \frac{L}{2} + \Delta s$, $\Delta s > 0$. Тогда для любой траектории C

$$r_c\left(\frac{L}{2} + \Delta s\right) \leq \frac{L}{2} - \Delta s,$$

причем равенство достигается на прямолинейных (радиальных) участках возвращения в A . Отсюда следует, что искомым оптимальным путем C_0 , удовлетворяющим соотношению (4), будет дважды проходимый прямолинейный отрезок длины $\frac{L}{2}$ с величиной

$$r_{c_0}(s) = \begin{cases} s, & s \leq \frac{L}{2} \\ L-s, & \frac{L}{2} < s \leq L. \end{cases} \quad (5)$$

Нетрудно видеть, что в случае 2), когда $2d_A(G) < L < L(G)$, не существует такой траектории C_0 , для которой выполняется соотношение (4) для всех s , $0 < s \leq L$. Поэтому, если имеется возможность выбора точки A , надо выбирать ее так, чтобы величина $d_A(G)$ была максимальной, т. е. в одном из концов диаметра $d(G)$ области G .

В этом случае в качестве функционала оптимизации мы выберем $M\tau_c$ — среднее значение момента первого обнаружения ξ (при условии, что обнаружение произошло) и будем искать такую траекторию C_0 , для которой

$$M\tau_{c_0} \leq M\tau_c \quad (6)$$

для всех траекторий C .

З а м е ч а н и е.

Интересно сравнить $M\tau_c$ для различных траекторий C в первом случае, когда $0 \leq L \leq 2d_A(G)$. Так, например, для дважды проходимого отрезка C_0 $M\tau_{c_0} = \frac{L}{4}$, а для окружности C длины L $M\tau_c = L\left(\frac{1}{2} - \frac{2}{\pi^2}\right)$. Поэтому почти на 20% в принятом нами смысле выгоднее искать хорду отрезком, нежели окружностью.

Согласно равенству (2), имеем:

$$M\tau_c = \int_0^L [1 - \Phi_c(s)] ds = \frac{L}{2} - \frac{1}{L} \int_0^L r_c(s) ds. \quad (7)$$

Полученная формула (7) сводит поставленную задачу к максимизации функционала

$$\int_0^L r_c(s) ds, \quad (8)$$

заданного для всех выпуклых контуров C , целиком содержащихся в выпуклой области G .

Ограничимся далее случаем, когда область G есть круг, хотя проведенные ниже рассуждения леммы 2 применимы для любой выпуклой области, а не только для круга.

Назовем „секториальным“ контуром круга выпуклый контур, состоящий из двух хорд, проведенных из точки A до пересечения с окружностью, и дуги окружности между ними, не содержащей точки A . Обозначим через $r^*(s)$ соответствующий полярный радиус для этого контура (с полюсом в точке A). Тогда справедлива

Лемма 2. Для любой траектории C периметра L ($L > 4R$, где R — радиус круга G) найдется „секториальный“ контур того же периметра такой, что $r^*(s) > r_c(s)$ для всех s .

Доказательство. Пусть AB проекция контура C на диаметр круга AD . Тогда точка B является образом либо

- а) одной точки N контура C , либо
- б) целого отрезка N_1N_2 .

Возможны следующие случаи:

1а) точка N находится на границе круга,

1б) отрезок N_1N_2 имеет общую точку (либо N_1 , либо N_2) с границей круга,

2а) точка N находится внутри круга,

2б) отрезок N_1N_2 находится внутри круга.

Рассмотрим случай 1а. Хорда AN делит круг на два, вообще говоря, неравных сегмента. Для определенности предположим, что в меньшем из них содержится начальная часть контура C , имеющая длину L_1 . Для $0 \leq s \leq L_1$ построим вместо этой части контура C новую траекторию C^* , состоящую из дуги окружности $\overline{NE}$ и отрезка AE , причем, длина $\overline{NE} +$ длина AE равна L_1 . Покажем, что ее полярный радиус $r^*(s)$ удовлетворяет соотношению

$$r^*(s) > r_c(s), \quad 0 \leq s \leq L_1. \quad (9)$$

Пусть длина отрезка AE равна s_1 . Тогда при $0 \leq s \leq s_1$ неравенство (9) очевидно. Если же предположить, что при некотором s_0

$$r^*(s_0) < r_c(s_0) \quad (s_1 < s_0 < L_1),$$

то, как нетрудно заметить, область, ограниченная 1) радиусом-вектором $r_c(s_0)$ 2) частью траектории C , соединяющей конец радиуса-вектора $r_c(s_0)$ и точку N , 3) отрезком NA , лежит внутри контура, образованного 1) радиусом $r^*(s_0)$, 2) частью новой траектории, соединяющей конец радиуса-вектора $r^*(s_0)$ и точку N ; 3) отрезком AN .

В силу предположения $r^*(s_0) < (r_c(s_0))$ следует, что периметр второго контура больше периметра первого контура. Но известно ([2]): если одна выпуклая область содержится внутри другой, то ее периметр меньше, чем периметр области, ее содержащей. Отсюда следует, что неравенство $r^*(s_0) < r_c(s_0)$ невозможно.

Для другой части контура C , содержащейся в большем сегменте круга, доказательство можно провести следующим образом. Проведем хорду $NM \perp AD$ и построим новый контур $\bar{C}$, образованный хордой NM , частью дуги окружности $\bar{MN}$ и отрезком NA , причем, длина NM + длина $\bar{MN}$ + длина NA равна $L - L_1$. Точно также, как и в предыдущем случае можно показать, что для полярного радиуса $r(s)$ нового контура $r(s) > r_c(s)$ ($L - L_1 \leq s < L$). Наконец, этот контур $\bar{C}$ заменим контуром C^* , состоящим из дуги $\bar{NF}$ и отрезка AF , причем, длина $\bar{NF}$ + длина AF равна $L - L_1$. Нетрудно видеть, что для этого контура каждая точка далее удалена от A , чем соответствующая (для одного и того же значения s) точка для предыдущего. Таким образом, в случае 1а) лемма доказана. Доказательство леммы в случае 1б) полностью совпадает с предыдущим доказательством. Случаи 2а) и 2б) рассматриваются, как предыдущие с незначительными изменениями. Лемма доказана.

Лемма 3. Среди всех „секториальных“ контуров заданного периметра L максимум $\int_0^L r_c(s) ds$ достигается для контура, симметричного относительно диаметра AD .

Доказательство. Рассмотрим „секториальный“ контур периметра L , у которого угол между хордами, проведенными из точки A , равен 2α , а угол между биссектрисой этого угла и диаметром AD равен β . Для этого контура введем следующее обозначение

$$J(\alpha, \beta) = \int_0^L r^*(s) ds.$$

Опуская утомительные выкладки, получим

$$J(\alpha, \beta) = 4R^2 [(\sin \alpha + \cos \beta)^2 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \beta],$$

причем, α и β связаны соотношением $\cos \alpha \cos \beta + \alpha = \frac{L}{4R}$.

Исследуя функцию $J(\alpha, \beta)$ обычными методами дифференциального исчисления, убеждаемся, что максимум достигается при $\beta = 0$, $\alpha = \alpha_0$, где α_0 определяется из уравнения

$$\alpha_0 + \cos \alpha_0 = \frac{L}{4R}.$$

Лемма доказана. Сохраняя введенные выше обозначения и резюмируя предыдущие результаты (включая результаты лемм 2 и 3) приходим к следующим выводам.

Теорема. 1°. Замкнутые траектории длины L , принадлежащие целиком области G и максимизирующие вероятность P_c обнаружения случайной хорды этой области, представляют собой множество выпуклых траекторий;

2°. В случае $0 \leq L \leq 2d_A(G)$ траекторией, максимизирующей для любого s ($0 \leq s \leq L$) функцию $\frac{1}{L}$ распределения $\Phi_c(s)$, будет дважды проходимый отрезок длины $\frac{L}{2}$;

3°. Для круга G радиуса R и $4R \leq L \leq 2\pi R$ контуром длины L , минимизирующим среднее значение $M\tau_c$, будет симметричный „секториальный“ контур.

Найденные нами оптимальные траектории поиска хорды представляют интерес с точки зрения рассмотрения некоторых других функционалов от траекторий C .

Так, например, случайная хорда делит область G на две части. Обозначим через G_1 ту часть, которая не содержит точку A . Будем интерпретировать задачу, рассмотренную выше, как поиск области G_1 . Естественно предполагать, что обнаружение области G_1 происходит с большей надежностью, когда время, проведенное внутри области G_1 будет максимально возможным. Для выбора оптимальной в этой смысле траектории рассмотрим две случайные величины τ_c^+ и τ_c^- — моменты первого обнаружения хорды при обходе контура C , соответственно, против и по часовой стрелке.

Поскольку ξ_c — время пребывания в области G_1 равно

$$\xi_c = L - (\tau_c^+ + \tau_c^-),$$

то траектории, найденные выше и „минимизирующие“ величину τ_c , будут „максимизировать“ величину ξ_c . Отметим, что нетрудно найти функцию совместного распределения величин τ_c^+ и τ_c^- .

Б. Поиск хорды незамкнутыми траекториями. Рассмотрим теперь случай, когда поиск хорды, случайно расположенной в выпуклой области G , ведется по траекториям $\overline{AB}$ длины L с началом и концом на границе области G . По соображениям, приведенным в пункте А, ограничимся классом выпуклых (вогнутых) траекторий $\overline{AB}$. Легко заметить, используя формулу (1), что вероятность пересечения $\overline{AB}$ со „случайной“ хордой области G будет равна величине

$$P_{\overline{AB}} = \frac{L(\overline{AB}) + z}{L(G)}, \quad (10)$$

где z — длина хорды AB , стягивающей дугу $\overline{AB}$.

Повтому в смысле максимума вероятности оптимальными траекториями будут хорды AB длины L , если $L < d(G)$, и дуги $\overline{AB}$, совпадающие с частью контура области G и выбранные так, что хорды AB , их стягивающие, имеют максимально возможную величину z — в случае, если $L > d(G)$ (здесь, как и раньше, $d(G)$ — диаметр области G). В дальнейшем будем рассматривать только такие траектории.

Представим себе процедуру поиска такую, что по обнаружении хорды происходит возвращение кратчайшим путем (по прямой) в ближайший из концов A или B . Введем величину T — суммарное время, затраченное на поиск хорды. Тогда, очевидно,

$$T = \begin{cases} \tau + r^A(\tau) & \tau \leq s_0 \\ \tau + r^B(\tau) & \tau > s_0, \end{cases} \quad (11)$$

где τ — момент первого обнаружения „случайной“ хорды $r^A(s)$, $r^B(s)$ — расстояния точки $M(s)$ соответственно от начала $A(0)$ и конца $B(L)$, $0 \leq s \leq L$ и s_0 — координата точки $M_0(s_0)$ такой, что $r^A(s_0) = r^B(L - s_0)$. Из равенства (11) можно получить преобразование Лапласа величины T для $L > d(G)$ и при условии обнаружения хорды

$$\varphi_T(u) = Me^{-uT} = \int_0^{s_0} e^{-u(x+r^A(x))} d\Phi_c(x) + \int_{s_0}^L e^{-u(x+r^B(x))} d\Phi_c(x), \quad (12)$$

где $\Phi_c(x)$ определяется равенством (2).

Формулой (12) практически трудно воспользоваться, но для круговой области G она дает возможность вычислить через элементарные функции все моменты случайной величины T . Действительно, в случае круга радиуса R и $L > 2R$ преобразование Лапласа $\varphi_T(u)$ величины T , как легко подсчитать, преобразуется к виду:

$$\begin{aligned} \varphi_T(u) = & \frac{1}{L + 2R \sin \frac{L}{2R}} \cdot \left[\frac{1}{u} (1 - e^{-u \left(\frac{L}{2} + 2R \sin \frac{L}{4R} \right)}) + \right. \\ & \left. + \int_{\frac{L}{2}}^L e^{-u \left(x + 2R \sin \frac{L-x}{2R} \right)} \left(1 + \cos \frac{x}{2R} \right) dx \right]. \end{aligned}$$

3°. *Поиск отрезка.* Теперь рассмотрим поиск ориентированного отрезка длины l замкнутыми выпуклыми контурами C длины L . Будем предполагать, что отрезок „случайно“ распределен в некоторой об-

ласти G и имеет с ней хотя бы одну общую точку. Как и раньше „случайность“ понимается в смысле, обычном в интегральной геометрии, т. е. вероятность того, что выбранная внутри G выпуклая траектория C пересечет отрезок будет равна

$$P_c = \frac{\mu(\mathfrak{M}_c)}{\mu_0}, \quad (13)$$

где $\mu(\mathfrak{M}_c)$ — кинематическая мера множества $\mathfrak{M}_c$ отрезков длины l , пересекающих контур C , а μ_0 — кинематическая мера отрезков, имеющих хотя бы одну общую точку с областью G .

Известно, что $\mu_0 = 2\pi F + 2 \cdot l \cdot L(G)$, где F и $L(G)$ — площадь и периметр области G соответственно. Нетрудно также показать, что

$$\mu_c = \mu(\mathfrak{M}_c) = \int_{\mathfrak{M}_c^*} |l + \min(l, \sigma)| d\bar{\Pi}, \quad (14)$$

где $\bar{\Pi}(p, \varphi)$ — ориентированная прямая, на которой лежит отрезок, σ — длина хорды, отсекаемой на этой прямой контуром C , а $\mathfrak{M}_c^*$ — соответствующая область параметров p и φ .

Наша задача ставится следующим образом. Среди всех выпуклых контуров C длины L найти такой контур C_0 , для которого

$$P_{c_0} > P_c.$$

Заметим, что так как в формуле (13) знаменатель не зависит от выбора C , то для решения поставленной задачи нужно минимизировать числитель. В случае, если длина отрезка l не менее диаметра $d(C)$ фигуры C , соотношение (14) приводит к известной формуле ([2]):

$$\mu_c = 2lL + 2\pi F_c. \quad (15)$$

В силу изопериметрического свойства круга отсюда следует, что для $l > d(G)$ окружность является оптимальной траекторией. Рассмотрим другой крайний случай малых l ($l \rightarrow 0$). Ниже мы хотим показать, что и в этом случае окружность будет максимизировать вероятность обнаружения P_c . Используя известные результаты интегральной геометрии ([2] и [3]), кинематическую меру μ_c (14) можно преобразовать к виду:

$$\mu_c = 4[l \cdot L - \int_0^{2\pi} S_c(\varphi) d\varphi], \quad (16)$$

где $S_c(\varphi)$ — площадь заштрихованной фигуры W (рис. 1), определяемой следующим построением. Проводятся две ориентировочные прямые $\bar{\Pi}(p_1, \varphi)$ направления φ таким образом, чтобы хорды $AB = A_1B_1 = l$, и одна из опорных прямых к контуру C , параллельная им; затем проводятся прямые AA_1 и BB_1 до пересечения с этой опорной прямой. Фигура, заключенная между опорной прямой, прямыми AA_1 ,

BB_1 и частью контура C , отсекаемого этими прямыми, та фигура W , о которой идет речь в формуле (16). Из равенств (13) и (16) выте-

Рис. 1.

кает, что задача максимизации вероятности P_c свелась к минимизации интеграла

$$I_c = \int_0^{2\pi} S_c(\varphi) d\varphi. \tag{17}$$

Рассмотрим сначала класс $R[C]$ гладких кривых C с касательной во всех точках и с определенной везде кривизной κ . Для каждого фиксированного φ ($0 \leq \varphi < 2\pi$) в соответствии с изложенным выше построением определяется фигура W площади $S_c(\varphi)$ и точка $K(\varphi)$ на контуре C (рис. 1). Выберем прямоугольную систему координат xKy с началом в точке K и осью x , идущей по опорной прямой CKD . Поскольку мы предполагаем, что $l \rightarrow 0$, то в этой системе координат можно задать кривую C в виде однозначной функции $y = f_c(x)$, определенной для $|x| \leq l$. Тогда, обозначая через x_1 и x_2 — абсциссы точек A и B ($x_1 \leq 0 \leq x_2$, $x_2 - x_1 = l$), нетрудно получить, что

$$S_c(\varphi) = \int_{x_1}^{x_2} f_c(x) dx. \tag{18}$$

Разлагая $f_c(x)$ по формуле Маклорена и учитывая, что $f_c(0) = f'_c(0) = 0$, а $f''_c(0) = \kappa_c(\varphi)$, где $\kappa_c(\varphi)$ — кривизна кривой C в точке $K(\varphi)$, мы получим из равенства (18) следующее асимптотическое выражение для $S_c(\varphi)$:

$$S_c(\varphi) = \frac{1}{6} \kappa_c(\varphi) (x_2^3 - x_1^3) + O(l^3), \quad l \rightarrow 0,$$

которое вместе с равенством (17) очевидным образом приводит к следующему результату: для любого выпуклого контура C справедливо соотношение

$$J_c = l^3 \int_0^{2\pi} \kappa_c(\varphi) \lambda_c(\varphi, l) d\varphi + O(l^3), \tag{19}$$

$$\text{где } \lambda_c(\varphi, l) = \frac{x_2^3 - x_1^3}{6l^3},$$

причем

$$J_c \geq \frac{P^3}{24} \int_0^{2\pi} \lambda_c(\varphi) d\varphi + O(l^3), \quad (20)$$

где знак равенства достигается в случае окружности.

Найдем теперь минимум функционала

$$I_c = \int_0^{2\pi} \lambda_c(\varphi) d\varphi.$$

Прежде чем это сделать, отметим следующее обстоятельство. Зададим контур C параметрически, выбрав в качестве параметра длину дуги s , отсчитываемую от некоторой точки контура. Тогда угол φ , задающий направление касательной в каждой точке кривой, можно представить как функцию этой дуги $\varphi = \varphi(s)$, $0 \leq s \leq L$, такую, что $\frac{d\varphi(s)}{ds} = k_c(s)$, где $k_c(s)$ кривизна кривой C в точке, отвечающей значению параметра s . Поэтому функционал I_c можно преобразовать к виду:

$$I_c = \int_0^L \lambda_c(\varphi(s)) d\varphi(s) = \int_0^L k_c^2(s) ds. \quad (21)$$

При этом для выпуклого контура C должно выполняться очевидное условие

$$\int_0^L k_c(s) ds = 2\pi. \quad (22)$$

Мы пришли к простейшей вариационной задаче на условный экстремум. Ее решением, дающим минимальное значение функционала (21), будет постоянная:

$$k_c(s) \equiv \text{const} \left(= \frac{2\pi}{L} \right), \quad 0 \leq s \leq L. \quad (23)$$

Вместе с (20) равенство (23) утверждает асимптотическую оптимальность окружности в классе кривых C с определенной везде кривизной. Если же в некоторой точке касания $K(\varphi)$ кривизна $\lambda_c(\varphi)$ не определена, формула Маклорена для функции $f_c(x)$ дает лишь представление

$$f_c(x) = \varepsilon_c(x, \varphi) \cdot x,$$

где $\varepsilon_c(x, \varphi) \rightarrow 0$, $x \rightarrow 0$. Введя $\beta_c(x) = \frac{\varepsilon_c(x, \varphi)}{x}$, получим $f_c(x) =$

$= \beta_c(x) \cdot x^2$, где в силу выпуклости кривой C , всегда $\beta_c(x) > 0$. Поэтому, учитывая дискретный характер таких точек, можем сказать, что они не могут „улучшить“ кривую в смысле вероятности P_c ее пересечения с отрезком, — „ухудшить“ могут, — если

$$\beta_c(x) \rightarrow +\infty \quad \text{при } x \rightarrow 0.$$

Дальнейшее ухудшение гладкости кривой C ведет к дальнейшему „ухудшению“ кривой в смысле максимизации вероятностей P_c . Так, можно показать, что если контур C имеет m угловых точек с углами $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ между соответствующими односторонними касательными, то вероятность P_c будет равна

$$P_c = \frac{1}{\mu_G} \left[4lL - \frac{l^2}{2} \sum_{j=1}^m \left(1 - \frac{\alpha_j}{\text{tg } \alpha_j} \right) + O(l^3) \right]. \quad (24)$$

Для кривых же класса $R\{C\}$, как это следует из формул (13), (16) и (19), эта вероятность равна

$$P_c = \frac{4}{\mu_G} \left[l \cdot L - l^3 \int_0^{2\pi} \chi_c(\varphi) \lambda_c(\varphi, l) d\varphi + O(l^3) \right], \quad (25)$$

где

$$\frac{1}{24} \leq \lambda_c(\varphi, l) \leq \frac{1}{6}.$$

В полученных формулах (24) и (25) интересно отметить следующий факт: первый член разложения определяется размером L кривой C , второй же член — ее формой, представленной соответственно параметрами $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ в (24) и $\chi_c(\varphi), \lambda_c(\varphi, l) 0 \leq \varphi < 2\pi$, в (25).

Для произвольных l нам не удалось максимизировать вероятность P_c . Однако, в связи с полученными выше результатами для частных случаев „больших“ и „малых“ l , можно высказать гипотезу, что среди выпуклых контуров C длины L оптимальной будет окружность C_0 , т. е. $P_{C_0} > P_c$.

Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова

Поступило 2.III.1970

Օ. Պ. ՎԻՆՈՎՐԱՊՈՎ և Ի. Պ. ՑԱՐԵՎՐԱՊՈՎԻ. Երկրաչափական հավանականություններ և օպտիմալ որոնման տեսությունը (ամփոփում)

Դիտարկվում են ուռուցիկ տիրույթներում պատահական ձևով տեղավորված օբյեկտների օպտիմալ որոնման խնդիրները, լարերի և ինտերվալների որոնման խնդրի համար ստացված և օպտիմալ հետազոտությունները:

O. P. VINOGRADOV and I. P. ZAREGRADSKI. *Geometrical probabilities in the theory of optimal search* (summary)

The problems of optimal search for geometrical objects, randomly placed in a convex domain, are discussed.

Optimal trajectories for search for chords and intervals in convex domains are obtained.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. M. G. Kendall, P. A. P. Moran. *Geometrical Probability*, Charles Griffin, London, 1963.
2. Л. А. Сантало. Введение в интегральную геометрию, М., Издательство „ИЛ“, 1956.
3. L. A. Santaló. Sur quelques problèmes de probabilités géométriques, *Tohoku Math. J.*, 47, 1940, 159—171.