В. С. ЗАХАРЯН

ОЦЕНКА РОСТА ДЛЯ МЕРОМОРФНЫХ ФУНКЦИЙ
 КЛАССА N_c

В в е д е н и е

1°. Согласно хорошо известной теореме Р. Неванлинны [1, 2], класс A аналитических в круге $|z| < 1$ функций $f(z)$, для которых

$$\sup_{0 < r < 1} \left\{ \int_0^{2\pi} \log^+ |f(re^{i\theta})| d\theta \right\} < +\infty, \quad (1)$$

совпадает с множеством функций $f(z)$, допускающих факторизационное представление вида

$$f(z) = e^{i\alpha} z^\lambda B(z) \exp \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{e^{i\theta} + z}{e^{i\theta} - z} d\psi(\theta) \right\}, \quad |z| < 1, \quad (2)$$

где α ($\text{Im } \alpha = 0$) — постоянная, $\lambda \geq 0$ — целое число, $B(z)$ — функция Бляшке и $\psi(\theta)$ — вещественная функция с конечным полным изменением на $[0, 2\pi]$.

Из представления (2) следует, что если $f(z) \in A$, причем $f(z) \neq 0$, то справедлива оценка снизу

$$\log |f(z)| \geq -\frac{c(\psi)}{1-|z|} \quad (|z| < 1), \quad c(\psi) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |d\psi(\theta)|, \quad (3)$$

которую, как показывает пример функции $\exp \left\{ -\frac{1}{1-z} \right\}$, улучшить нельзя.

Из оценки же (3) непосредственно вытекает, что если $\omega(t) \geq 0$ — произвольная измеримая функция на $[0, 1)$, подчиненная лишь условию

$$\int_0^1 \frac{\omega(r)}{1-r} dr < +\infty, \quad (4)$$

то для любой функции $f(z) \in A$, $f(z) \neq 0$ будем иметь

$$\int_0^1 \omega(r) \log |f(re^{i\theta})| dr > -\infty, \quad \theta \in [0, 2\pi]. \quad (5)$$

В работе А. Л. Шагиняна [3] был обнаружен важный факт, что условие (5) остается в силе и для произвольной функции Бляшке $B(z)$, что привело его к следующей теореме:

Для любой функции $f(z) \in A$ при условии (4) справедливо неравенство (5).

Кроме того, на примере функции Бляшке $B(z)$ им же было установлено, что в этом утверждении условие (4) на функцию $\omega(r)$, вообще говоря, необходимо*.

2°. В ранней работе М. М. Джрбашяна [4] посредством условия

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} (1-r^2)^{\alpha-1} \log^+ |f(re^{i\theta})| r dr d\theta < +\infty \quad (6)$$

были введены значительно более широкие чем A классы A_α ($0 < \alpha < \infty$) аналитических в круге $|z| < 1$ функций, для которых были установлены существенно новые факторизационные представления.

В дальнейшем автор [5], опираясь на эти представления, установил интегральные оценки типа (5) для функций, принадлежащих любому из классов $A(\alpha)$ ($0 < \alpha < +\infty$).

Но в отличие от случая классов A , установление утверждения, аналогичного (5) для произведений $\pi_\alpha(z)$, участвующих в факторизационном представлении классов $A(\alpha)$, было сопряжено со значительными трудностями.

Вместе с тем отметим, что на примере функций $\pi_\alpha(z)$ точность полученного тогда нами результата нельзя было считать вполне выявленной, поскольку и поныне не известно, входят ли они в класс $A(z)$ или нет?

3°. В дальнейших исследованиях М. М. Джрбашяна ([6] и [7]) была построена полная теория факторизации мероморфных в круге функций, по существу охватывающая мероморфные функции произвольного роста.

Первоначально в монографии [6] путем дальнейшего развития и усовершенствования метода, лежащего в основе работы [4], была построена совершенная теория факторизации классов N_α мероморфных в круге $|z| < 1$ функций, зависящих от непрерывного параметра α ($-1 < \alpha < \infty$). Соответствующие классы $A_\alpha \subset N_\alpha$ аналитических в круге $|z| < 1$ функций взамен (6) определяются посредством условия

$$\sup_{0 < r < 1} \int_0^{2\pi} D_r^{-\alpha} \{\log |f(re^{i\theta})|\} d\theta < +\infty, \quad (7)$$

* На самом деле А. Л. Шагинян устанавливает более общее чем (5) неравенство, рассматривая интеграл по измеримому множеству положительной меры, лежащему на некоторой простой дуге L , лежащей в круге $|z| < 1$ с концом на ее границе.

где $D^{-\alpha}$ — производная (при $-1 < \alpha < 0$), или интеграл (при $0 < \alpha < \infty$) порядка α в смысле Римана-Лиувилля.

Основная теорема М. М. Джрбашяна о факторизации классов A_α гласит:

Класс A_α ($-1 < \alpha < \infty$) совпадает с множеством функций $f(z)$, допускающих представление вида

$$f(z) = cz^\lambda B_\alpha(z; z_k) \exp \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} S_\alpha(e^{-i\theta} z) d\psi(\theta) \right\}, \quad (8)$$

где c — постоянная, $\lambda \geq 0$ — целое число, $\psi(\theta)$ — вещественная функция с конечным полным изменением на $[0, 2\pi]$,

$$S_\alpha(z) = \Gamma(1+\alpha) \left\{ \frac{2}{(1-z)^{1+\alpha}} - 1 \right\}, \quad (9)$$

и, наконец, $B_\alpha(z; z_k)$ — сходящееся в круге $|z| < 1$ произведение вида

$$B_\alpha(z; z_k) = \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{z_k} \right) e^{-W_\alpha(z; z_k)}, \quad (10)$$

причем

$$W_\alpha(z; \zeta) = \int_{|\zeta|}^1 \frac{(1-x)^\alpha}{x} dx - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\Gamma(1+\alpha+k)}{\Gamma(1+\alpha)\Gamma(1+k)} \left\{ \zeta^{-k} \int_0^{|\zeta|} (1-x)^\alpha x^{k-1} dx - \bar{\zeta}^k \int_{|\zeta|}^1 (1-x)^\alpha x^{-k-1} dx \right\} z^k. \quad (11)$$

Классы A_α ($-1 < \alpha < +\infty$) монотонно расширяются вместе с возрастанием параметра α , и в частности, обладают свойством

$$A_0 \equiv A, \quad (12)$$

$$A_\alpha \subset A \quad (-1 < \alpha < 0), \quad A_\alpha \supset A \quad (0 < \alpha < +\infty).$$

4°. В настоящей статье, опираясь на факторизацию (8) функций классов A_α ($-1 < \alpha < +\infty$), и методом оценок, содержащихся в работе [5], устанавливаются интегральные оценки типа (5) для функций этих классов и доказывается их точность в надлежащем классе.

Ввиду свойств (12) классов A_α ($-1 < \alpha < +\infty$), полученные нами результаты относятся как к произвольно узким чем $A_0 = A$ классам (при $-1 < \alpha < 0$), так и к классам, в которых (при $0 < \alpha < \infty$) могут быть охвачены аналитические в круге $|z| < 1$ функции с произвольным конечным ростом, поскольку, как известно, [8]

$$A(\alpha) \subset A_\alpha, \quad (0 < \alpha < +\infty).$$

В специальном же случае, когда $\alpha=0$, в них содержится результат работы [3], о котором говорилось выше.

В § 1 настоящей работы приводится ряд предварительных лемм, которые в дальнейшем используются.

В § 2 получены интегральные оценки для роста функций М. М. Джрбашяна $B_\alpha(z; a_\mu)$, участвующих в представлении функций классов N_α и совпадающих с функцией Бляшке при $\alpha = 0$.

В заключительном § 3 установлены оценки роста на L функций класса N_α ($-1 < \alpha < +\infty$), откуда, в частности, получается теорема единственности для аналитических функций класса N_α .

Автор глубоко благодарен проф. М. М. Джрбашяну за внимание и обсуждение настоящей работы.

§ 1. Предварительные леммы

Условимся говорить, что функция $\omega(t) \in \Omega$, если $\omega(t)$ — произвольная непрерывная и невозрастающая на отрезке $[0, 1)$ функция, для которой $0 \leq \omega(t) \leq 1$ и

$$\int_0^1 \frac{\omega(t)}{1-t} dt < +\infty. \quad (1.1)$$

Заметим, что как в работе [3], так и здесь вместо множества $[0, 1)$ можно было рассмотреть произвольное измеримое множество E на отрезке $[0, 1)$ с положительной мерой. Но, во избежание осложнений, при выкладках в настоящей работе мы принимаем $E \equiv [0, 1)$.

Спроектируем теперь с помощью круговых дуг точки отрезка $[0, 1)$ на дугу L , которая соединяет центр круга с окружностью $|z|=1$. Для простоты будем считать, что окружности $|z| = \text{const}$ пересекают дугу L в одной точке.

Отметим, что в дальнейшем всюду предполагается, что $\omega(t) \in \Omega$ и через c_k ($k=0, 1, 2, \dots$) будем обозначать положительные постоянные.

Лемма 1.1. При любом $0 < b < 1$ и $-1 < \alpha < \infty$ справедлива оценка

$$J_\alpha^{(1)}(b) = \int_b^1 (1-x)^\alpha \omega(x) \lg \frac{1}{x-b} dx < c_1 (1-b)^{1+\alpha}, \quad (1.2)$$

где $c_1 > 0$ не зависит от b .

Доказательство. Так как $\omega(t) > 0$ не возрастает на $[0, 1)$, то

$$c_0 = \int_0^1 \frac{\omega(x)}{1-x} dx \geq \int_0^b \frac{\omega(x)}{1-x} dx \geq \omega(b) \lg \frac{1}{1-b},$$

и таким образом

$$\omega(b) \lg \frac{1}{1-b} \leq c_0. \quad (1.3)$$

Рассмотрим теперь два случая:

1) Пусть $0 < \alpha < \infty$. Тогда из определения (1.2) величины $J_\alpha^{(1)}$ следует

$$\begin{aligned} J_\alpha^{(1)}(b) &\leq (1-b)^\alpha \omega(b) \int_b^1 \lg \frac{1}{x-b} dx = \\ &= \omega(b)(1-b)^{1+\alpha} \left[1 + \lg \frac{1}{1-b} \right] \leq 2c_0 (1-b)^{1+\alpha}. \end{aligned}$$

2) Пусть $-1 < \alpha \leq 0$, тогда будем иметь

$$\begin{aligned} J_\alpha^{(1)}(b) &= \int_b^{\sqrt{b}} (1-x)^\alpha \omega(x) \lg \frac{1}{x-b} dx + \int_{\sqrt{b}}^1 (1-x)^\alpha \omega(x) \lg \frac{1}{x-b} dx < \\ &\leq (1-\sqrt{b})^\alpha \int_b^1 \omega(x) \lg \frac{1}{x-b} dx + \lg \frac{1}{\sqrt{b}-b} \int_{\sqrt{b}}^1 (1-x)^\alpha \omega(x) dx \leq \\ &\leq \omega(b)(1-\sqrt{b})^\alpha (1-b) \left[1 + \lg \frac{1}{1-b} \right] + \omega(b) \lg \frac{1}{\sqrt{b}-b} \cdot \frac{(1-\sqrt{b})^{1+\alpha}}{1+\alpha}. \end{aligned}$$

Отсюда, используя неравенство (1.3), получаем

$$J_\alpha^{(1)}(b) \leq c_2 (1-b)^{1+\alpha}.$$

Лемма доказана.

Заметим, что из неравенств (1.2) в случае $\alpha=0$ будем иметь

$$J_0^{(1)}(b) = \int_b^1 \omega(x) \lg \frac{1}{x-b} dx \leq c_3 (1-b). \quad (1.4)$$

Лемма 1.2. Справедливо неравенство

$$J_\alpha^{(2)}(b) \equiv \int_0^b \omega(t) \lg \frac{b-t}{1-t} dt \leq c_4 (1-b), \quad (1.5)$$

где $c_4 > 0$ не зависит от b .

Доказательство. В интеграле $J_\alpha^{(2)}(b)$ совершим замену переменного интегрирования

$$\frac{b-t}{1-t} = x. \quad (1.6)$$

Тогда будем иметь

$$J_\alpha^{(2)}(b) = (1-b) \int_0^b \omega \left(\frac{b-x}{1-x} \right) \frac{\lg \frac{1}{x}}{(1-x)^2} dx = (1-b) \int_0^{1/2} \omega \left(\frac{b-x}{1-x} \right) \frac{\lg \frac{1}{x}}{(1-x)^2} dx +$$

$$\begin{aligned}
 & + (1-b) \int_{1/2}^b \omega \left(\frac{b-x}{1-x} \right) \frac{\lg \frac{1}{x}}{(1-x)^2} dx \leq \frac{(1-b) \omega(0)}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^2} \int_0^1 \lg \frac{1}{x} dx + \\
 & + (1-b) \int_{1/2}^b \omega \left(\frac{b-x}{1-x} \right) \frac{\lg 2}{\left(1-\frac{1}{2}\right) (1-x)} dx.
 \end{aligned}$$

Первый интеграл вычисляется непосредственно, а во втором вновь перейдем к переменной интегрирования t , определив ее из (1.6). В результате приходим к неравенству

$$J_{\alpha}^{(2)}(b) \leq (1-b) \left\{ 8 + 4 \lg 2 \int_0^1 \frac{\omega(t)}{1-t} dt \right\},$$

т. е. к неравенству (1.5) леммы.

Пусть при $0 \leq u < 1$ и $\frac{1}{2} < b \leq u < 1$ положено

$$E_{\alpha}^{(1)}(u, b) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Gamma(1+\alpha+n)}{\Gamma(1+\alpha)\Gamma(1+n)} \left(\frac{u}{b}\right)^n \int_0^b (1-x)^{\alpha} x^{n-1} dx, \quad (1.7)$$

$$E_{\alpha}^{(2)}(u, b) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Gamma(1+\alpha+n)}{\Gamma(1+\alpha)\Gamma(1+n)} (ub)^{\alpha} \int_b^1 (1-x)^{\alpha} x^{-n-1} dx. \quad (1.8)$$

Лемма 1.3. Для любого α ($-1 < \alpha < \infty$) имеют место неравенства

$$\int_b^1 (1-t)^{\alpha} \omega(t) E_{\alpha}^{(1)}(t, b) dt \leq c_{\alpha} (1-b)^{1+\alpha} \quad (1.9)$$

и

$$\int_b^1 (1-t)^{\alpha} \omega(t) E_{\alpha}^{(2)}(t, b) dt \leq c_{\alpha} (1-b)^{1+\alpha}. \quad (1.10)$$

Доказательство. Сначала оценим функцию $E_{\alpha}^{(1)}(t, b)$, рассматривая при этом два случая:

1) Пусть $0 < \alpha < \infty$, тогда

$$E_{\alpha}^{(1)}(t, b) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Gamma(1+\alpha+n)}{\Gamma(1+\alpha)\Gamma(1+n)} \left(\frac{t}{b}\right)^n \left[\int_0^{b^2} (1-x)^{\alpha} x^{n-1} dx + \right.$$

$$\begin{aligned}
 & + \int_{b^2}^b (1-x)^{\alpha} x^{n-1} dx \Big] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{b}{t}\right)^n \frac{\int_0^1 (1-b^2 t)^{\alpha} t^{n-1} dt}{t^{1+\alpha}} + \\
 & + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Gamma(1+\alpha+n)}{\Gamma(1+\alpha)\Gamma(1+n)} \left(\frac{t}{b}\right)^n \int_{b^2}^b (1-x)^{\alpha} x^{n-1} dx \leq \\
 & < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{b}{t}\right)^n \max_{0 < x < 1} \left(\frac{1-b^2 x}{1-t^2 x}\right)^{\alpha} + \frac{2^{2+\alpha}(1-b)^{1+\alpha}}{1+\alpha} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Gamma(1+\alpha+n)}{\Gamma(1+\alpha)\Gamma(1+n)} t^n.
 \end{aligned}$$

Имея ввиду, что

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\Gamma(1+\alpha+n)}{\Gamma(1+\alpha)\Gamma(1+n)} t^n = \frac{1}{(1-t)^{1+\alpha}} \quad (0 \leq t < 1), \quad (1.11)$$

а также, что $0 < \alpha < +\infty$, получим далее

$$E_{\alpha}^{(1)}(t, b) \leq \left(\frac{1-b^2}{1-t^2}\right)^{\alpha} \left| \lg \left(1 - \frac{b}{t}\right) \right| + \frac{2^{2+\alpha}}{1+\alpha} \left(\frac{1-b}{1-t}\right)^{1+\alpha}. \quad (1.12)$$

2) Пусть теперь $-1 < \alpha \leq 0$, тогда

$$E_{\alpha}^{(1)}(t, b) \leq (1-b)^{\alpha} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Gamma(1+\alpha+n)}{\Gamma(1+\alpha)\Gamma(1+n)} \frac{t^n}{n} \leq c_7 \left(\frac{1-b}{1-t}\right)^{\alpha}. \quad (1.13)$$

Оценка функции $E_{\alpha}^{(2)}(t, b)$ получается непосредственно для всех α ($-1 < \alpha < \infty$),

$$\begin{aligned}
 E_{\alpha}^{(2)}(t, b) & \leq \frac{1}{b(1+\alpha)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Gamma(1+\alpha+n)}{\Gamma(1+\alpha)\Gamma(1+n)} t^n \cdot (1-b)^{1+\alpha} < \\
 & \leq \frac{2}{1+\alpha} \left(\frac{1-b}{1-t}\right)^{1+\alpha}. \quad (1.14)
 \end{aligned}$$

Покажем, что для любого α ($-1 < \alpha < \infty$) имеют место неравенства (1.9) и (1.10). В самом деле, из (1.12) при $0 < \alpha < \infty$ получим

$$\begin{aligned}
 & \int_b^1 (1-t)^{\alpha} \omega(t) E_{\alpha}^{(1)}(t, b) dt \leq 2^{\alpha} (1-b)^{\alpha} \int_b^1 \omega(t) \left| \lg \left(1 - \frac{b}{t}\right) \right| dt + \\
 & + \frac{2^{2+\alpha}}{1+\alpha} (1-b)^{1+\alpha} \int_b^1 \frac{\omega(t)}{1-t} dt \leq 2^{\alpha} (1-b)^{\alpha} \int_b^1 \omega(t) \lg \frac{1}{t-b} dt + \\
 & + 2^{\alpha} (1-b)^{\alpha} \int_b^1 \omega(t) \lg \frac{1}{t} dt + \frac{2^{2+\alpha}}{1+\alpha} (1-b)^{1+\alpha} \int_b^1 \frac{\omega(t)}{1-t} dt.
 \end{aligned}$$

Откуда, пользуясь неравенством (1.4), получаем (1.9).

В случае $-1 < a \leq 0$, пользуясь неравенством (1.13), вновь получим неравенство (1.9).

В силу оценки (1.14), имеем, что при любом a

$$\int_b^1 \omega(t)(1-t)^a E_a^{(2)}(t, b) dt \leq \frac{(1-b)^{1+a}}{b(1+a)} \int_0^1 \frac{\omega(t)}{1-t} dt,$$

т. е. неравенство (1.10).

Лемма 1.4. При любом a ($-1 < a < \infty$) и $0 < b < 1$ для интеграла

$$J_a^{(3)}(b) = \int_0^b (1-t)^a \omega(t) \left\{ \int_b^1 \frac{(1-x)^a}{\left(1-\frac{tx}{b}\right)^{1+a}} \frac{dx}{x} \right\} dt$$

справедлива оценка

$$J_a^{(3)}(b) \leq c_a (1-b)^{1+a}, \quad (1.15)$$

где $c_a > 0$ не зависит от b .

Доказательство. Интеграл $J_a^{(3)}(b)$ представим в следующем виде:

$$J_a^{(3)}(b) = \int_0^b (1-t)^a \omega(t) dt \int_0^{\frac{1-b}{1-t}} \frac{v^a}{1-v} dv \quad (1.16)$$

и рассмотрим два случая:

1) Пусть $0 < a < \infty$. Тогда из (1.16) получим

$$J_a^{(3)}(b) < (1-b)^a \int_0^b \omega(t) \lg \frac{b-t}{1-t} dt < c_a (1-b)^{1+a} \quad (1.17)$$

согласно лемме 1.2.

2) Пусть $-1 < a \leq 0$. В интеграле $J_a^{(3)}(b)$, перейдя к переменному τ и положив

$$v = \frac{1-b}{1-t} \tau,$$

получим

$$\begin{aligned} J_a^{(3)}(b) &= (1-b)^{1+a} \int_0^b \frac{\omega(t)}{1-t} dt \int_0^1 \frac{\tau^a d\tau}{1-\frac{1-b}{1-t} \tau} = \\ &= (1-b)^{1+a} \int_0^b \frac{\omega(t)}{1-t} dt \left[\int_0^{1/2} \frac{\tau^a d\tau}{1-\frac{1-b}{1-t} \tau} + \int_{1/2}^1 \frac{\tau^a d\tau}{1-\frac{1-b}{1-t} \tau} \right] < \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\leq (1-b)^{1+\alpha} c \cdot \int_0^{1/2} \frac{\tau^\alpha d\tau}{1-\tau} + 2^\alpha (1-b)^\alpha \int_0^b \omega(t) \lg \frac{b-t}{1-t} dt < \\ &< c_0 \cdot (1-b)^{1+\alpha} \int_0^{1/2} \frac{\tau^\alpha d\tau}{1-\tau} + c_4 2^\alpha (1-b)^{1+\alpha}. \end{aligned} \quad (1.18)$$

Из неравенств (1.17) и (1.18) следует утверждение (1.15) леммы.

Лемма 1.5. При любом $-1 < \alpha < \infty$ и $0 < b < 1$ для интеграла

$$J_\alpha^4(b) \equiv \int_0^b \omega(t)(1-t)^\alpha \left\{ \int_b^1 \frac{(1-x)^\alpha}{\left(1-\frac{tb}{x}\right)^{1+\alpha}} \frac{dx}{x} \right\} dt$$

справедлива оценка

$$J_\alpha^{(4)}(b) \leq c_0 (1-b)^{1+\alpha}, \quad (1.19)$$

где $c_0 > 0$ не зависит от b .

Доказательство. Непосредственной оценкой внутреннего интеграла получим

$$J_\alpha^{(4)}(b) \leq \int_0^b \frac{\omega(t)}{1-t} dt \int_b^1 \frac{(1-x)^\alpha}{x} dx \leq \frac{c_0}{b(1+\alpha)} (1-b)^{1+\alpha}.$$

§ 2. Интегральная оценка для функции Джрбашьяна $B_\alpha(z; a_\mu)$

2.1°. Доказательство основной теоремы. Функция Джрбашьяна $B_\alpha(z; z_k)$ с нулями в точках данной последовательности $\{z_k\}_1^\infty$ ($0 < |z_k| \leq |z_{k+1}| < 1$), подчиненной условию

$$\sum_{k=1}^{\infty} (1-|z_k|)^{1+\alpha} < +\infty \quad (-1 < \alpha < \infty), \quad (2.1)$$

является сходящимся в круге $|z| < 1$ произведение [5, 6],

$$B_\alpha(z; z_k) = \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{z_k}\right) e^{-W_\alpha(z; z_k)}, \quad (2.2)$$

где для $|z| < 1$ и $|\zeta| < 1$ положено

$$W_\alpha(z; \zeta) = \int_{|\zeta|}^1 \frac{(1-x)^\alpha}{x} dx -$$

$$- \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\Gamma(1+\alpha+k)}{\Gamma(1+\alpha)\Gamma(1+k)} \left\{ \zeta^{-k} \int_0^{|\zeta|} (1-x)^\alpha x^{k-1} dx - \bar{\zeta}^k \int_{|\zeta|}^1 (1-x)^\alpha x^{-k-1} dx \right\} z^k. \quad (2.3)$$

При $|z| < |\zeta|$ функцию $W_\alpha(z; \zeta)$ можно представить и в таком виде:

$$W_\alpha(z; \zeta) = \int_{|\zeta|}^1 \frac{(1-x)^\alpha dx}{x} + \int_{|\zeta|}^1 \frac{(1-x)^\alpha}{\left(1 - \frac{z\bar{\zeta}}{x}\right)^{1+\alpha}} \frac{dx}{x} + \log\left(1 - \frac{z}{\zeta}\right) + \int_{|\zeta|}^1 \frac{(1-x)^\alpha}{\left(1 - \frac{z}{\zeta}x\right)^{1+\alpha}} \frac{dx}{x}. \quad (2.4)$$

Если ввести обозначение

$$A_\alpha(z; \zeta) = \left(1 - \frac{z}{\zeta}\right) e^{-W_\alpha(z; \zeta)}, \quad (2.5)$$

то функцию $B_\alpha(z; z_k)$ можно представить в следующем виде:

$$B_\alpha(z; z_k) = \sum_{k=1}^{\infty} A_\alpha(z; z_k). \quad (2.6)$$

Установим теперь ряд лемм, необходимых нам для доказательства основной теоремы этого параграфа.

Лемма 2.1. При $|z| < |a| < 1$ и $-1 < \alpha < \infty$ имеет место оценка

$$\log |A_\alpha(z; a)| > \log |A_\alpha(|z|, |a|). \quad (2.7)$$

Доказательство. Так как при $|z| < |a|$, согласно (2.4) и (2.5), функцию $A_\alpha(z; a)$ можно представить в следующем виде:

$$A_\alpha(z; a) = \exp \left\{ \int_{|a|}^1 \frac{(1-x)^\alpha}{x} dx - \int_{|a|}^1 \frac{(1-x)^\alpha}{\left(1 - \frac{z\bar{a}}{x}\right)^{1+\alpha}} \frac{dx}{x} - \int_{|a|}^1 \frac{(1-x)^\alpha}{\left(1 - \frac{z}{a}x\right)^{1+\alpha}} \frac{dx}{x} \right\}, \quad (2.8)$$

то имеем

$$\begin{aligned} \log |A_\alpha(z; a)| &= \int_{|a|}^1 \frac{(1-x)^\alpha}{x} dx - \operatorname{Re} \int_{|a|}^1 \frac{(1-x)^\alpha}{\left(1 - \frac{z\bar{a}}{x}\right)^{1+\alpha}} \frac{dx}{x} - \\ &- \operatorname{Re} \int_{|a|}^1 \frac{(1-x)^\alpha}{\left(1 - \frac{z}{a}x\right)^{1+\alpha}} \frac{dx}{x} \geq \int_{|a|}^1 \frac{(1-x)^\alpha}{x} dx - \int_{|a|}^1 \frac{(1-x)^\alpha}{\left(1 - \frac{|z||a|}{x}\right)^{1+\alpha}} \frac{dx}{x} - \\ &- \int_{|a|}^1 \frac{(1-x)^\alpha}{\left(1 - \frac{|z|}{|a|}x\right)^{1+\alpha}} \frac{dx}{x} = \log |A_\alpha(|z|, |a|). \end{aligned}$$

Лемма 2.2. Для любого $-1 < z < \infty$ при $\frac{1}{2} \leq |a| < 1$ имеет место оценка

$$J_a^{(4)}(a) \equiv \int_{L(|z| > |a|)} (1 - |z|)^z \omega(|z|) |\operatorname{Re} W_{\alpha}(z; a)| d|z| \leq c_{10} (1 - |a|)^{1+\alpha}, \quad (2.9)$$

где $c_{10} > 0$ не зависит от a .

Доказательство. Из представления (2.3) имеем

$$\begin{aligned} |\operatorname{Re} W_{\alpha}(z; a)| &\leq \frac{2}{1+\alpha} (1 - |a|)^{1+\alpha} + \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Gamma(1+\alpha+n)}{\Gamma(1+\alpha)\Gamma(1+n)} |z|^n \left\{ |a|^{-n} \int_0^{|a|} (1-x)^{\alpha} x^{n-1} dx + |a|^n \times \right. \\ &\times \left. \int_{|a|}^1 (1-x)^{\alpha} x^{-n-1} dx \right\} \equiv \frac{2}{1+\alpha} (1 - |a|)^{1+\alpha} + E_{\alpha}^{(1)}(|z|, |a|) + E_{\alpha}^{(2)}(|z|, |a|) \end{aligned}$$

согласно (1.7) и (1.8). Следовательно имеем

$$\begin{aligned} J_a^{(4)}(a) &\leq \frac{2}{1+\alpha} (1 - |a|)^{1+\alpha} \int_{|a|}^1 \omega(|z|) d|z| + \int_{|a|}^1 (1 - |z|)^{\alpha} \omega(|z|) E_{\alpha}^{(1)}(|z|, |a|) d|z| + \\ &+ \int_{|a|}^1 (1 - |z|)^{\alpha} \omega(|z|) E_{\alpha}^{(2)}(|z|, |a|) d|z|, \end{aligned}$$

откуда доказательство утверждения (2.9) получится согласно лемме 1.3.

Лемма 2.3. При любом $-1 < z < \infty$ и при $0 < |a| \leq \frac{1}{2}$ для интеграла

$$J_a^{(5)}(a) = \int_L (1 - |z|)^z \omega(|z|) \lg |A_{\alpha}(z; a)| d|z| \quad (2.10)$$

справедлива оценка

$$|J_a^{(5)}(a)| \leq c_{11}. \quad (2.11)$$

Доказательство. Разобьем интеграл $J_a^{(5)}(a)$ на две части

$$\begin{aligned} J_a^{(5)}(a) &= \int_{L(|z| < |a|)} (1 - |z|)^z \omega(|z|) \lg |A_{\alpha}(z; a)| d|z| + \\ &+ \int_{L(|z| > |a|)} (1 - |z|)^z \omega(|z|) \lg |A_{\alpha}(z; a)| d|z| \equiv E_{\alpha}^{(3)}(a) + E_{\alpha}^{(4)}(a). \quad (2.12) \end{aligned}$$

Пользуясь неравенством (2.7) и представлением (2.8) для $A_\alpha(z, a)$, получим

$$\begin{aligned} |E_\alpha^{(3)}(a)| &\leq \int_0^{|a|} (1-|z|)^\alpha \omega(|z|) d|z| \cdot \int_{|a|}^1 \frac{(1-x)^\alpha}{x} dx + \\ &+ \int_0^{|a|} (1-|z|)^\alpha \omega(|z|) \left\{ \int_{|a|}^1 \frac{(1-x)^\alpha}{\left(1 - \frac{|z||a|}{x}\right)^{1+\alpha}} \frac{dx}{x} \right\} d|z| + \\ &+ \int_0^{|a|} (1-|z|)^\alpha \omega(|z|) \left\{ \int_{|a|}^1 \frac{(1-x)^\alpha}{\left(1 - \frac{|z|}{|a|x}\right)^{1+\alpha}} \frac{dx}{x} \right\} d|z|, \end{aligned}$$

откуда, согласно леммам (1.4) и (1.5) имеем

$$|E_\alpha^{(3)}(a)| \leq c_{11}. \quad (2.13)$$

Для $E_\alpha^{(4)}(a)$ имеем

$$\begin{aligned} |E_\alpha^{(4)}(a)| &\leq \left| \int_{L(|z| > |a|)} \omega(|z|)(1-|z|)^\alpha \lg \left| 1 - \frac{z}{a} \right| d|z| \right| + \\ &+ \left| \int_{L(|z| > |a|)} \omega(|z|)(1-|z|)^\alpha \operatorname{Re} W_\alpha(z; a) d|z| \right|. \end{aligned} \quad (2.14)$$

Для оценки первого интеграла достаточно применить лемму 1.1, для второго интеграла находим

$$\begin{aligned} \left| \int_{L(|z| > |a|)} \omega(|z|)(1-|z|)^\alpha \operatorname{Re} W_\alpha(z; a) d|z| \right| &\leq \int_{|a|}^1 (1-|z|)^\alpha \omega(|z|) \times \\ &\times \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Gamma(1+\alpha+n)}{\Gamma(1+\alpha)\Gamma(1+n)} |za|^n d|z| + \\ &+ \int_{|a|}^1 (1-|z|)^\alpha \omega(|z|) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Gamma(1+\alpha+n)}{\Gamma(1+\alpha)\Gamma(1+n)} |z|^n d|z| \leq 2 \int_0^1 \frac{\omega(|z|)}{1-|z|} d|z|, \end{aligned}$$

следовательно

$$|E_\alpha^{(4)}(a)| \leq c_{12}. \quad (2.15)$$

Из неравенств (2.15) и (2.13), согласно (2.12), получаем доказательство леммы.

Лемма 2.4. При любых $-1 < a < \infty$ и $\frac{1}{2} \leq |a| < 1$ справедливы оценки

$$J_1(a) = \int_{L(|z| < |a|)} (1-|z|)^\alpha \omega(|z|) \lg |A_\alpha(z, a)| d|z| \geq -c_{13} (1-|a|)^{1+\alpha}, \quad (2.16)$$

$$J_2(a) = \int_{L(|z| > |a|)} (1-|z|)^\alpha \omega(|z|) \lg |A_\alpha(z, a)| d|z| \geq -c_{14} (1-|a|)^{1+\alpha}. \quad (2.16')$$

Доказательство. Так как в интеграле $J_1(a)$ $|z| < |a|$, то, согласно лемме 2.1, получим

$$\begin{aligned} J_1(a) &\geq \int_0^{|a|} (1-t)^\alpha \omega(t) \lg |A_\alpha(t, |a|)| dt = \\ &= \int_0^{|a|} (1-t)^\alpha \omega(t) dt \int_{|a|}^1 \frac{(1-x)^\alpha}{x} dx - \int_0^{|a|} (1-t)^\alpha \omega(t) \left\{ \int_{|a|}^1 \frac{(1-x)^\alpha}{\left(1 - \frac{t|a|}{x}\right)^{1+\alpha}} \frac{dx}{x} \right\} dt - \\ &\quad - \int_0^{|a|} (1-t)^\alpha \omega(t) \left\{ \int_{|a|}^1 \frac{(1-x)^\alpha}{\left(1 - \frac{tx}{|a|}\right)^{1+\alpha}} \frac{dx}{x} \right\} dt \geq \\ &\geq \frac{1}{1+\alpha} (1-|a|)^{1+\alpha} - J_\alpha^{(4)}(a) - J_\alpha^{(8)}(a). \end{aligned}$$

Отсюда утверждение леммы (2.15) получается, в силу лемм 1.4 и 1.5.

Для доказательства неравенства (2.16) разобьем $J_2(a)$ на сумму двух интегралов:

$$\begin{aligned} J_2(a) &= \int_{|a|}^1 (1-|z|)^\alpha \omega(|z|) \lg \left| 1 - \frac{|z|}{|a|} \right| d|z| - \\ &\quad - \int_{L(|z| > |a|)} (1-|z|)^\alpha \omega(|z|) \operatorname{Re} W_\alpha(z; a) d|z|, \end{aligned}$$

остальное вытекает из леммы 1.1 и 2.2.

Лемма 2.5. При любых $-1 < \alpha < \infty$ и $\frac{1}{2} \leq |a| < 1$ для интеграла

$$J(a) = \int_L (1-|z|)^\alpha \omega(|z|) \lg |A_\alpha(z; a)| d|z|$$

справедлива оценка

$$J(a) \geq -c_{15} (1-|a|)^{1+\alpha}. \quad (2.18)$$

Доказательство. Разобьем интеграл $J(a)$ на два интеграла

$$J(a) = J_1(a) + J_2(a),$$

где

$$J_1(a) = \int_{L(|z| < |a|)} (1-|z|)^{\alpha} \omega(|z|) \lg |A_{\alpha}(z; a)| d|z|,$$

$$J_2(a) = \int_{L(|z| > |a|)} (1-|z|)^{\alpha} \omega(|z|) \lg |A_{\alpha}(z; a)| d|z|,$$

тогда оценка (2.18) следует из леммы 2.4.

Теперь можно доказать основной результат настоящего параграфа, в котором в качестве специального случая, когда $a=0$, содержится теорема, установленная А. Л. Шагиняном для функции Бляшке [3].

Теорема 1. При любом $-1 < \alpha < \infty$ для сходящегося произведения $B_{\alpha}(z; a_{\mu})$ справедливо неравенство

$$\int_L (1-|z|)^{\alpha} \omega(|z|) \lg |B_{\alpha}(z; a_{\mu})| d|z| > -\infty. \quad (2.19)$$

Доказательство. Из определения (2.6) функции $B_{\alpha}(z; a_{\mu})$ имеем

$$\begin{aligned} \int_L (1-|z|)^{\alpha} \omega(|z|) \lg |B_{\alpha}(z; a_{\mu})| d|z| &= \sum_{\mu=1}^{\infty} \int_0^1 \omega(|z|) (1-|z|)^{\alpha} \\ &- |z|^{\alpha} \lg |A_{\alpha}(z; a_{\mu})| d|z| = \sum_{|a_{\mu}| < \frac{1}{2}} J(a_{\mu}) + \sum_{|a_{\mu}| > \frac{1}{2}} J(a_{\mu}) \geq \\ &\geq -n \left(\frac{1}{2} \right) \max_{0 < |a| < \frac{1}{2}} J_{\alpha}^{(5)}(a) - c_{15} \sum_{|a_{\mu}| > \frac{1}{2}} (1-|a_{\mu}|)^{1+\alpha}, \end{aligned}$$

где $n \left(\frac{1}{2} \right)$ — число нулей a_{μ} функции $B_{\alpha}(z; a_{\mu})$, удовлетворяющих не-

равенству $|a_{\mu}| \leq \frac{1}{2}$. Теорема следует из леммы 2.3 и условия сходимости произведения $B_{\alpha}(z; a_{\mu})$.

2.2°. Неулучшаемость основной теоремы 1. В данном пункте мы установим, что для справедливости неравенства типа (2.19) присутствие множителя типа функции $\omega(t) \in \mathfrak{Q}$ необходимо. А именно, полагая, что $\{a_{\mu}\}_1^{\infty}$ — произвольная неубывающая последовательность положительных чисел, удовлетворяющая условию

$$\sum_{n=1}^{\infty} (1-|a_n|)^{1+\alpha} < \infty \quad (-1 < \alpha < \infty),$$

мы докажем, что для соответствующего произведения М. М. Джрбашяна $B_{\alpha}(z; a_{\mu})$ возможны случаи, когда

$$\int_{\Sigma} (1-|z|)^{\alpha} \lg |B_{\alpha}(z; a_n)| d|z| = -\infty.$$

Обозначая для $-1 < \alpha < \infty$ и $0 < a < 1$

$$g_k(a) \equiv \frac{1}{a^k} \left\{ \frac{1}{\alpha+1+k} \int_0^a (1-t)^{\alpha} t^{k-1} dt - \frac{1}{k} \int_0^{a^2} (1-t)^{\alpha} t^k dt \right\},$$

докажем сначала следующую лемму.

Лемма 2.6. Для любого $-1 < \alpha < \infty$ при $a \rightarrow 1-0$

$$\sum_{k=1}^{\infty} g_k(a) = O\left((1-a)^{1+\alpha} \lg \frac{1}{1-a}\right). \quad (2.20)$$

Доказательство. Заметим сначала же, что в случае $\alpha = 0$ утверждение леммы очевидно. В самом деле, при $\alpha = 0$ имеем

$$g_k(a) = \frac{1-a^{k+2}}{k(k+1)},$$

и так как

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a^k}{k(k+1)} = 1 + \left(1 - \frac{1}{a}\right) \lg \frac{1}{1-a} \quad (0 < a < 1), \quad (2.21)$$

то

$$g_k(a) = 1 - a^2 + a(1-a) \lg \frac{1}{1-a} = O\left((1-a) \lg \frac{1}{1-a}\right).$$

Для $-1 < \alpha < \infty$, так как

$$\gamma_{\alpha, k} \equiv \frac{\Gamma(1+\alpha) \Gamma(k)}{\Gamma(1+\alpha+k)} = \int_0^1 (1-t)^{\alpha} t^{k-1} dt \quad (-1 < \alpha < \infty, k = 1, 2, \dots),$$

то функцию $g_k(a)$ можно представить в следующем виде:

$$g_k(a) = \frac{a^{-k}}{k\gamma_{\alpha, k}} \left[\int_0^a (1-t)^{\alpha} t^{k-1} dt \int_0^1 (1-x)^{\alpha} x^k dx - \int_0^{a^2} (1-t)^{\alpha} t^k dt \times \right. \\ \left. \times \int_0^1 (1-x)^{\alpha} x^{k-1} dx \right], \quad (2.22)$$

откуда вытекает следующая оценка:

$$-\frac{a^{-k}}{k\gamma_{\alpha, k}} \int_0^{a^2} (1-t)^{\alpha} t^k dt \int_0^1 (1-t)^{\alpha} t^{k-1} dt \leq g_k(a) \leq \\ \leq \frac{a^{-k}}{k\gamma_{\alpha, k}} \int_0^a (1-t)^{\alpha} t^{k-1} dt \int_0^1 (1-t)^{\alpha} t^k dt. \quad (2.23)$$

Полагая сначала, что $-1 < a < 0$, из (2.23) получим

$$g_k(a) \leq \frac{1}{k} \frac{\int_0^1 (1-at)^{\alpha} t^{k-1} dt}{\int_0^1 (1-t)^{\alpha} t^{k-1} dt} \int_{a^2}^1 (1-t)^{\alpha} t^k dt \leq \frac{1}{k} \int_{a^2}^1 (1-t)^{\alpha} t^k dt. \quad (2.24)$$

Используя теперь левое из неравенств (2.23), приходим к оценке

$$\begin{aligned} g_k(a) &\geq -\frac{a}{1+a+k} \frac{\int_0^1 (1-at)^{\alpha} t^k dt}{\int_0^1 (1-t)^{\alpha} t^k dt} \int_{a^2}^1 (1-t)^{\alpha} t^{k-1} dt \geq \\ &\geq -\frac{a}{1+a+k} \int_{a^2}^1 (1-t)^{\alpha} t^{k-1} dt. \end{aligned} \quad (2.25)$$

Из (2.24) и (2.25) следует, что

$$g_k(a) = O\left(\frac{1}{k} \int_{a^2}^1 (1-t)^{\alpha} t^k dt\right), \quad a \rightarrow 1-0.$$

Отсюда вытекает, что при $a \rightarrow 1-0$

$$\sum_{k=1}^{\infty} g_k(a) = O\left(\int_a^1 (1-t)^{\alpha} \lg \frac{1}{1-t} dt\right) = O\left((1-a)^{1+\alpha} \lg \frac{1}{1-a}\right),$$

т. е. утверждение леммы.

Полагая теперь, что $0 \leq a < \infty$, из (2.23) имеем

$$\begin{aligned} g_k(a) &\leq \frac{a^{-k}}{k\gamma_{\alpha,k}} \left[\int_0^{a^2} (1-t)^{\alpha} t^{k-1} dt + \int_{a^2}^a (1-t)^{\alpha} t^{k-1} dt \right] \int_{a^2}^1 (1-t)^{\alpha} t^k dt \leq \\ &\leq \frac{\int_0^1 (1-a^2 t)^{\alpha} t^{k-1} dt}{k \int_0^1 (1-at)^{\alpha} t^{k-1} dt} \int_{a^2}^1 (1-t)^{\alpha} t^k dt + \frac{\int_{a^2}^1 (1-t)^{\alpha} t^k dt}{k \int_0^1 (1-t)^{\alpha} t^{k-1} dt} \times \\ &\times \int_a^1 (1-at)^{\alpha} t^k dt \leq \max_{0 < t < 1} \left(\frac{1-a^2 t}{1-at} \right) \frac{1}{k} \int_a^1 (1-t)^{\alpha} t^k dt + \frac{1}{k} \int_a^1 (1-at)^{\alpha} t^k dt \leq \end{aligned}$$

$$\ll \frac{2^{\alpha}+1}{k} \int_a^1 (1-at)^{\alpha} t^k dt \leq (1-a)^{\alpha} (2^{\alpha}+1) \frac{1-a^{k+1}}{k(k+1)} \ll (2^{\alpha}+1)(1-a)^{\alpha} \frac{1-a^k}{k(k+1)}.$$

Используя теперь левостороннее неравенство (2.23), точно так же получим

$$g_k(a) \geq - \frac{(2^{\alpha}+1)(1-a)^{\alpha} \frac{1-a^k}{k}}{\alpha+1+k}. \quad (2.27)$$

Из неравенств (2.26) и (2.27) следует, что при $a \rightarrow 1-0$

$$\sum_{k=1}^{\infty} g_k(a) = O \left((1-a)^{\alpha} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1-a^k}{k(k+1)} \right), \quad (2.28)$$

откуда, согласно (2.21), следует утверждение леммы в случае $0 < \alpha < \infty$.

Итак, лемма полностью доказана.

Теорема 2. Если $\{a_{\mu}\}_1^{\infty}$ ($0 < a_{\mu} \leq a_{\mu+1} \leq 1$), то при любом $-1 < \alpha < \infty$ для неравенства

$$J_{\alpha} = \int_0^1 (1-x)^{\alpha} \lg |B_{\alpha}(x; a_{\mu})| dx > -\infty \quad (-1 < \alpha < \infty)$$

необходимо и достаточно, чтобы

$$\sum_{\mu=1}^{\infty} (1-a_{\mu})^{1+\alpha} \lg \frac{1}{1-a_{\mu}} < +\infty.$$

Доказательство. Из определения функции $B_{\alpha}(z; a_{\mu})$ следует, что

$$J_{\alpha} = \sum_{\mu=1}^{\infty} \int_0^1 (1-x)^{\alpha} \left\{ \lg \left| 1 - \frac{x}{a_{\mu}} \right| - \operatorname{Re} W_{\alpha}(x; a_{\mu}) \right\} dx. \quad (2.29)$$

Рассмотрим интеграл

$$J_{\alpha}^{(1)} = \int_0^1 (1-x)^{\alpha} \left\{ \lg \left| 1 - \frac{x}{a} \right| - \operatorname{Re} W_{\alpha}(x; a_{\mu}) \right\} dx = J_{\alpha}^{(2)} - J_{\alpha}^{(3)} \quad (0 < a \leq 1).$$

Оценим теперь интеграл $J_{\alpha}^{(2)}$

$$J_{\alpha}^{(2)} = \int_0^a (1-x)^{\alpha} \lg \left(1 - \frac{x}{a} \right) dx + \int_a^1 (1-x)^{\alpha} \lg \left(\frac{x}{a} - 1 \right) dx = U_1 + U_2.$$

Найдем порядок интеграла U_2 при $a \rightarrow 1-0$

$$U_2 = \int_a^1 (1-x)^{\alpha} \lg\left(\frac{x}{a}-1\right) dx = \int_a^1 (1-x)^{\alpha} \lg(x-a) dx - \frac{(1-a)^{1+\alpha}}{1+\alpha} \lg a.$$

Так как

$$\int_a^1 (1-x)^{\alpha} \lg(x-a) dx = \frac{(1-a)^{1+\alpha}}{1+\alpha} \lg(1-a) + (1-a)^{1+\alpha} \times \\ \times \int_0^1 (1-t)^{\alpha} \lg t dt,$$

то

$$U_2 = O\left((1-a)^{1+\alpha} \lg \frac{1}{1-a}\right).$$

Заметим также, что

$$U_1 = \int_0^a (1-x)^{\alpha} \lg\left(1-\frac{x}{a}\right) dx + \int_a^1 (1-x)^{\alpha} \lg\left(1-\frac{x}{a}\right) dx,$$

где

$$\int_a^1 (1-x)^{\alpha} \lg\left(1-\frac{x}{a}\right) dx = O\left((1-a)^{1+\alpha} \lg \frac{1}{1-a}\right),$$

тогда будем иметь

$$J_a^{(2)} = \int_0^a (1-x)^{\alpha} \lg\left(1-\frac{x}{a}\right) dx + O\left((1-a)^{1+\alpha} \lg \frac{1}{1-a}\right). \quad (2.30)$$

Займемся теперь оценкой интеграла $J_a^{(3)}$. Заметим прежде всего, что

$$J_a^{(3)} = \int_0^1 (1-x)^{\alpha} dx \int_0^1 \frac{(1-x)^{\alpha}}{x} dx + \int_0^1 (1-x)^{\alpha} \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Gamma(1+\alpha+n)}{\Gamma(1+\alpha)\Gamma(1+n)} x^n a^{-n} \times \right. \\ \times \left. \int_0^a (1-t)^{\alpha} t^{n-1} dt \right\} dx - \int_0^1 (1-x)^{\alpha} \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Gamma(1+\alpha+n)}{\Gamma(1+\alpha)\Gamma(1+n)} x^n a^n \times \right. \\ \times \left. \int_a^1 (1-t)^{\alpha} t^{-n-1} dt \right\} dx = K_1 + K_2 + K_3.$$

Имеем

$$K_2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Gamma(1+\alpha+n)}{\Gamma(1+\alpha)\Gamma(1+n)} a^{-n} \int_0^1 (1-x)^{\alpha} x^{n-1} dx \int_0^1 (1-x)^{\alpha} x^n dx =$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^{-n}}{\alpha+1+n} \int_0^a (1-x)^{\alpha} x^{n-1} dx. \quad (2.31)$$

Далее

$$K_3 = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{\alpha+1+n} \int_a^1 (1-x)^{\alpha} x^{-n-1} dx. \quad (2.32)$$

Из (2.30) и (2.31), используя также лемму 2.6, получим

$$\begin{aligned} J_a^{(2)} + K_2 &= O\left((1-a)^{1+\alpha} \lg \frac{1}{1-a}\right) + \int_0^a (1-x)^{\alpha} \lg\left(1-\frac{x}{a}\right) dx + \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^{-n}}{\alpha+1+n} \int_0^a (1-x)^{\alpha} x^{n-1} dx = O\left((1-a)^{1+\alpha} \lg \frac{1}{1-a}\right) + \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} a^{-n} \left\{ \frac{1}{\alpha+1+n} \int_0^a (1-x)^{\alpha} x^{n-1} dx - \frac{1}{n} \int_0^a (1-x)^{\alpha} x^n dx \right\} = \\ &= O\left((1-a)^{1+\alpha} \lg \frac{1}{1-a}\right). \end{aligned} \quad (2.33)$$

Для K_3 имеем

$$K_3 = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{\alpha+1+n} \int_a^1 (1-x)^{\alpha} x^{-n-1} dx,$$

следовательно

$$K_3 = O\left(\int_a^1 (1-x)^{\alpha} \lg\left(1-\frac{a}{x}\right) dx\right) = O\left((1-a)^{1+\alpha} \lg \frac{1}{1-a}\right). \quad (2.34)$$

Так как непосредственно видно, что $K_1 = O((1-a)^{1+\alpha})$, то из (2.33) и (2.34) следует утверждение теоремы.

Теорема 2 показывает, что для неравенства типа (2.19) присутствие множителя $\omega(|z|)$ необходимо.

В самом деле, если $0 < a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_{\mu} \leq \dots < 1$ и

$$\sum_{\mu=1}^{\infty} (1-a_{\mu})^{1+\alpha} < \infty,$$

но тем не менее

$$\sum_{\mu=1}^{\infty} (1-a_{\mu})^{1+\alpha} \lg \frac{1}{1-a_{\mu}} = +\infty,$$

то

$$\int_0^1 (1-x)^{\alpha} \lg |B_{\alpha}(x; a_{\mu})| dx = -\infty.$$

§ 3. Интегральная оценка для функций классов N_α ($-1 < \alpha < \infty$)

Согласно основной теореме М. М. Джрбашяна о параметрическом представлении классов N_α [5, 6] имеем:

Класс N_α ($-1 < \alpha < \infty$) совпадает с множеством функций, допускающих представление

$$F(z) = cz^\lambda \frac{B_\alpha(z; a_p)}{B_\alpha(z; b_p)} \exp \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} S_\alpha(e^{-i\theta} z) d\psi(\theta) \right\}, \quad (3.1)$$

где c — постоянная, $\lambda \geq 0$ — целое число

$$S_\alpha(z) = \Gamma(1+\alpha) \left\{ \frac{2}{(1-z)^{1+\alpha}} - 1 \right\}, \quad (3.2)$$

$\psi(\theta)$ — произвольная вещественная функция с конечным полным изменением на $[0, 2\pi]$.

Согласно представлению (3.1), если функция $F(z) \in N_\alpha$ и не имеет нулей и полюсов, то ее можно представить в таком виде:

$$F(z) = c \cdot \exp \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} S_\alpha(e^{-i\theta} z) d\psi(\theta) \right\}.$$

Так как, согласно (3.2) имеем, что

$$|\lg |F(z)|| \leq \frac{c_{16}}{(1-|z|)^{1+\alpha}},$$

то следующая теорема доказывается непосредственно.

Теорема 3. Если непрерывная на $[0, 1)$ и не возрастающая функция $\omega(t)$ удовлетворяет условию

$$\int_0^1 \frac{\omega(t)}{1-t} dt < \infty,$$

то для функции вида (3.1) имеем

$$\int_L \omega(|z|) (1-|z|)^\alpha |\lg |F(z)|| d|z| > -\infty \quad (-1 < \alpha < \infty). \quad (3.3)$$

На основании представления (3.1) функции $W(z)$ класса N_α и теорем 1 и 3 получим основной результат настоящей статьи.

Теорема 4. Пусть функция $W(z) \in N_\alpha$ ($-1 < \alpha < \infty$) и $W(z) \neq 0$, $\omega(x) \in \Omega$. Тогда справедливо следующее неравенство:

$$\int_L \omega(|z|) (1-|z|)^\alpha |\lg |W(z)|| d|z| < \infty. \quad (3.4)$$

Если обозначим через A_α множество аналитических в круге $|z| < 1$ функций $f(z)$, принадлежащих классу N_α , то из теоремы 4 непосредственно вытекает следующая теорема единственности для функций класса A_α .

Теорема 5. Пусть $f(z) \in A_\alpha$ ($-1 < \alpha < \infty$) и $\omega(x) \in \Omega$. Тогда если

$$\int_L \omega(|z|)(1-|z|)^\alpha \lg |f(z)| d|z| = -\infty, \quad (3.5)$$

то $f(z) \equiv 0$.

В самом деле, если предположить, что $f(z) \not\equiv 0$, то согласно теореме 4, будем иметь

$$\int_L \omega(|z|)(1-|z|)^\alpha |\lg |f(z)|| d|z| < +\infty,$$

что противоречит условию (3.5).

Армянский государственный педагогический институт им. Х. Абовяна

Поступила 7.V.1973

Վ. Ս. ԶԱԿԱՐՅԱՆ. Աճի գնահատական N_α դասի մերոմորֆ ֆունկցիաների համար (ամփոփում)

Մ. Մ. Զրբաշյանը [6] մենագրությունում կառուցել էր միավոր շրջանում մերոմորֆ ֆունկցիաների α ($-1 < \alpha < \infty$) անընդհատ պարամետրից կախված N_α դասերի ֆակտորիզացման կատարյալ տեսությունը:

Ներկա հոդվածում, հենվելով այդ դասերի ֆակտորիզացման ներկայացումների վրա, [5] աշխատանքում պարունակվող գնահատման մեթոդներով հաստատվում են այդ ֆունկցիաների համար ինտեգրալ գնահատականներ և ապացուցվում վերջինների ճշտությունը համապատասխան դասերում:

Ասում ենք, որ ֆունկցիա $\omega(t) \in \Omega$ եթե $\omega(t)$ -ն կամայական անընդհատ և շահող ֆունկցիա է $[0, 1]$ հատվածում, որի համար $0 < \omega(t) < 1$ և

$$\int_0^1 \frac{\omega(t)}{1-t} dt < \infty.$$

Հետևյալ պնդումը տալիս է ներկա աշխատանքի հիմնական արդյունքը:

Քող ֆունկցիա $W(z) \in N_\alpha$ ($-1 < \alpha < \infty$) $W(z) \not\equiv 0$ և $(z) \in \Omega$. Ապա ճիշտ է հետևյալ անհավասարությունը.

$$\int_L \omega(|z|)(1-|z|)^\alpha |\lg |W(z)|| d|z| < \infty,$$

որտեղ L -ը շրջանի կենտրոնը $|z|=1$ շրջանի հետ միացնող ցանկացած ուղղի կոր է:

V. S. ZAKHARIAN. *A bound for the growth of functions from the N_α class (summary)*

In M. M. Djrbashian's monograph [6] a perfect theory of factorisation of the N_α classes of meromorphic in a circle functions, depending on a parameter α ($-1 < \alpha < \infty$) has been constructed.

In the present paper integral bounds for the functions from N_α are established and their exactness in the proper class is proved.

It is said, that $\omega(t) \in \Omega$, if $0 < \omega(t) < 1$, $\omega(t)$ is continuous, nonincreasing on $(0, 1)$ and

$$\int_0^1 \frac{\omega(t)}{1-t} dt < +\infty.$$

The main result of the paper states, that for $W(z) \in N_\alpha$ ($-1 < \alpha < \infty$), $W(z) \neq 0$ and $\omega \in \Omega$

$$\int_L \omega(|z|)(1-|z|)^\alpha \|g|W(z)|\| d|z| < \infty,$$

for every rectifiable curve L , connecting the center of the circle $|z|=1$ with its periphery.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Р. Неванлинна. Однозначные аналитические функции, М., Гостехиздат, 1941.
2. И. И. Привалов. Граничные свойства аналитических функций, М., 1950.
3. А. Л. Шагинян. Об одном основном неравенстве в теории функций и его приложениях, Изв. АН Арм.ССР, сер. физ-мат. наук, 12, № 1, 1959, 2-25.
4. М. М. Джрбашян. К проблеме представимости аналитических функций, Сообщения ин-та матем. и мех. АН Армянской ССР, вып. 2, 1948, 3-55.
5. В. С. Захарян. Теоремы единственности для некоторых классов функций, голоморфных в круге, Матем. сб., 63 (105), № 1, 1964, 3-22.
6. М. М. Джрбашян. Интегральные преобразования и представления функций в комплексной области, М., Изд. "Наука", 1966.
7. М. М. Джрбашян. Теория факторизации функций, мероморфных в круге, Матем. сб., 79 (121): 4 (5), 1969, 517-615.
8. Р. С. Галоян. О мероморфных функциях класса $N\{\omega\}$, Известия АН Арм.ССР, сер. матем., VII, № 5, 1972, 334-360.