ԴՕ ԿՈՆԴ ԽԱՆԻ

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАТОРОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
НЕКОТОРЫЕ КЛАССЫ МЕРОМОРФНЫХ ФУНКЦИЙ

В в е д е н и е

1°. Известно, что мультипликативные представления J -нерастягивающих оператор-функций играют большую роль в теории операторных узлов и линейных систем. С их помощью были построены и изучены модели широких классов операторов [2, 7].

В связи с открытием М. М. Джрбашяном [3—5] новых классов мероморфных функций, возникает вопрос об их интерпретации с точки зрения линейных систем.

В работах [1, 6] в рамках теории линейных узлов даются реализации некоторых классов мероморфных функций М. М. Джрбашяна. Настоящая работа продолжает исследование этих работ, она посвящена изучению операторов, реализующих функции классов D_p ($p = 0, 1, 2, \dots$). В работе показано, что операторы, дающие реализацию предельных множителей и конечных произведений элементарных множителей Джрбашяна будут ограниченными. Операторы, реализующие бесконечные произведения классов D_p ($p > 0$) при условии $\sum (1 - |r_k|) = \infty$, оказываются неограниченными, однако можно ввести новую метрику, в которой эти операторы становятся ограниченными. В работе исследуются также резольвента и спектр соответствующих операторов.

2°. Мы приведем здесь некоторые определения и результаты из [1, 6], необходимые для дальнейшего.

Определение 1: Совокупность L , состоящая из двух линейных пространств H, E и четырех линейных операторов $T: H \rightarrow H$; $\Phi: E \rightarrow H$; $\Psi: H \rightarrow E$; $K: E \rightarrow E$ называется линейным узлом, а оператор-функция

$$W(z; L) = K + z\Psi(I - zT)^{-1}\Phi: E \rightarrow E. \quad (0.1)$$

называется передаточной функцией узла L .

Если пространства гильбертовы, а операторы непрерывны и $\dim E = l$, a — орт в E , то $\Phi(ua) = uq$, $\Psi x = (x, p)a$, $K(ua) = uka$ ($q, p, x \in H$; $k, u \in E$). В этом случае будем писать $L = (T, H, q, p, E, k)$. Передаточная функция имеет вид:

$$W(z; L) = k + z((I - zT)^{-1}q, p).$$

Определение 2: Будем говорить, что линейный узел L является реализацией заданной в единичном круге функции $f(z)$, если $f(z)$ совпадает с передаточной функцией узла L .

Функция $F(z) \in D_p$ допускает представление [5, 6]

$$F(z) = Cz^n \frac{\pi_p(z; a_k)}{\pi_p(z; b_k)} S(z),$$

где

$$\pi_p(z; \zeta_k) = \prod_{k=1}^{\infty} M_p(z; \zeta_k),$$

$$M_p(z; \zeta) = \frac{\zeta - z}{1 - \bar{\zeta}z} \frac{|\zeta|}{\zeta} \exp \left\{ \sum_{j=1}^p \frac{(1 - |\zeta|^2)^j}{j} \left| \frac{2}{(1 - \bar{\zeta}z)^j} - 1 \right| \right\}, \quad (0.2)$$

$$S(z) = \exp \left\{ \frac{2p}{\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^1 (1 - \rho^2)^{p-1} \frac{\log |F(\rho e^{i\theta})|}{(1 - z\rho e^{-i\theta})^{p+1}} \rho d\rho d\theta \right\}. \quad (0.3)$$

Здесь произведение $\pi_p(z; \zeta_k)$ сходится тогда и только тогда, когда сходится ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} (1 - |\zeta_k|)^{p+1} < \infty, \quad 0 < |\zeta_n| \leq |\zeta_{n+1}| < 1.$$

В работе рассматриваются последовательности, удовлетворяющие этому условию.

Множитель $M_p(z; \zeta)$ вида (0.2) (с точностью до постоянного множителя) был введен М. М. Джрбашьяном [5].

Учитывая, что

$$\frac{2}{(1 - \bar{\zeta}z)^j} - 1 = \frac{1 + \bar{\zeta}z}{1 - \bar{\zeta}z} + \sum_{k=2}^j \frac{2 \bar{\zeta}z}{(1 - \bar{\zeta}z)^k}, \quad (0.4)$$

представим $M_p(z; \zeta)$ в виде

$$M_p(z; \zeta) = \frac{\zeta - z}{1 - \bar{\zeta}z} \frac{|\zeta|}{\zeta} \exp \left\{ \frac{1}{2} e_1(\zeta) \frac{1 + \bar{\zeta}z}{1 - \bar{\zeta}z} + \sum_{k=2}^p e_k(\zeta) \frac{\bar{\zeta}z}{(1 - \bar{\zeta}z)^k} \right\}, \quad (0.5)$$

где

$$e_k(\zeta) = \sum_{i=k}^p \frac{(1 - |\zeta|^2)^i}{i}. \quad (0.6)$$

Приведем известные [1,6] реализации элементарных множителей, которые нам понадобятся в дальнейшем.

а) Функция $\exp \left\{ \frac{1}{2} e_1(\zeta) \frac{1 + \bar{\zeta}z}{1 - \bar{\zeta}z} \right\}$ реализуется узлом [1]

$$H_1(\zeta) = L^2 \left(0, \frac{1}{2} e_1(\zeta) \right), \quad E = C_1,$$

$$|T_1(\zeta)f|(x) = \bar{\zeta}f(x) + 2\bar{\zeta} \int_0^x \exp(x-t)f(t) dt, \quad (0.7)$$

$$q_1(\zeta) = \exp x; \quad p_1(\zeta) = 2\bar{\zeta} \exp\left(\frac{1}{2}e_1(\zeta) - x\right); \quad k_1(\zeta) = \exp \frac{1}{2}e_1(\zeta).$$

Этот узел будем обозначать через $L(\zeta)$.

б) Множитель $\exp\left\{e_1(\zeta) \frac{\bar{\zeta}z}{(1-\bar{\zeta}z)^k}\right\}$ может быть реализован следующим узлом $L_k(\zeta)$ ($k = 2, 3, \dots, p$):

$$H_k(\zeta) = L^2(R^k, [0, e_k(\zeta)], E = C_1,$$

$$|T_k(\zeta)f|(x) = Bf(x) + \int_0^x (f(t), p_0)_{R^k} q_0 dt, \quad (0.8)$$

$$q_k(\zeta) = q_0, \quad p_k(\zeta) = p_0, \quad k_k(\zeta) = 1,$$

где

$$B = \begin{pmatrix} \bar{\zeta} & \bar{\zeta} & \dots & \bar{\zeta} \\ 0 & \bar{\zeta} & \dots & \bar{\zeta} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \bar{\zeta} \end{pmatrix}, \quad q_0 = \begin{pmatrix} \bar{\zeta} \\ \bar{\zeta} \\ \dots \\ \bar{\zeta} \end{pmatrix}, \quad p_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (0.9)$$

Несущественное отличие выражений (0.8) и (0.9) от соответствующих формул в работе [6] вызвано принятым нами определением (0.1) передаточной функции $\mathcal{W}(z; L)$, в то время как Л. Меграбян [6] исходит из функции $S(z; L) = \mathcal{W}(z^{-1}; L)$.

в) Множитель Бляшке $\frac{\zeta - z}{1 - \bar{\zeta}z} \frac{|\zeta|}{\zeta}$ реализуется узлом $L_{p+1}(\zeta)$

$$H_{p+1}(\zeta) = E = C_1; \quad T_{p+1}(\zeta)f = \bar{\zeta}f, \quad (0.10)$$

$$q_{p+1}(\zeta) = \sqrt{1 - |\zeta|^2}; \quad p_{p+1}(\zeta) = -\frac{|\zeta|}{\zeta} \sqrt{1 - |\zeta|^2}; \quad k_{p+1}(\zeta) = |\zeta|.$$

§ 1. Сцепление линейных узлов

Пусть имеются N ($N \leq \infty$) узлов $L^{(n)} = (T^{(n)}, H^{(n)}, q^{(n)}, p^{(n)}, E, K^{(n)})$, ($n = 1, 2, \dots, N$) с общим внешним одномерным пространством $E = C_1$. Пусть далее $H^{(n)}$ — гильбертовы пространства с метриками $(\cdot, \cdot)_n$ и сходится произведение $\prod_{n=1}^N k^{(n)}$. Тогда, применяя правило

сцепления узлов, введенное в [1], можем образовать узлы:

$$L = L^{(1)} V L^{(2)} V \dots V L^{(N)} = (T, X, q, p, E, k), \quad (1.1)$$

$$\bar{L} = L^{(N)} V \dots V L^{(2)} V L^{(1)} = (\bar{T}, \bar{X}, \bar{q}, \bar{p}, E, \bar{k}). \quad (1.2)$$

Пространства X и $\bar{X}$ представляют линейное многообразие элементов вида $\{x_n\}_{n=1}^N = (X_1, X_2, \dots, X_N)$, где $x_n \in H^{(n)}$. В случае $N < \infty$ мы будем считать, что $X = \bar{X} = \bigoplus_{n=1}^N H^{(n)}$ (см. [1]), а когда $N = \infty$ будем рассматривать X как линейное пространство.

Лемма 1.1. Операторы $T, \bar{T}$, элементы $q, p, \bar{q}, \bar{p}$ и числа $k, \bar{k}$ определяются следующими равенствами:

$$(TX)_n = T^{(n)} X_n + q^{(n)} \sum_{k=1}^{n-1} (x_k, p^{(k)})_k \prod_{s=k+1}^{n-1} k^{(s)}, \quad (1.3)$$

$$q = \left\{ q^{(n)} \prod_{s=1}^{n-1} k^{(s)} \right\}_{n=1}^N, \quad p = \left\{ p^{(n)} \prod_{s=n+1}^N k^{(s)} \right\}_{n=1}^N, \quad (1.4)$$

$$k = \bar{k} = \prod_{s=1}^N k^{(s)},$$

$$(\bar{T}X)_n = T^{(n)} x_n + q^{(n)} \sum_{k=n+1}^N (x_k, p^{(k)})_k \prod_{s=n+1}^{k-1} k^{(s)}, \quad (1.5)$$

$$\bar{q} = \left\{ q^{(n)} \prod_{s=n+1}^N k^{(s)} \right\}_{n=1}^N, \quad \bar{p} = \left\{ p^{(n)} \prod_{s=1}^{n-1} k^{(s)} \right\}_{n=1}^N. \quad (1.6)$$

Отсюда видно, что оператор Ψ , который определяется по формуле

$$\Psi x = a \sum_{k=1}^N (x_k, p_k)_k \equiv a(x, p), \quad (1.7)$$

определен только на векторах x , для которых сходится ряд в правой части (1.7). А операторы $\bar{T}$ и $\bar{\Psi}$ определены на векторах x , для которых сходится ряд

$$\sum_{n=1}^N (x_n, \bar{p}_n)_n. \quad (1.8)$$

Найдем формулы для операторов $(zI - T)^{-1}$ и $(zI - \bar{T})^{-1}$. Пусть $(zI - T)^{-1} x = f$, тогда

$$(zI - T^{(n)}) f_n - q^{(n)} \sum_{k=1}^{n-1} \left(f_k, p^{(k)} \prod_{s=k+1}^{n-1} k^{(s)} \right)_k = x_n. \quad (1.9)$$

Обозначая через y_n сумму

$$y_n = \sum_{k=1}^{n-1} \left(f_k, p^{(k)} \prod_{s=k+1}^{n-1} k^{(s)} \right)_k, \quad (1.10)$$

будем искать решение y_n в виде $y_n = v_n B(z; n)$, где

$$B(z; n) = \prod_{l=1}^{n-1} W(z^{-1}; L^{(l)}). \quad (1.11)$$

Учитывая (1.9)–(1.11) и соотношение $y_n - y_{n-1} k_{n-1} = (f_{n-1}, p^{(n-1)})$, получим

$$\begin{aligned} f_n &= (zI - T^{(n)})^{-1} x_n + \\ &+ (zI - T^{(n)})^{-1} q^{(n)} \sum_{k=1}^{n-1} ((zI - T^{(k)})^{-1} x_k, p^{(k)})_k B(z; k+1, n), \end{aligned} \quad (1.12)$$

где

$$B(z; k+1, n) = \prod_{s=k+1}^{n-1} W(z^{-1}; L^{(s)}).$$

Аналогично для $(zI - \tilde{T})^{-1} x = g$ мы имеем

$$\begin{aligned} g_n &= (zI - T^{(n)})^{-1} x_n + \\ &+ (zI - T^{(n)})^{-1} q^{(n)} \sum_{k=n+1}^N ((zI - T^{(k)})^{-1} x_k, p^{(k)})_k B(z; n+1, k). \end{aligned} \quad (1.13)$$

Имеет место

Предложение 1.1. Пусть $z \in \sigma(T^{(n)})$ и сходится произведение $\prod_{n=1}^N W(z; L^{(n)})$, тогда $(I - z\tilde{T})^{-1} \tilde{q} \in D(\mathbb{W})$ и $(I - z\tilde{T})^{-1} \tilde{q} \in (L)^\sim$

и имеет место соотношение

$$W(z, L) = W(z; \tilde{L}) = \prod_{n=1}^N W(z; L^{(n)}).$$

Доказательство. В случае $N < \infty$ эти утверждения очевидны, они вытекают из теоремы умножения передаточных функций ([1], теорема 1). Итак, пусть $N = \infty$ и $(I - zT)^{-1} q = y$, имеем

$$(I - zT^{(n)}) y_n - zq^{(n)} \sum_{k=1}^{n-1} (y_k, p^{(k)})_k \prod_{s=k+1}^{n-1} k^{(s)} = q^{(n)} \prod_{s=1}^{n-1} k^{(s)}. \quad (1.14)$$

Откуда, если $q^{(n)} = 0$, то $y_n = 0$ ($z \in \sigma(T^{(n)})$). Будем искать решение y_n (для тех n , для которых $q^{(n)} \neq 0$) в виде

$$y_n = (I - zT^{(n)})^{-1} q^{(n)} \prod_{s=1}^{n-1} k^{(s)} \cdot v_n. \quad (1.15)$$

Подставляя (1.15) в (1.14) и учитывая, что $q^{(n)} \neq 0$, имеем

$$v_n - z \sum_{s=1}^{n-1} ((I - z T^{(s)})^{-1} q^{(s)}, p^{(s)})_s \frac{v_s}{k^{(s)}} = 1, \quad (1.16)$$

откуда получим

$$v_n = \left[\prod_{s=1}^{n-1} k^{(s)} \right]^{-1} \prod_{s=1}^{n-1} W(z; L^{(s)}), \quad (1.17)$$

и

$$y_n = (I - z T^{(n)})^{-1} q^{(n)} \prod_{s=1}^{n-1} W(z; L^{(s)}). \quad (1.18)$$

Из (1.15) и (1.4) имеем

$$(y, p) = k \sum_{k=1}^{\infty} ((I - z T^{(k)})^{-1} q^{(k)}, p^{(k)})_k \frac{v_k}{k^{(k)}}. \quad (1.19)$$

Отсюда и из (1.16) при $n \rightarrow \infty$ получим

$$(y, p) = \frac{1}{z} (k v_{\infty} - 1),$$

что вместе с определением 1 передаточной функции дает доказательство предложения 1.1 для L . Аналогично доказываются утверждения, относящиеся к узлу $\bar{L}$.

§ 2. Свойства операторов, реализующих произведение Джрбашяна класса D_p

1°. Чтобы получить реализацию для элементарного множителя $M_p(z; \zeta)$ вида (0.5) достаточно взять сцепление:

$$L(\zeta) := L_1(\zeta) \vee L_2(\zeta) \vee \dots \vee L_{p+1}(\zeta) \equiv (T(\zeta), H(\zeta), q(\zeta), p(\zeta), E, k(\zeta)), \quad (2.1)$$

где $L_k(\zeta)$ ($k = 1, 2, \dots, p+1$) определены по (0.7)–(0.10), пространство $H(\zeta)$ гильбертово $\left(H(\zeta) = \bigoplus_{k=1}^{p+1} H_k(\zeta) \right)$.

Для оператора $T(\zeta)$ узла (2.1) справедливы следующие простые предложения, доказательство которых следует из явного вида оператора.

Лемма 2.1. а) Существует число C , не зависящее от ζ ($|\zeta| < 1$) такое, что

$$\|T(\zeta)\| \leq C.$$

б) Спектр оператора $T(\zeta)$ состоит из единственной точки $\bar{\zeta}$. Точка $\bar{\zeta}$ является одновременно собственным значением и су-

щественной особой точкой резольвенты $(zI - T(\zeta))^{-1}$. Собственные элементы оператора $T(\zeta)$ имеют вид $(0, 0, \dots, h_{p+1})$, где $h_{p+1} \in H_{p+1}(\zeta)$.

в) Пусть ζ пробегает множество M точек из круга $|\zeta| < 1$, и точка z не принадлежит замыканию множества сопряженных точек $\bar{\zeta}$ ($\zeta \in M$), тогда существует число A , не зависящее от ζ , такое, что

$$\|zI - T(\zeta)\|^{-1} \leq A.$$

г) При $p > 0$ область значений оператора $\bar{\zeta}I - T(\zeta)$ плотна в $H(\zeta)$.

2°. Приступаем к рассмотрению оператора, реализующего произведение М. М. Джрбашяна. Согласно теореме умножения передаточных функций (предложение 1.1), произведение $\pi_p(z; \zeta_n)$ имеет реализации

$$L = \bigvee_{n=1}^{\infty} L(\zeta_n), \quad \bar{L} = \bigvee_{n=1}^{\infty} \bar{L}(\zeta_n). \quad (2.2)$$

Составляющие элементы узлов L и $\bar{L}$ выражаются по (1.3) – (1.6), но вместо узлов $L^{(n)}$ надо взять $L(\zeta_n)$. Основные пространства X и $\bar{X}$ представляют пространство последовательностей $x = \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ ($x_n \in H(\zeta_n)$). Мы будем считать как и в п° 1, что пространства $H(\zeta_n)$ снабжены гильбертовыми метриками. Обозначим через H пространство последовательностей $x = \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ ($x_n \in H(\zeta_n)$) с нормой $\|x\|^2 \equiv \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|_n^2 < \infty$, и будем изучать свойства операторов $T, \bar{T}$ узлов

$L, \bar{L}$ в этом пространстве H . Как было показано в п. 1 точка $\bar{\zeta}$ есть точка спектра оператора $T(\zeta)$. Введем обозначение

$$\Lambda = \{\bar{\zeta}_n\}_{n=1}^{\infty}. \quad (2.3)$$

Имеет место предложение.

Лемма 2.2. Пусть $z \notin \bar{\Lambda}$ (замыкание множества Λ) и

$$\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |\zeta_n|) = \infty, \quad (2.4)$$

тогда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|(zI - T(\zeta_n))^{-1} q(\zeta_n)\|^2 = \infty, \quad (2.5)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|(\bar{z}I - T^*(\zeta_n))^{-1} p(\zeta_n)\|^2 = \infty. \quad (2.6)$$

Доказательство. Докажем сначала (2.5). Если рассмотреть $L(\zeta_n)$ как сцепление $(p+1)$ узлов, то формула (1.18) дает

$$[(zI - T(\zeta_n))^{-1} q(\zeta_n)]_k = (zI - T_k(\zeta_n))^{-1} q_k(\zeta_n) v_k(\zeta_n; z), \quad (2.7)$$

где

$$v_k(\zeta_n; z) = \prod_{j=1}^{k-1} W(z^{-1}; L_j(\zeta_n)).$$

В силу сходимости произведения Джрбашьяна $\lim_{|z| \rightarrow 1} |v_k(\zeta_n; z)| = 1$.

Так как $z \notin \bar{\Delta}$, то $|(z - \bar{\zeta}_k)^{-1}| > C$, где C не зависит от ζ_k . Тогда из (2.7) имеем

$$\begin{aligned} \|[(zI - T(\zeta_n))^{-1} q(\zeta_n)]\|_{H(\zeta_n)}^2 &> \|[(zI - T(\zeta_n))^{-1} q(\zeta_n)]\|_{p+1, H(\zeta_n)}^2 = \\ &= |(z - \bar{\zeta}_n)^{-1}|^2 (1 - |\zeta_n|^2) |v_{p+1}(\zeta_n; z)|^2 > C' (1 - |\zeta_n|^2). \end{aligned}$$

Отсюда следует (2.5). Равенство (2.6) доказывается аналогично.

Теорема 2.1. Пусть

$$\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |\zeta_n|) = \infty,$$

тогда

1) Каналовые векторы p, q и $\tilde{p}, \tilde{q}$ соответственно узлов L и $\tilde{L}$ не принадлежат H .

2) Операторы T и $\tilde{T}$ неограничены и их области определения плотны в H , и спектр каждого из них покрывает всю комплексную плоскость.

Доказательство 1. Учитывая (0.5)–(0.8) и (1.3), имеем

$$\begin{aligned} \|q(\zeta_n)\|_{H(\zeta_n)}^2 &= \frac{1}{2} [\exp e_1(\zeta_n) - 1] + (1 - |\zeta_n|^2) \exp e_1(\zeta_n) + \\ &+ \sum_{k=2}^p k |\zeta_n|^2 e_k(\zeta_n) \exp e_1(\zeta_n), \end{aligned} \quad (2.8)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|q(\zeta_n)\|_{H(\zeta_n)}^2 \prod_{l=1}^{n-1} k^2(\zeta_l) > C \sum_{n=1}^{\infty} (1 - |\zeta_n|).$$

Последнее неравенство следует из (2.8) и из сходимости произведения $\prod_{l=1}^{\infty} k^2(\zeta_l)$. Значит $q \notin H$. Для $p, \tilde{q}$ и $\tilde{p}$ доказательство аналогично.

2. Оператор $\tilde{T}$ определен на плотном множестве элементов вида $(x_1, x_2, \dots, x_N, 0, 0, \dots) \quad \forall N < \infty$. (2.9)

Оператор T определен на векторах вида (2.9) с дополнительным условием

$$\sum_{k=1}^N (x_k, p_k)_k = 0, \quad (2.10)$$

где $p_k = p(\zeta_k) \prod_{l=k+1}^N k(\zeta_l)$ — k -ая компонента вектора p . Если некоторый вектор $y \in H$ ортогонален ко всем векторам вида (2.9) и (2.10), то он должен иметь вид $y = cp$. С другой стороны, как было показано в 1) вектор p не принадлежит H , следовательно $c = 0$, значит $y = 0$.

Пусть $z \in \bar{\Lambda}$, резольвенту $(zI - T)^{-1}$, в силу (1.12), можно рассматривать как сумму двух операторов, первый из которых ограничен в силу леммы 2.1 (в). Поэтому достаточно рассматривать второй оператор, который обозначаем через $R_2(z, T)$.

Полагая $x = (x_1, 0, \dots)$, где x_1 удовлетворяет условию

$$s = ((zI - T(\zeta_1))^{-1} x_1, p(\zeta_1)) \neq 0,$$

имеем

$$[R_2(z, T)x]_n = s(zI - T(\zeta_n))^{-1} q(\zeta_n) B(z; 2, n).$$

В силу сходимости $B(z; 2, n)$ из леммы 2.2 следует, что вектор x не принадлежит области определения оператора $R_2(z, T)$. Таким образом, мы показали, что $z \in \sigma(T)$, значит

$$C \setminus \bar{\Lambda} \subset \sigma(T).$$

С другой стороны, поскольку множество $\bar{\Lambda}$ нигде не плотно в C , то из замкнутости спектра мы получим $C = \sigma(T)$. Что касается $\tilde{\Lambda}$, то из (1.13) и леммы 2.2 (формула 2.6) можно показать, что $(zI - \tilde{T})^{-1}$ также неограничен при $z \in \bar{\Lambda}$, следовательно $C = \sigma(\tilde{T})$. Так как спектры $\sigma(T)$ и $\sigma(\tilde{T})$ покрывают всю плоскость, то операторы T и $\tilde{T}$ неограничены. Теорема доказана.

Следующая теорема дает более точную характеристику спектров операторов T и $\tilde{T}$. Для этого обозначим через $P_\sigma(A)$ и $C_\sigma(A)$ соответственно точечный и непрерывный спектры оператора A в смысле [13].

Теорема 2.2. Пусть $\sum (1 - |\zeta_n|) = \infty$, тогда

$$1. \quad P_\sigma(\tilde{T}) = \Lambda, \quad C_\sigma(\tilde{T}) = C \setminus \Lambda, \quad (2.11)$$

$$2. \quad C_\sigma(T) \supset C \setminus \Lambda. \quad (2.12)$$

Если последовательность ζ_n такая, что

$$\sum_{k=1}^m \left[M_p \left(\frac{1}{\bar{\zeta}_m}; \zeta_k \right) - M_p (0; \zeta_k) \right] \prod_{l=k+1}^m M_p \left(\frac{1}{\bar{\zeta}_m}; \zeta_l \right) + 1 \neq 0, \quad (2.13)$$

где $\sum^m$ обозначает сумму с пропущенным m -ым членом, элементарный множитель Джрбашьяна, определяющийся по (0.2), то

$$\bar{\zeta}_m \in C_o (7). \quad (2.14)$$

Таким образом, если (2.13) имеет место для всех натуральных m , то

$$C = C_o (7). \quad (2.15)$$

Замечание. Ряд (2.13) сходится в силу сходимости произведения М. М. Джрбашьяна.

Доказательство. Соотношения (2.11) следуют из формулы сцепления (1.5) и того, что $\bar{\zeta}_n$ есть собственное значение оператора $T(\zeta_n)$.

2. Для $z \in \Lambda$ неограниченный оператор $(zI - T)^{-1}$ определен на векторах вида (2.9) с дополнительным условием

$$\sum_{k=1}^N (x_k, s_k)_k = 0,$$

причем

$$s_k = (\bar{z}I - T^*(\zeta_k))^{-1} p(\zeta_k) B(z; k+1, \infty).$$

В силу леммы 2.2 и сходимости $B(z; k+1, \infty)$ последовательность $s = \{s_k\}_{k=1}^{\infty}$ не принадлежит H , тогда как в теореме 2.1 получим, что область определения оператора $(zI - T)^{-1}$ плотна в H .

Докажем теперь (2.14). Решение уравнения $(\bar{\zeta}_m I - T)x = y$ имеет вид

$$x_n = \left(\begin{aligned} & (\bar{\zeta}_m I - T(\zeta_n))^{-1} y_n + \\ & + (\bar{\zeta}_m I - T(\zeta_n))^{-1} q(\zeta_n) \sum_{k=1}^{n-1} ((\bar{\zeta}_m I - T(\zeta_k))^{-1} y_k, p(\zeta_k))_k \times \\ & \quad \times B(\bar{\zeta}_m; k+1, n), (n < m) \\ & (\bar{\zeta}_m I - T(\zeta_n))^{-1} y_n + (\bar{\zeta}_m I - T(\zeta_n))^{-1} \times \\ & \times \sum_{k=1}^{n-1} ((\bar{\zeta}_m I - T(\zeta_k))^{-1} y_k, p(\zeta_k))_k B(\bar{\zeta}_m; k-1, n) + \\ & + A(\bar{\zeta}_m I - T(\zeta_n))^{-1} q(\zeta_n) \prod_{s=m+1}^{n-1} k(\zeta_s) \left[1 + \right. \\ & \left. + \sum_{k=1}^{n-1} ((\bar{\zeta}_m I - T(\zeta_k))^{-1} q(\zeta_k), p(\zeta_k))_k B(\bar{\zeta}_m; k-1, n) \right], \end{aligned} \right) \quad (n > m) \quad (2.16)$$

где

$$A = (x_m, p(\zeta_m)).$$

Выражение, стоящее в квадратных скобках, в силу (2.13) сходится к некоторому отличному от нуля числу. Следовательно, если $y = 0$, то $A = 0$, иначе $x \notin H$. В случае $y = 0$ x_m будет собственным вектором оператора $T(\zeta_m)$, тогда в силу общего вида собственного вектора (лемма 2.1) и $A = 0$ следует $x_m = 0$, таким образом $x = 0$.

Докажем плотность области определения оператора $(\bar{\zeta}_m I - T)^{-1}$. Действительно, этот оператор определен на векторах вида (см. (2.16))

$$y = (y_1, y_2, \dots, y_N, 0, 0, \dots), \quad \forall N < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^N (y_k, (\bar{\zeta}_m I - T^*(\zeta_k))^{-1} p(\zeta_k))_k B(\bar{\zeta}_m; k+1, \infty) = 0, \quad (2.17)$$

и y_m взята из области значений оператора $(\bar{\zeta}_m I - T(\zeta_m))$, которая сама плотна в $H(\zeta_m)$ по лемме 2.1 (в рассматриваемом случае $p > 0$, поэтому лемма 2.1 применима). Следует отметить также, что вектор $x = (\bar{\zeta}_m I - T)^{-1} y$ в этом случае имеет вид

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_N, 0, \dots),$$

а компонента x_n должна удовлетворять условию

$$(x_m, p(\zeta_m)) = 0.$$

Совокупность векторов (2.17), в силу леммы 2.2, будет плотна в H , теорема доказана.

Теорема 2.3. Если

$$\sum_{m=1}^{\infty} (1 - |\zeta_m|) < \infty,$$

то операторы T и $\bar{T}$ ограничены и

$$\sigma(T) = P_\sigma(T) \cup C_\sigma(T) = \bar{\Lambda} = \sigma(\bar{T}) = P_\sigma(\bar{T}) \cup C_\sigma(\bar{T}),$$

$$P_\sigma(T) = P_\sigma(\bar{T}) = \Lambda.$$

Доказательство. Из (2.8), учитывая (0.5), мы получим

$$\|q(\zeta_n)\|_{H(\zeta_n)}^2 \leq C(1 - |\zeta_n|), \quad (2.18)$$

C не зависит от ζ_n . Отсюда $q \in H$ (из условия теоремы), аналогичным образом имеем также $p, \bar{q}, \bar{p} \in H$.

Из формул сцеплений (1.3), (1.5) и (2.18), а также из условия теоремы следует ограниченность операторов T и $\bar{T}$. Пусть $z \in \bar{\Lambda}$, тогда с помощью (1.12)—(1.13), леммы 2.1 и условия теоремы нетрудно

показать ограниченность операторов $(zI - T)^{-1}$ и $(zI - \tilde{T})^{-1}$, т. е. $z \in \rho(T)$ и $z \in \rho(\tilde{T})$.

То, что $\bar{z}_m \in P_o(\tilde{T})$ очевидно, а $\bar{z}_m \in P_o(T)$ следует из (2.16) и условия теоремы. Таким образом

$$\sigma(T) = \bar{\Lambda} = \sigma(\tilde{T}),$$

а предельная точка множества Λ (если она имеется), очевидно, принадлежит непрерывному спектру $C_o(T)$, $C_o(\tilde{T})$. Теорема доказана.

§ 3. Введение новой метрики

Как было показано в § 2, операторы T и $\tilde{T}$ вообще неограниченны. В этом параграфе покажем, что можно ввести новую метрику, в которой операторы окажутся ограниченными.

Напомним, что H есть пространство последовательностей $x = \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, $x_n \in H(\zeta_n)$ с нормой

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 < \infty. \quad (3.1)$$

Будем рассматривать еще совокупность H_+ векторов $x \in H$, для которых сходится ряд

$$\|x\|_+^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 (1 - |\zeta_n|)^{-2\rho n} < \infty. \quad (3.2)$$

Очевидно, что H_+ всюду плотно в H и является полным гильбертовым пространством относительно метрики

$$(x, y)_+ = \sum_{k=1}^{\infty} (x_k, y_k)_k (1 - |\zeta_k|)^{-2\rho k}.$$

Как нетрудно видеть, сопряженное к нему пространство будет обладать нормой

$$\|x\|_-^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 (1 - |\zeta_n|)^{2\rho n}. \quad (3.3)$$

Это пространство обозначается через H_- . Из (3.1)–(3.3) видно, что

$$\|x\|_- \leq \|x\| \leq \|x\|_+, \quad x \in H_+,$$

значит $H_+ \subseteq H \subseteq H_-$.

Пространства H_+ и H_- , согласно Ю. М. Березанскому [12], называются соответственно пространствами с положительной и отрицательной

метриками, или пространствами основных и обобщенных элементов гильбертова пространства H .

Теорема 3.1. *Справедливы следующие утверждения:*

1. Каналовые векторы q , p и $\bar{q}$, $\bar{p}$ узлов $L = \bigvee_{n=1}^{\infty} L(\zeta_n)$ и $\bar{L} = \bigvee_{n=1}^{\infty} L(\bar{\zeta}_n)$, соответственно, являются обобщенными элементами гильбертова пространства H , т. е. они принадлежат H_- .

2. Оператор $\bar{T}$ узла $\bar{L}$ ограничен в метрике $(\cdot, \cdot)_+$ (т. е. $\bar{T}$, рассматриваемый как оператор из H_+ в H_- , будет ограничен).

3. Оператор T узла L ограничен в метрике $(\cdot, \cdot)_-$.

4. В соответствующих метриках для их спектров имеют место соотношения:

$$\begin{aligned} \sigma_+(\bar{T}) &= P_{\sigma_+}(\bar{T}) \cup C_{\sigma_+}(\bar{T}) = \bar{\Lambda} = \sigma_-(T) = \\ &= P_{\sigma_-}(T) \cup C_{\sigma_-}(T); \quad P_{\sigma_+}(\bar{T}) = P_{\sigma_-}(T) = \Lambda. \end{aligned}$$

Доказательство 1. Следует из (2.24) и сходимости ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |\zeta_n|)^{p+1} < \infty$$

(и из явных формул (1.4), (1.6) для p , q , $\bar{p}$, $\bar{q}$),

2. Так как оператор $\bar{T}$ есть сумма двух операторов, в силу леммы 2.1 (а) первый оператор ограничен. Рассмотрим второй оператор $\bar{T}_2$:

$$\begin{aligned} \|\bar{T} x\|_+^2 &= \sum_{n=1}^{\infty} |q(\zeta_n)|_n^2 \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} (x_k, p(\zeta_k))_k \prod_{l=n+1}^{k-1} k(\zeta_l) \right|^2 (1 - |\zeta_n|)^{-2pn}, \quad (3.4) \\ x &= (x_1, x_2, \dots) \in H_+. \end{aligned}$$

Имеем

$$\begin{aligned} & (1 - |\zeta_n|)^{-2pn - p} \left| \sum_{k=n+1}^N (x_k, p(\zeta_k))_k \prod_{l=n+1}^{k-1} k(\zeta_l) \right|^2 < \\ & \leq (1 - |\zeta_n|)^{-2pn - p} \sum_{k=n+1}^N \|x\|^2 (1 - |\zeta_k|)^{-p} \sum_{k=n+1}^N \|p(\zeta_k)\|^2 (1 - |\zeta_n|)^p \sum_{l=n+1}^{k-1} k^2(\zeta_l). \end{aligned} \quad (3.5)$$

Учитывая, что

$$|z_1| \leq |z_2| \leq \dots \leq |z_n| \leq |z_{n+1}| \leq \dots \leq 1,$$

мы имеем

$$\begin{aligned} & (1 - |z_n|)^{-2n\rho - \rho} \sum_{k=n+1}^N |x_k|^2 (1 - |z_k|)^{-\rho} \leq \\ & \leq \sum_{k=n+1}^N |x_k|^2 (1 - |z_k|)^{-2\rho(n+1)} \leq \sum_{k=n+1}^N |x_k|^2 (1 - |z_k|)^{-2\rho k} \leq |x|_+^2. \end{aligned} \quad (3.6)$$

В силу сходимости произведения $\prod_{l=1}^{\infty} k(z_l)$ и из (3.4)–(3.6), имеем

$$\|\tilde{T} x\|_+^2 \leq C \sum_{n=1}^{\infty} |q(z_n)|^2 (1 - |z_n|)^{\rho} \sum_{k=1}^{\infty} |p(z_k)|^2 (1 - |z_k|)^{\rho} \|x\|_+^2.$$

Ряды в правой части сходятся в силу (2.8), значит $\tilde{T}$ ограничен.

Доказательства утверждений 3 и 4 аналогичны доказательству утверждения 2 и теоремы 2.3.

§ 4. Предельный множитель

Из (0.5) и (0.4) следует, что предельный множитель $S(z)$ с точностью до постоянного множителя представляется в виде

$$S(z) = \exp \left\{ \frac{2\rho}{\pi} \int_0^1 \int_0^{2\pi} \rho (1 - \rho^2)^{\rho-1} \log |F(\rho e^{i\theta})| \sum_{k=1}^{\rho+1} \frac{z^k e^{-i\theta}}{(1 - z^k e^{-i\theta})^k} d\rho d\theta \right\}. \quad (4.1)$$

Для краткости введем обозначение

$$G(\rho, \theta) = \frac{2\rho\rho}{\pi} (1 - \rho^2)^{\rho-1} \log |F(\rho e^{i\theta})|. \quad (4.2)$$

Множитель

$$S(z) = \exp \left\{ \int_0^1 \int_0^{2\pi} G(\rho, \theta) \frac{z^k e^{-i\theta}}{(1 - z^k e^{-i\theta})^k} d\rho d\theta \right\} \quad (4.3)$$

имеет реализацию

$$H_k = l^2(R_k, [0, 1] \times [0, 2\pi]); E = C_1,$$

$$(A_k f)(\rho, \theta) = B(\rho, \theta) f(\rho, \nu) + G^{1/2}(\rho, \nu) \int_0^{\rho} \int_0^{2\pi} (f(x, t), p_0)_{R^k} q_0 \bar{G}^{1/2}(x, t) dx dt, \quad (4.4)$$

$$q_k(\rho, \theta) = G^{1/2}(\rho, \theta) q_0, \quad p_k(\rho, \theta) = G^{1/2}(\rho, \theta) p_0; \quad k_k = 1, \quad (4.5)$$

$$B(\rho, \theta) = \rho e^{-i\theta} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & \dots & 1 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & \cdot & 1 \end{pmatrix}, \quad q_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \cdot \\ \cdot \\ 1 \end{pmatrix}, \quad p_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \cdot \\ \cdot \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (4.6)$$

Этот узел будем обозначать через S_k . Эта реализация несущественно отличается от соответствующей реализации, полученной в [6]. Это отличие вызвано различными определениями передаточной функции (см. [6] и наше определение 1).

Имеет место утверждение.

Предложение 4.1. *Предельный множитель $S(z)$ имеет реализацию*

$$S = S_1 \vee S_2 \vee \dots \vee S_{p+1},$$

где S_k определены по (4.4)–(4.6). Каналовые векторы являются обычными элементами основного гильбертова пространства H узла S . Оператор (основной) A ограничен, его спектр составляет весь замкнутый единичный круг.

Доказательство. То, что каналовые векторы принадлежат пространству H , следует из сходимости интеграла (см. [5], стр. 28)

$$\frac{2p}{\pi} \int_0^1 \int_0^{2\pi} (1 - \rho^2)^{p-1} |\log |F(\rho e^{i\theta})|| |\rho d\rho d\theta| < \infty.$$

Остальные утверждения непосредственно следуют из (4.4)–(4.6).

Пусть $F(z) \in D_p$ и не имеет особенности в нуле, тогда она допускает представление

$$F(z) = C z^n \frac{\pi_p(z; a_r)}{\pi_p(z; b_k)} S(z).$$

Отсюда и из полученных выше результатов имеем: любая функция класса D_p , не имеющая особенности в нуле обладает (вообще говоря неограниченной) реализацией, однако в основное пространство можно ввести новую метрику, в которой основной оператор становится ограниченным.

§ 5. Об устойчивости операторов, реализующих элементарные множители М. М. Джрбашяна

Будем говорить, что оператор T сильно устойчивый, если его степени T^n сильно стремятся к нулю при $n \rightarrow \infty$. Инвариантное подпространство оператора T , на котором T^n сильно стремится к нулю при $n \rightarrow \infty$, будем называть подпространством сильной устойчивости.

1°. Как мы уже видели оператор T , реализующий элементарный множитель $M_p(z; \zeta)$ класса D_p , имеет спектр, сосредоточенный в одной точке ζ . Так как $|\zeta| < 1$, то согласно теореме Рота [11], он подобен некоторому истинному сжатию A (т. е. $\|A\| < 1$). Следовательно T сильно устойчив.

2°. Рассмотрим этот вопрос для самого простого не неванлинновского класса N_1 .

Как известно, элементарный множитель $A_1(z; \zeta)$ класса N_1 имеет вид (см. [3], [1])

$$A_1(z, \zeta) = \frac{\zeta - z}{1 - \bar{\zeta}z} \frac{|\zeta|}{\zeta} \bar{A}_1(z; \zeta), \quad (5.1)$$

где

$$\bar{A}_1(z; \zeta) = \exp \left(1 - |\zeta| - 2\bar{\zeta}z \log \frac{|\zeta| - \bar{\zeta}z}{1 - \bar{\zeta}z} \right). \quad (5.2)$$

Как показано в [1], множитель $\bar{A}_1(z, \zeta)$ имеет реализацию

$$H = L^2(0, l), \quad E = C_1,$$

$$(Tf)(x) = \bar{\zeta}(\exp cx) f(x) + 2c\bar{\zeta} \int_0^x \exp(x-t) f(t) dt, \quad (5.3)$$

$$q = q_0 \exp x; \quad p = p_0 \exp(l-x), \quad k = \exp l, \quad (5.4)$$

где

$$l = 1 - |\zeta|, \quad q_0/p_0 = 2c\bar{\zeta}, \quad c = -(1 - |\zeta|)^{-1} \log |\zeta|. \quad (5.5)$$

Для простоты мы предполагаем, что $\zeta > 0$, тогда спектром оператора T вида (5.3) будет отрезок $[\zeta, 1]$.

Предложение 5.1. 1) Пусть $\zeta > \frac{1}{2}$ и $f(x) \geq 0$ (причем не почти всюду $= 0$). Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|T^n f\| = \infty.$$

2) Имеет место оценка для степеней оператора

$$\|T^n\| \leq Mn^{3/2}$$

M — некоторая постоянная.

Доказательство. 1. Из (5.5) имеем

$$\bar{\zeta} \exp cx \geq cx + b, \quad \bar{\zeta} \exp(x-t) > 1, \quad \text{где } b = 1 + \ln \bar{\zeta}.$$

Далее

$$(T^n f)(x) \geq (T_1^n f)(x), \quad (5.6)$$

где

$$(T_1 f)(x) = (cx + b) f(x) + c \int_0^x f(t) dt,$$

$$(T_1^n f)(x) = (cx+b)^n f(x) + nc (cx+b)^{n-1} \int_0^x f(t) dt. \quad (5.7)$$

Из (5.6)—(5.7) следует утверждение 1).

2. Так как

$$\zeta \exp cx \leq x + \zeta, \quad c\zeta \leq 1,$$

то имеем

$$\|T^n f\| \leq \|T^n |f|\| \leq \|T_2^n |f|\|, \quad (5.8)$$

где

$$(T_2 f)(x) = (x + \zeta) f(x) + 2 \int_0^x f(t) dt,$$

$$\begin{aligned} (T_2^n f)(x) &= (x + \zeta)^n f(x) + n(n+1)(x+\zeta)^{n-1} \int_0^x f(t) dt - \\ &- n(n-1)(x + \zeta)^{n-1} \int_0^x (\zeta + t) f(t) dt. \end{aligned} \quad (5.9)$$

Из (5.8)—(5.9) следует утверждение 2).

Покажем, что оператор T обладает подпространством сильной устойчивости.

Резольвента оператора T дается следующей формулой [7]:

$$[(\lambda I - T)^{-1} f](x) = \frac{f(x)}{\lambda - \alpha(x)} + \frac{e^x S(x, \lambda)}{\lambda - \alpha(x)} 2\zeta c \int_0^x \frac{S^{-1}(t, \lambda) e^{-t} f(t)}{\lambda - \alpha(t)} dt. \quad (5.10)$$

Пусть $\lambda = \xi + i\eta$, тогда

$$|S(x, \lambda)| = \exp \left\{ 2\zeta c \int_0^x \frac{\xi - \alpha(t)}{[\xi - \alpha(t)]^2 + \eta^2} dt \right\},$$

отсюда

$$|S(x, \lambda)| \leq \exp(c/|\eta|), \quad c - \text{постоянная}. \quad (5.11)$$

Такая же оценка верна и для $|S^{-1}(x, \lambda)|$. Так как $\alpha(x)$ — вещественна то

$$|\lambda - \alpha(x)| \geq |\eta|. \quad (5.12)$$

Из (5.10)—(5.12) имеем

$$\|(\lambda I - T)^{-1}\| \leq \frac{\exp(A/|\eta|)}{|\eta|^2} \leq \exp(B/|\eta|^2).$$

A, B — некоторые постоянные.

Значит, для малых δ

$$M(\delta) = \sup_{\text{Im } \lambda = |\lambda| > \delta} \|(iJ - T)^{-1}\| \leq \exp(c'/\delta^2)$$

и

$$\int \ln \ln M(\delta) d\delta < +\infty.$$

Следовательно, по теореме Любича—Мацзаева [10], T является S -оператором, поэтому для любого сегмента $\Delta \subset [\zeta, 1] = \sigma(T)$ существует инвариантное (спектральное) подпространство $L(\Delta)$ относительно T такое, что $T(\Delta) \equiv T|_{L(\Delta)}$ принимает Δ за своим спектром. Если Δ строго лежит в единичном круге, то $T(\Delta)$ подобен истинному сжатию [11]. Следовательно, подпространство $L(\Delta)$ есть подпространство сильной устойчивости.

Таким образом, доказана

Теорема 5.1. *Оператор T вида (5.3) не является сильно устойчивым, но обладает континуумом инвариантных подпространств сильной устойчивости.*

В заключение приношу искреннюю благодарность проф. М. С. Лившицу за постановку задачи и внимание к работе.

Харьковский государственный
университет

Поступила 15.IV.1975

ՄԱԿՈՆԳ ԽԱՆՆԻ. Որոշ մեծամասնի ֆունկցիաների դասերի և նախկինում օպերատորների հատկությունները (ամփոփում)

Ներկա աշխատանքը նվիրված է Մ. Մ. Զրբաշյանի D_p ($p=0, 1, 2, \dots$) դասերի և նախկինում օպերատորների սպեկտրայի և սահմանափակության հարցերին տարրեր մետրիկաներում:

DO CONG KHANH. *Operators realizing some classes of meromorphic functions (summary)*

Spectrum properties and problems of continuity of operators realizing functions of classes D_p ($p=0, 1, 2, \dots$) of M. M. Jrhashian are investigated.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. М. С. Лившиц. Линейные дискретные системы и их связь с теорией факторизации мероморфных функций М. М. Джрбашяна, ДАН СССР, 219, № 4, 1974.
2. М. С. Лившиц. Операторы, колебания, волны, Изд. „Наука“, М., 1966.
3. М. М. Джрбашян. Интегральные преобразования и представления в комплексной области, Изд. „Наука“, М., 1966.
4. М. М. Джрбашян. Теория факторизации мероморфных функций в круге, Матем. сб. 79 (121), 4 (5), 1969.
5. М. М. Джрбашян. К проблеме представимости аналитических функций, Сообщ. инст. матем. и мех. АН Арм.ССР, вып. 2, 1948, 3—40.
6. А. Х. Меграбян. Реализация некоторых классов мероморфных функций в теории систем с дискретным временем, Изв. АН Арм.ССР, сер. матем., X, № 6, 1975, 560—580.

7. М. С. Бродский, М. С. Лившиц. Спектральный анализ несамосопряженных операторов и промежуточные системы, УМН, 13, 1, 1958, 3—85.
8. М. С. Бродский. Треугольные и жордановы представления линейных операторов. Изд. „Наука“, М., 1969.
9. В. М. Бродский. Об операторных узлах и их характеристических функциях, ДАН СССР, 191, № 1, 1971.
10. Ю. И. Любич, В. И. Мацаев. К спектральной теории линейных операторов в банаховом пространстве, ДАН СССР, 131, № 1, 1956.
11. G. Rosa. On models for linear operators, Comm. Pure Appl. Math, 13, 1960, 459—472.
12. Ю. М. Бегманский. Пространства с негативной метрикой, УМН, 18, вып. 1, 1963.
13. К. Исидза. Функциональный анализ, Изд. „Мир“, 1967.