А. А. ВАГАРШАКЯН

ТЕОРЕМЫ ЕДИНСТВЕННОСТИ ДЛЯ ОГРАНИЧЕННЫХ
АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЕ
В ТЕОРИИ АППРОКСИМАЦИИ

В статье С. Я. Хавинсона [1] доказан следующий результат
Пусть последовательность $\{z_k\}_{k=1}^{\infty}$, $|z_k| < 1$ такова, что

$$\sum_{k=1}^{\infty} (1 - |z_k|) = \infty$$

и

$$\frac{|z_{k+1}| - |z_k|}{(1 - |z_{k+1}|)(1 - |z_k|)} \geq \delta > 0,$$

где $\delta > 0$ от k не зависит. Если $f(z)$ — ограниченная в круге $|z| < 1$ аналитическая функция, удовлетворяющая условию

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (1 - |z_k|) \ln |f(z_k)| = -\infty,$$

то $f(z) \equiv 0$.

Аналогичный результат, при несколько других предположения на последовательность $\{z_k\}_{k=1}^{\infty}$, был получен И. В. Ушаковой [2], [3]. В дальнейшем И. В. Ушакова [4] обобщила эти результаты на более широкие классы функций.

Теоремы вышеприведенного типа связаны с такими аппроксимационными процессами, в которых учитываются не только отклонения кривляющего полинома от приближаемой функции, но и величины коэффициентов приближающих полиномов.

Основы теории, связывающей теоремы полноты, с учетом величин коэффициентов аппроксимирующих агрегатов, с теоремами единственности, были даны в работах Дейвиса, Фань-Цзи [5] и С. Я. Хавинсона [6].

В настоящей статье доказаны новые теоремы единственности для ограниченных аналитических функций, аналогичные теоремам И. В. Ушаковой и С. Я. Хавинсона. Используя результаты Дейвиса, Фань-Цзи, С. Я. Хавинсона, эти теоремы применяются в теории аппроксимации.

1°. Введем несколько обозначений. Пусть $\alpha \geq 0$, а $E \subseteq \partial D$ — некоторое множество, где $D = \{z/|z| < 1\}$. Рассмотрим всевозможные покрытия множества E счетным набором шаров радиусов r_i :

$$\bigcup_i S_i \supseteq E$$

и положим

$$M_\alpha(E) = \inf \left(\sum_i r_i^\alpha \right),$$

где infimum берется по всем таким покрытиям. Подробно о величинах $M_\alpha(E)$ можно познакомиться в книге Л. Карлесона [9]. Заметим, что $M_\alpha(E)$ — неотрицательная, монотонно возрастающая, счетно полуаддитивная функция множеств. В случае, когда $\alpha = 0$ для любого непустого множества $F \subseteq \partial D$ имеем $M_0(F) \geq 1$, а в случае $\alpha > 1$, $M_\alpha(\partial D) = 0$.

Пусть $1 \leq \beta < \infty$ и $0 < A < \infty$. Обозначим

$$\Delta_\beta(y) = \left\{ x \in D \mid \left| y - \frac{x}{|x|} \right|^\beta < A(1 - |x|) \right\},$$

где $y \in \partial D$.

Лемма 1. Пусть $0 \leq \alpha \leq 1$, $1 \leq \beta \leq \frac{1}{1-\alpha}$, а $u(x)$ — неотрицательная гармоническая функция, определенная на D . Тогда для множества

$$F = \{y \in \partial D \mid \sup_{x \in \Delta_\beta(y)} ((1 - |x|)^\alpha u(x)) = \infty\}$$

имеет место

$$M_{\beta(1-\alpha)}(F) = 0.$$

Обратно, для любого $F \subseteq \partial D$ такого, что $M_{\beta(1-\alpha)}(F) = 0$, существует неотрицательная гармоническая функция $u(x)$ такая, что в любой точке $y \in F$ имеет место

$$\sup_{x \in \Delta_\beta(y)} ((1 - |x|)^\alpha u(x)) = \infty.$$

Доказательство леммы 1, в несколько более общей форме, можно найти у автора [7].

Лемма 2. Пусть $\{z_k\}_{k=1}^\infty$ — последовательность в D , удовлетворяющая условию

$$\sum_{k=1}^\infty (1 - |z_k|) < \infty.$$

Тогда существует множество $E \subseteq \partial D$ такое, что

$$M_{\beta(1-\alpha)}(E) = 0,$$

где

$$0 \leq \alpha \leq 1, \quad 1 \leq \beta \leq \frac{1}{1-\alpha}$$

и

$$\sum_{\Delta_\beta(y) \ni z_k} (1 - |z_k|)^\alpha < \infty$$

для любого $y \in \partial D \setminus E$.

Доказательство. Для точек $0 \neq z \in D$ положим

$$C(z) = \{y \in \partial D \mid z \in \Delta_\beta(y)\}.$$

Через $\chi(z, y)$ мы обозначим характеристическую функцию множества $C(z)$, определенную на ∂D . Введем функцию

$$f(y) = \sum_{k=1}^{\infty} (1 - |z_k|)^{\alpha} \chi(z_k, y), \quad y \in \partial D.$$

Легко заметить, что

$$f(y) = \sum_{\Delta_{\beta(y)} \ni z_k} (1 - |z_k|)^{\alpha}.$$

Следовательно, достаточно доказать, что для множества $E = \{y \in \partial D / f(y) = \infty\}$, $M_{\beta(1-\alpha)}(E) = 0$. Предположим, что это не так, т. е. $M_{\beta(1-\alpha)}(E) > 0$. Согласно теореме Безиковича (см. Л. Карлесон [9], стр. 18) существует компактное множество $F \subseteq E$ такое, что $M_{\beta(1-\alpha)}(F) > 0$. Далее, по теореме Фростмана (см. Л. Карлесон [9], стр. 14) существует константа a такая, что для любого компактного множества F существует неотрицательная мера μ , обладающая свойствами:

$$\mu(S_r) \leq r^{\beta(1-\alpha)}$$

для любого интервала $S_r \subset \partial D$ длины $2r$ и

$$\mu(F) \geq a M_{\beta(1-\alpha)}(F).$$

Следовательно, мы имеем

$$\begin{aligned} \infty &= \int_F f(y) \mu(dy) = \sum_{k=1}^{\infty} (1 - |z_k|)^{\alpha} \int_F \chi(z_k, y) \mu(dy) \leq \\ &\leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} (1 - |z_k|)^{\alpha} \right) \sup_{z \in D} \frac{\mu(C(z))}{(1 - |z|)^{1-\alpha}}. \end{aligned}$$

Заметим, что $C(z)$ — интервал на ∂D с центром в точке $\frac{z}{|z|}$ и длиной

$2 A^{\frac{1}{\beta}} (1 - |z|)^{\frac{1}{\beta}}$. Следовательно

$$\infty \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} (1 - |z_k|)^{\alpha} \right) \sup \frac{A^{1-\alpha} \mu(S_r)}{r^{\beta(1-\alpha)}} \leq A^{1-\alpha} \left(\sum_{k=1}^{\infty} (1 - |z_k|)^{\alpha} \right) < \infty,$$

где supremum берется по всем интервалам длины $2r$. Из полученного противоречия вытекает, что $M_{\beta(1-\alpha)}(E) = 0$.

Лемма 3. Пусть $\{w_k\}_{k=1}^{\infty}$ — последовательность в D , удовлетворяющая условию

$$\sum_{k=1}^{\infty} (1 - |w_k|)^{\alpha} < \infty,$$

где $0 < \alpha < 1$, а $B(z, w_k)$ — произведение Бляшке с нулями в точках $\{w_k\}_{k=1}^{\infty}$. Тогда для любого множества $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$, удовлетворяющего условиям

$$\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |z_n|)^2 = \infty$$

и

$$\inf_{i \neq j} \left| \frac{1}{(1 - |z_i|)^2} - \frac{1}{(1 - |z_j|)^2} \right| > 0,$$

имеет место

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (1 - |z_n|)^2 \ln |B(z_n, w_k)| > -\infty.$$

Доказательство. Рассмотрим отображение

$$\pi(z) = \frac{z}{|z|} (1 - (1 - |z|)^2),$$

где $0 \neq z \in D$ и $\pi(0) = 0$. Заметим, что $\pi(z)$ отображает единичный круг на себя и для любого $z \in D$, $|\pi(z)| \leq |z|$. Пусть w и z — точки из D , удовлетворяющие условию

$$\min \{|w|, |z|\} \geq 1 - (2(1 - \alpha))^{\frac{1}{\alpha}}.$$

Докажем, что имеет место неравенство

$$\left| \frac{|\pi(w)| - |\pi(z)|}{1 - |\pi(w)||\pi(z)|} \right| \leq \left| \frac{|w| - |z|}{1 - |w||z|} \right|. \quad (1)$$

Обозначим $x = 1 - |w|$ и $y = 1 - |z|$. Тогда неравенство (1) примет вид

$$\left| \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2 - x^2 y^2} \right| \leq \left| \frac{x - y}{x + y - xy} \right|, \quad (2)$$

где $0 < x, y < (2(1 - \alpha))^{\frac{1}{\alpha}}$. Сначала рассмотрим случай, когда $x > y$. Неравенство (2) можно записать в виде

$$(x^2 - y^2)(x + y - xy) \leq (x - y)(x^2 + y^2 - x^2 y^2),$$

или

$$2x^2 y + xy^{2+1} + x^{2+1} y^2 \leq 2xy^2 + x^{2+1} y + x^2 y^{2+1}.$$

Так как $xy^{2+1} \leq x^{2+1} y$, то достаточно доказать, что

$$2x^2 y + x^{2+1} y^2 \leq 2xy^2 + x^2 y^{2+1},$$

или, что то же самое

$$2y^{1-\alpha} - y \leq 2x^{1-\alpha} - x. \quad (3)$$

Заметим, что функция $f(t) = 2t^{1-\alpha} - t$ имеет неотрицательную производную при $0 < t < (2(1 - \alpha))^{\frac{1}{\alpha}}$, и поэтому в этом интервале $f(t)$ — неубывающая функция. Из приведенного замечания и из неравенств

$$0 < y < x < (2(1 - \alpha))^{\frac{1}{\alpha}}$$

следует неравенство (3). Аналогично рассматривается случай, когда $0 < x < y < (2(1-x))^{\frac{1}{\alpha}}$.

Не теряя общности, можно предположить, что

$$\min \{|w_k|, |z_k|\} > 1 - (2(1-x))^{\frac{1}{\alpha}}, \quad k = 1, 2, \dots$$

Тогда в силу (1) имеем

$$\begin{aligned} |B(|\pi(z)|, |\pi(w_k)|)| &= \prod_{k=1}^{\infty} \left| \frac{|\pi(w_k)| - |\pi(z)|}{1 - |\pi(w_k)| |\pi(z)|} \right| \ll \\ &\ll \prod_{k=1}^{\infty} \left| \frac{|w_k| - |z|}{1 - |w_k| |z|} \right| \ll |B(z, w_k)| \end{aligned} \quad (4)$$

при $|z| > 1 - (2(1-x))^{\frac{1}{\alpha}}$. Заметим, что последовательности $|\pi(w_k)|_{k=1}^{\infty}$ и $|\pi(z_n)|_{n=1}^{\infty}$ удовлетворяют условиям

$$1. \quad \sum_{k=1}^{\infty} (1 - |\pi(w_k)|) = \sum_{k=1}^{\infty} (1 - |w_k|)^{\alpha} < \infty;$$

$$\begin{aligned} 2. \quad \inf_{i \neq j} \left| \frac{|\pi(z_i)| - |\pi(z_j)|}{(1 - |\pi(z_i)|)(1 - |\pi(z_j)|)} \right| = \\ = \inf_{i \neq j} \left| \frac{1}{(1 - |z_i|)^{\alpha}} - \frac{1}{(1 - |z_j|)^{\alpha}} \right| > 0; \end{aligned}$$

$$3. \quad \sum_{n=1}^{\infty} (1 - |\pi(z_n)|) = \sum_{n=1}^{\infty} (1 - |z_n|)^{\alpha} = \infty.$$

Из условия 1 следует, что произведение Бляшке с нулями $|\pi(w_k)|_{k=1}^{\infty}$ сходится $B(z, |\pi(w_k)|) \neq 0$, из 2 и 3 следует, что последовательность $|\pi(z_n)|_{n=1}^{\infty}$ удовлетворяет условиям теоремы И. В. Ушаковой и С. Я. Хавинсона [1] (эта теорема приведена во введении настоящей статьи). Следовательно мы имеем

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (1 - |\pi(z_n)|) \ln |B(|\pi(z_n)|, |\pi(w_k)|)| > -\infty.$$

Пользуясь неравенством (4), получим

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (1 - |z_n|)^{\alpha} \ln |B(z_n, w_k)| > -\infty.$$

2°. Теперь докажем основной результат настоящей статьи.

Теорема 1. Пусть последовательность $\{z_k\}_{k=1}^{\infty} \subset D$, числа

$$0 < \alpha < 1, \quad 1 \leq \beta \leq \frac{1}{1-\alpha}, \quad 2 < A < \infty \text{ и множество } E \subseteq \partial D \text{ таковы,}$$

что для любой точки $y \in E$ существует подпоследовательность $\{z_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$, удовлетворяющая условиям:

1. $\left| y - \frac{z_{n_k}}{|z_{n_k}|} \right|^\beta < A(1 - |z_{n_k}|);$
2. $\inf_{i \neq j} \left| \frac{1}{(1 - |z_{n_i}|)^\alpha} - \frac{1}{(1 - |z_{n_j}|)^\alpha} \right| > 0;$
3. $\sum_{k=1}^{\infty} (1 - |z_{n_k}|)^\alpha = \infty,$

и множество $\bar{E}$ удовлетворяет условию

$$M_{\beta(1-\alpha)}(E) > 0.$$

Если $f(z)$ — ограниченная, аналитическая на D функция и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - |z_n|)^\alpha \ln |f(z_n)| = -\infty, \quad (5)$$

то $f(z) \equiv 0$.

Доказательство. Предположим, что теорема не верна, т. е. существует последовательность $\{z_k\}_{k=1}^{\infty}$, удовлетворяющая условиям теоремы и ограниченная аналитическая функция $f(z) \not\equiv 0$, для которой имеет место (5). Не теряя общности, можно считать $|f(z)| \leq 1$, $|z| < 1$. Из факторизационной теоремы Неванлинны следует, что

$$f(z) = z^p B(z, w_k) \exp \left\{ - \int_0^{2\pi} \frac{e^{i\theta} + z}{e^{i\theta} - z} \mu(d\theta) + iC \right\},$$

где p — натуральное число, $B(z, w_k)$ — произведение Бляшке, составленное по нулям функции $f(z)$, μ — конечная положительная мера, а C — действительное число. Следовательно, имеем

$$(1 - |z|)^\alpha \ln |f(z)| = p(1 - |z|)^\alpha \ln |z| + (1 - |z|)^\alpha \ln |B(z, w_k)| - (1 - |z|)^\alpha u(z), \quad (6)$$

где $u(z)$ — неотрицательная гармоническая функция. Из леммы 1 следует, что существует множество $F_1 \subset \partial D$ такое, что

$$M_{\beta(1-\alpha)}(F_1) = 0 \quad (7)$$

и для любой точки $y \in \partial D \setminus F_1$

$$\sup_{\Delta_\beta(y) \cap D} (1 - |z|)^\alpha u(z) < \infty. \quad (8)$$

Так как

$$\lim_{|z| \rightarrow 1} (1 - |z|)^\alpha \ln |z| = 0,$$

то нам остается оценить второе слагаемое в (6). Из леммы 2 следует, что существует множество $F_2 \subset \partial D$ такое, что

$$M_{\beta(1-\alpha)}(F_2) = 0, \quad (9)$$

и для любого $y \in \partial D \setminus F_2$

$$\sum (1 - |w_k|)^\alpha < \infty, \quad (10)$$

где сумма берется по тем w_k , которые удовлетворяют условию

$$\left| y - \frac{w_k}{|w_k|} \right|^2 \leq A 2^{k+1} (1 - |w_k|). \quad (11)$$

Далее, так как

$$v(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 - |z|^2}{\left| z - \frac{w_k}{|w_k|} \right|^2} (1 - |w_k|)$$

— неотрицательная гармоническая функция на D , то из леммы 1 вытекает, что существует множество $F_3 \subset \partial D$ такое, что

$$M_{\beta(1-\alpha)}(F_3) = 0, \quad (12)$$

и для любой точки $y \in \partial D \setminus F_3$

$$\sup_{\Delta_{\beta(y)}(z)} (1 - |z|)^{\beta} v(z) < \infty. \quad (13)$$

В силу (7), (9) и (12) имеем

$$M_{\beta(1-\alpha)}(F) = 0,$$

где $F = F_1 \cup F_2 \cup F_3$. Так как $M_{\beta(1-\alpha)}(E) > 0$, то существует точка $y \in E \setminus F$. Разобьем произведение Бляшке $B(z, w_k)$ на три множителя

$$B(z, w_k) = B_1(z) B_2(z) B_3(z),$$

где $B_1(z)$ — произведение Бляшке, составленное по тем w_k , которые удовлетворяют условию $|y - w_k| \geq \frac{1}{4}$, $B_2(z)$ составлена по тем w_k ,

которые удовлетворяют условию (11) и $|y - w_k| < \frac{1}{4}$, а $B_3(z)$ составлена по остальным точкам w_k . Заметим, что

$$\lim_{z \rightarrow y} (1 - |z|)^{\beta} \ln |B_1(z)| = 0. \quad (14)$$

Прежде чем продолжать изучение произведения Бляшке, докажем одно неравенство. Для любых точек $z, w \in D$ имеем

$$\ln \left| \frac{w - z}{1 - \bar{w}z} \right|^2 = - \ln \left(1 + \frac{(1 - |w|^2)(1 - |z|^2)}{|w - z|^2} \right) \geq - \frac{(1 - |w|^2)(1 - |z|^2)}{|w - z|^2}. \quad (15)$$

Последнее неравенство имеет место, так как $\ln(1 + x) \leq x$, $x > 0$. Далее заметим, что если

$$2(1 - |w|) \leq \left| z - \frac{w}{|w|} \right|, \quad (16)$$

то справедливо неравенство

$$\begin{aligned} \left| z - \frac{w}{|w|} \right| &\leq |z - w| + \left| w - \frac{w}{|w|} \right| = \\ &= |z - w| + (1 - |w|) \leq |z - w| + \frac{1}{2} \left| z - \frac{w}{|w|} \right|. \end{aligned}$$

Следовательно

$$2|z - w| > \left| z - \frac{w}{|w|} \right|.$$

Поэтому, если z и w удовлетворяют неравенству (16), то в силу (15) имеем

$$\ln \left| \frac{w - z}{1 - \bar{w}z} \right|^2 \geq -4 \frac{(1 - |w|^2)(1 - |z|^2)}{\left| z - \frac{w}{|w|} \right|^2}. \quad (17)$$

Теперь предположим, что w удовлетворяет условию

$$A 2^{\beta+1} (1 - |w|) < \left| y - \frac{w}{|w|} \right|^\beta, \quad (18)$$

где $y \in \partial D$ — заранее фиксированная точка, $z \in \Delta_\beta(y)$ и $|y - w|, |y - z| < \frac{1}{4}$.

Тогда имеет место неравенство

$$2(1 - |w|) \leq \left| z - \frac{w}{|w|} \right|. \quad (19)$$

Действительно, если

$$4(1 - |w|) \leq \left| \frac{w}{|w|} - \frac{z}{|z|} \right|,$$

то неравенство (19) очевидно, так как

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \left| \frac{w}{|w|} - \frac{z}{|z|} \right| \leq \left| z - \frac{w}{|w|} \right|.$$

Предположим, что

$$\left| \frac{w}{|w|} - \frac{z}{|z|} \right| < 4(1 - |w|).$$

Тогда имеем

$$\begin{aligned} A 2^{\beta+1} (1 - |w|) &< \left| y - \frac{w}{|w|} \right|^\beta \leq 2^{\beta-1} \left(\left| y - \frac{z}{|z|} \right|^\beta + \left| \frac{z}{|z|} - \frac{w}{|w|} \right|^\beta \right) \leq \\ &\leq 2^{\beta-1} (A(1 - |z|) + 4(1 - |w|)). \end{aligned}$$

Следовательно вспоминая, что $A > 2$, получим

$$2(1 - |w|) \leq 4 \frac{A-1}{A} (1 - |w|) \leq 1 - |z|.$$

Далее

$$2(1 - |w|) \leq 1 - |z| \leq \left| z - \frac{w}{|w|} \right|.$$

Таким образом, мы доказали, что если $z \in \Delta_3(y)$, w удовлетворяют условию (18) и $|y - z| < \frac{1}{4}$, $|y - w| < \frac{1}{4}$, то имеет место (16), следовательно имеет место и неравенство (17). Так как нули произведения Бляшке $B_3(z)$ удовлетворяют условию

$$A 2^{3+1} (1 - |w_k|) < \left| y - \frac{w_k}{|w_k|} \right|^3$$

и $|y - w_k| < \frac{1}{4}$, то из вышеприведенных оценок следует, что для

$$z \in \Delta_3(y) \cap \left\{ z / |y - z| < \frac{1}{4} \right\}$$

имеет место

$$\ln |B_3(z)| \geq -2 \sum \frac{(1 - |w_k|^2)(1 - |z|^2)}{\left| z - \frac{w_k}{|w_k|} \right|^2} \geq -4v(z). \quad (20)$$

Пусть $\{z_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ — подпоследовательность, соответствующая точке y , о которой говорится в формулировке теоремы. Из леммы 3 следует, что

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} (1 - |z_{n_k}|)^2 \ln |B_2(z_{n_k})| > -\infty. \quad (21)$$

Таким образом, из оценок (13), (14), (20), (21) имеем

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} (1 - |z_{n_k}|)^2 \ln |B(z_{n_k}, w_m)| > -\infty.$$

Наконец, учитывая (8), получим

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} (1 - |z_{n_k}|)^2 \ln |f(z_{n_k})| > -\infty,$$

что противоречит (5). Теорема доказана.

Аналог теоремы 1 верен и в крайнем случае, когда $\alpha = 0$, $\beta = 1$. В этом случае имеет место

Теорема 2. Пусть последовательность $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ и множество $E \subset \partial D$ положительной меры таковы, что для любой точки $y \in E$ существует бесконечная подпоследовательность $\{z_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$, удовлетворяющая условиям

$$\left| y - \frac{z_{n_k}}{|z_{n_k}|} \right| \leq A(1 - |z_{n_k}|), \quad k = 1, 2, \dots,$$

где $A < \infty$ от k не зависит. Тогда из того, что для ограниченной аналитической функции $f(z)$ имеет место

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = 0,$$

следует, что $f(z) \equiv 0$.

Доказательство вытекает из того, что ограниченная аналитическая функция, не равная тождественно нулю, почти всюду на ∂D имеет некасательные граничные значения, которые не могут обращаться в нуль на множестве положительной лебеговой меры.

Замечание. Вторая часть леммы 1 показывает, что доказанные выше теоремы в некотором смысле точны.

3°. Приведем приложение доказанных теорем в теории аппроксимации. Приведенная ниже конструкция достаточно универсальна и ее можно применять во многих случаях. Для иллюстрации этого метода мы рассмотрим вопросы приближения функций из L_p , $1 \leq p < \infty$, рациональными функциями с фиксированными полюсами. Сначала сформулируем некоторые общие теоремы, доказательство которых можно найти у С. Я. Хавинсона [8].

Пусть X — нормированное пространство, а $p(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ — норма в n -мерном пространстве $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in E^n$, причем для любого $m > n$ и любых $\lambda_1, \dots, \lambda_n$

$$p(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = p(\lambda_1, \dots, \lambda_n, \underbrace{0, \dots, 0}_{m-n}).$$

Пространство, сопряженное к E^n обозначим $(E^n)^*$, а через p^* — норму в нем.

Определение. Мы скажем, что система $\{\varphi_j\}_{j=1}^n$, $o(p)$ полна в X , если для любого $\varepsilon > 0$ и любого элемента $x \in X$ существуют числа $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ такие, что

$$\|x - \sum_{j=1}^n \lambda_j \varphi_j\| < \varepsilon$$

и

$$p(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) < \varepsilon.$$

Теорема (С. Я. Хавинсон). Для того чтобы система $\{\varphi_j\}_{j=1}^n$ была $o(p)$ полна в X необходимо и достаточно, чтобы для любого линейного функционала $l \in X^*$ из неравенства

$$p^*(l(\varphi_1), l(\varphi_2), \dots, l(\varphi_n)) \leq 1, \quad n = 1, 2, \dots$$

следовало бы, что $l \equiv 0$.

Теорема 3. Пусть последовательность $\{z_k\}_{k=1}^{\infty}$ такова, что $|z_{2k}| < 1$, $|z_{2k+1}| > 1$, $k = 1, \dots$. Предположим, что $\{z_{2k}\}_{k=1}^{\infty}$ и $\left\{\frac{1}{z_{2k+1}}\right\}_{k=1}^{\infty}$ удовлетворяют условиям теоремы 1. Далее пусть c_k — положительные числа, такие, что $c_k \rightarrow \infty$. Тогда для любой функции

$f(e^{i\theta}) \in L_p$, $1 \leq p < \infty$, и любого числа $\varepsilon > 0$ существует последовательность $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ такая, что

$$\int_0^{2\pi} \left| f(e^{i\theta}) - \sum_{k=1}^n \frac{\lambda_k}{z_k - e^{i\theta}} \right|^p d\theta < \varepsilon$$

и

$$\sum_{k=1}^n |\lambda_k| \exp \left\{ -\frac{c_k}{|1 - |z_k||^2} \right\} < \varepsilon.$$

Доказательство. В пространстве L_p , $1 \leq p < \infty$, рассмотрим систему $\left\{ \frac{1}{z_k - e^{i\theta}} \right\}_{k=1}^n$. В E^n введем норму

$$p(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \sum_{k=1}^n |\lambda_k| \exp \left\{ -\frac{c_k}{|1 - |z_k||^2} \right\}.$$

Заметим, что

$$p^*(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \sup_{1 \leq k \leq n} \left(|\lambda_k| \exp \left\{ \frac{c_k}{|1 - |z_k||^2} \right\} \right).$$

Пусть $l \in L_p^*$. Тогда существует функция $g \in L_q$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, такая, что

$$\int_0^{2\pi} f(e^{i\theta}) \overline{g(e^{i\theta})} d\theta = l(f), \quad f \in L_p.$$

Пусть

$$\begin{aligned} 1 &\geq p^* \left(l \left(\frac{1}{z_1 - e^{i\theta}} \right), \dots, l \left(\frac{1}{z_n - e^{i\theta}} \right) \right) = \\ &= \sup_{1 \leq k \leq n} \left| l \left(\frac{1}{z_k - e^{i\theta}} \right) \right| \exp \left\{ \frac{c_k}{|1 - |z_k||^2} \right\}. \end{aligned}$$

Обозначая

$$F(z) = \int_0^{2\pi} \frac{\overline{g(e^{i\theta})}}{z - e^{i\theta}} d\theta,$$

получим

$$|F(z_k)| \leq \exp \left\{ -\frac{c_k}{|1 - |z_k||^2} \right\}, \quad k = 1, 2, \dots \quad (22)$$

Функция $F(z)$ аналитическая на D и принадлежит H_q . Из факторизационной теоремы Неванлинны следует, что функцию $F(z)$ можно представить в виде

$$F(z) = \frac{F_1(z)}{F_2(z)},$$

где $F_1(z)$ и $F_2(z)$ — аналитические функции и $|F_1(z)| \leq 1$, $|F_2(z)| \leq 1$. Из неравенства (22) следует, что

$$(1 - |z_{2k}|)^{\alpha} \ln |F_1(z_{2k})| \leq (1 - |z_{2k}|)^2 \ln |F(z_{2k})| \leq - \frac{c_k}{(1 - |z_{2k}|)^{\alpha}}.$$

Поэтому в силу теоремы 1 имеем $F(z) \equiv 0$ при $|z| < 1$. Аналогично доказывается, что $F(z) \equiv 0$ при $|z| > 1$. Следовательно, функция $g(e^{i\theta})$, которая порождает функционал l , равна нулю почти всюду. Поэтому $l \equiv 0$. Теорема доказана.

Аналогично доказывается

Теорема 4. Пусть последовательность $\{z_k\}_{k=1}^{\infty}$ такова, что $|z_{2k}| < 1$, $|z_{2k+1}| > 1$, $k = 1, \dots$ и подпоследовательности $\{z_{2k}\}_{k=1}^{\infty}$ и $\left\{ \frac{1}{z_{2k+1}} \right\}_{k=1}^{\infty}$ удовлетворяют условиям теоремы 2, а c_k — положительные числа и $c_k \rightarrow \infty$. Тогда для любой функции $f \in L_p$, $1 \leq p < \infty$, и любого $\varepsilon > 0$ существует последовательность $i_1, i_2, \dots, i_n$, такая, что

$$\int_0^{2\pi} \left| f(e^{i\theta}) - \sum_{k=1}^n \frac{\lambda_k}{z_k - e^{i\theta}} \right|^p d\theta < \varepsilon$$

и

$$\sum_{k=1}^n \frac{\lambda_k}{c_k} < \varepsilon.$$

Институт математики
АН Армянской ССР

Поступила 1.IX.1976

Ա. Ա. ՎԱԳԱՐՇԱԿՅԱՆ. Միակերպան բևուռեմ սահմանափակ անալիտիկ ֆունկցիաների համար և նրա կիրառությունը մոտաբերումների տեսության մեջ (ամփոփում)

Հողիվածում ապացուցվում են միակերպան նոր թեորեմներ սահմանափակ անալիտիկ ֆունկցիաների համար և բերվում են այդ թեորեմների որոշ կիրառություններ մոտաբերումների տեսության մեջ:

A. A. VAGARSHAKIAN. A uniqueness theorem for bounded analytic functions and its application in the theory of approximation (summary)

In this paper new theorems of uniqueness for bounded analytic functions are proved. An application in the theory of approximation is indicated.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. С. Я. Хавинсон. Теория экстремальных задач для ограниченных аналитических функций, удовлетворяющих дополнительным условиям внутри области, УМН, XVIII, 2 (110), 1963.
2. И. В. Ушакова. Теория единственности для функций, голоморфных и ограниченных в единичном круге, ДАН СССР, 130, № 1, 1960.
3. И. В. Ушакова. Некоторые теоремы единственности для функций, мероморфных в еди-

- ничном круге. Тезисы докл. V Всесоюзной конференции по теории функций. Ереван, 1960.
4. И. В. Ушакова. Некоторые теоремы единственности для функций, субгармонических и мероморфных в единичном круге, ДАН СССР, 137, № 6, 1961.
 5. *Ky Fan and Ph. Davis. Complete sequences and approximation in normed linear spaces, Duke Math. Journ., 24, № 2, 1957.*
 6. С. Я. Хавинсон. Некоторые вопросы полноты систем, ДАН СССР, 137, № 4, 1961.
 7. А. А. Вагаршакян. Граничные свойства некоторых классов гармонических функций, Известия АН Арм. ССР, сер. «Математика», X, № 1, 1975.
 8. С. Я. Хавинсон. О понятии полноты, учитывающем величины коэффициентов аппроксимирующих полиномов, Известия АН Арм. ССР, сер. «Математика», VI, №№ 2—3, 1971.
 9. Л. Карлесон. Избранные проблемы теории исключительных множеств, Изд. «Мир», М., 1971.