УДК 517.5

А. М. АВАКЯН

О НАИЛУЧШЕМ ПРИБЛИЖЕНИИ КЛАССОВ ФУНКЦИЙ
 С ОГРАНИЧЕННОЙ ПЕРВОЙ ПРОИЗВОДНОЙ КУСОЧНО-
 ПОСТОЯННЫМИ В ОДНОМЕРНОМ И ДВУМЕРНОМ СЛУЧАЯХ

1°. Введем обозначения. Обозначим через $L_p = L_p(0,1)$ и $L_p(I)$ пространство измеримых по Лебегу соответственно на $[0,1]$ и $I = [0,1] \times [0,1]$ функций $f(x)$ с обычной нормой, а через W_p и $W_p(I)$ — единичные замкнутые шары в этих пространствах. Пусть, далее, $L_p^r(0,1)$ ($r = 0, 1, 2, \dots, 1 \leq p \leq \infty$) — множество r раз дифференцируемых функций f , у которых $f^{(r-1)}$ абсолютно непрерывна на $[0,1]$ и $f^{(r)} \in L_p(0,1)$, а $L_p^{r,k}$ ($r, k = 0, 1, 2, \dots$) — множество всех функций $f(x, y)$, определенных на I таких, что $f^{(\nu, \mu)}(x, y)$ ($0 \leq \nu < r-1, 0 \leq \mu \leq k-1$) непрерывны на I , $f^{(\nu, \mu)}(x, y) \in L_p(0,1)$ ($0 \leq \mu < k$) для всех фиксированных y , $f^{(\nu, \mu)}(x, y)$ абсолютно непрерывна по y для всех фиксированных x , $f^{(\nu, k)}(x, y) \in L_p(0,1)$ ($0 \leq \nu \leq r-1$) для всех фиксированных x , $f^{(\nu, k)}(x, y)$ абсолютно непрерывна по x для всех фиксированных y и $f^{(r, k)}(x, y) \in L_p(I)$ ($1 \leq p \leq \infty$), где

$$f^{(\nu, \mu)}(x, y) = \frac{\partial^{\nu+\mu}}{\partial x^\nu \partial y^\mu} f(x, y),$$

причем смешанные производные не зависят от порядка дифференцирования.

В множествах L_p^k и $L_p^{r,k}$ выделим классы

$$W_p^r = \{f : f \in L_p^r, f^{(r)} \in W_p\},$$

$$W_p^{r,k} = \{f : f \in L_p^{r,k}, f^{(r, k)} \in W_p(I), \|f^{(\nu, k)}(1, \cdot)\|_p \leq 1 \ (0 \leq \nu \leq r-1), \|f^{(r, \mu)}(\cdot, 1)\|_p \leq 1 \ (0 \leq \mu \leq k-1)\},$$

где

$$\|f^{(\nu, k)}(1, \cdot)\|_p = \left(\int_0^1 |f^{(\nu, k)}(1, y)|^p dy \right)^{1/p}.$$

Наилучшие приближения классов W_p^r и $W_p^{r,k}$ ($1 \leq p \leq \infty, r, k = 0, 1, 2, \dots; W_p^0 = W_p, W_p^{0,0} = W_p(I)$) подпространствами $N \subset L_q$ и $\mathfrak{X} \subset L_q(I)$ ($1 \leq q < \infty$) соответственно, определяются следующим образом:

$$E(W_p^r, N)_q = \sup_{f \in W_p^r} \inf_{g \in N} \|f - g\|_q,$$

$$E(W_p^{r,k}, \mathfrak{M})_q = \sup_{f \in W_p^{r,k}, g \in \mathfrak{M}} \inf \|f - g\|_q.$$

Рассмотрим задачу наилучшего приближения в метриках различных пространств функций на $[0, 1]$ и I . Речь будет идти о нахождении наилучшего приближения введенных выше классов подпространствами кусочно-постоянных. Метод исследования основан на использовании соотношений двойственности и специфики пространств кусочно-постоянных.

2°. Одномерный случай. Прежде, чем перейти к основной теореме этого раздела, докажем следующую лемму.

Лемма 1. Пусть q', γ, l — произвольные положительные числа, причем $1 < q' < \infty$.

Положим

$$A(q', \gamma) = \{g : g \in L_{q'}^1(0, l), \int_0^l |g'(u)|^{q'} du \leq \gamma,$$

$$g(0) = g(l) = 0\} \quad (1 < q' < \infty)$$

и пусть $A^0(q', \gamma)$ ($1 < q' < \infty$) состоит из всех функций $g \in A(q', \gamma)$, которые в начале сегмента $[0, l]$ строго монотонно возрастают, потом могут принимать постоянное значение, а в конце сегмента $[0, l]$ строго монотонно убывают. Тогда

а) Для любого $p' \in [1, \infty]$

$$\sup_{g \in A(q', \gamma)} \|g\|_{p'} = \sup_{g \in A^0(q', \gamma)} \|g\|_{p'} \quad (1 < q' < \infty).$$

в) Если q — число, сопряженное с q' ($1/q + 1/q' = 1$), то

$$\sup \{ \|g\|_{\infty} : g \in A(q', \gamma) \} = \frac{1}{2} l^{1/q} \gamma^{1/q'},$$

с) Если $p' \in [1, \infty]$ и $p' \leq q'$, то

$$\sup \{ \|g\|_{p'} : g \in A(q', \gamma) \} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{q}{p'+q} \right)^{1/p'} \gamma^{1/p'} l^{1/p'+1/q},$$

если $p' > q'$, то

$$\sup \{ \|g\|_{p'} : g \in A(q', \gamma) \} < \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2^{q-1}} \frac{p'}{p'+q} \right)^{1/p'} \gamma^{1/p'} l^{1/p'+1/q},$$

где q , как и прежде, число, сопряженное с q' .

Доказательство. Часть а) будет доказана, если для любой функции $g \in A(q', \gamma)$ мы сможем указать функцию $\bar{g} \in A^0(q', \gamma)$, такую, что

$$\|g\|_{p'} \leq \|\bar{g}\|_{p'} \quad (1 \leq p' \leq \infty).$$

Поскольку $g \in L_{q'}^1(0, l) \subset L_1^1(0, l)$, то ([1], гл. 8) $|g|$ — функция ограниченной вариации. Обозначим через $v(x)$ и $w(x)$ ($0 \leq x \leq l$) соответственно полные вариации функций $|g(t)|$ и $|g(l-t)|$ на отрезке $[0, x]$ и определим функции $p(x)$ и $q(x)$ равенствами

$$p(x) = \frac{v(x) + |g(x)|}{2}, \quad q(x) = \frac{w(x) + |g(l-x)|}{2}.$$

Ясно, что $p(0) = q(0) = 0$. Из курса математического анализа известно ([2], гл. 6), что p и q монотонно возрастают на $[0, l]$

$$|g(x)| \leq p(x), |g(l-x)| \leq q(x) \quad (0 \leq x \leq l), \quad (1)$$

причем $p(x) = \text{const}$ в тех промежутках, где $|g|$ монотонно убывает, $p(x) = |g(x)| + \text{const}$ — на остальном множестве, $q(x) = \text{const}$ там, где $|g|$ монотонно возрастает и $q(x) = |g(l-x)| + \text{const}$ — на остальном множестве. Поскольку число интервалов постоянства функций p и q не более, чем счетно, мы можем пронумеровать их. Пусть $\{(a_i, b_i)\}_i$ — все интервалы постоянства функции p , а $\{(c_j, d_j)\}_j$ — все интервалы постоянства функции q . Из вышесказанного заключаем, что

$$p'(x) = h^+(x), \quad q'(l-x) = -h^-(x) \quad (0 \leq x \leq l), \quad (2)$$

где

$$h^+(x) = \frac{1}{2} (||g'|'(x)| + |g'|'(x)), \quad h^-(x) = \frac{1}{2} (||g'|'(x)| - |g'|'(x))$$

соответственно положительная и отрицательная части производной функции $|q|$.

Положим $E = [0, l] \setminus (\cup_i (a_i, b_i))$, $F = [0, l] \setminus (\cup_j (c_j, d_j))$ и определим функции $\bar{p}$ и $\bar{q}$ равенствами

$$\bar{p}(x - \sum_{b_i < x} (b_i - a_i)) = p(x), \quad x \in E$$

$$\bar{q}(x - \sum_{d_j < x} (d_j - c_j)) = q(x), \quad x \in F.$$

Допуская некоторую вольность речи, можем сказать, что графики функций $\bar{p}$ и $\bar{q}$ получаются сжатием к оси ординат графиков p и q , причем полученные таким образом графики строго монотонно возрастают.

Нетрудно убедиться в том, что $\bar{p}$ и $\bar{q}$ определены соответственно на $[0, \alpha]$ и $[0, \beta]$, где

$$\alpha = l - \sum_i (b_i - a_i), \quad \beta = \sum_j (d_j - c_j)$$

и $\alpha + \beta \leq l$. Теперь можем определить $\bar{g}$:

$$\bar{g}(x) = \begin{cases} \bar{p}(x), & \text{если } 0 \leq x < \alpha \\ \bar{p}(\alpha), & \text{если } \alpha \leq x \leq l - \beta \\ \bar{q}(l - x), & \text{если } l - \beta < x < l. \end{cases}$$

Наши предположения о функции g показывают, что $\bar{g}$ — абсолютно непрерывная функция, $\bar{g}(0) = \bar{g}(l) = 0$, а из (1) получаем

$$|g(x)| \leq \bar{g}(x), \quad 0 \leq x \leq l.$$

Повторю $\|g\|_p \leq \|\bar{g}\|_p$, и доказательство части а) будет завершено, если покажем, что $\|g\|_q^q < \gamma$.

Но в силу (2)

$$\begin{aligned} \| \bar{g} \|_{q'}^{q'} &= \int_0^l |p'(x)|^{q'} dx + \int_{l-\delta}^l |\bar{q}'(l-x)|^{q'} dx = \\ &= \int_E (h^+(x))^{q'} dx + \int_F (h^-(x))^{q'} dx = \int_E (h^+(x) + h^-(x))^{q'} dx + \\ &+ \int_F (h^+(x) + h^-(x))^{q'} dx = \int_0^l (h^+(x) + h^-(x))^{q'} dx = \\ &= \|g'\|_{q'}^{q'} \leq \gamma. \end{aligned}$$

в) Пусть функция $g \in A(q', \gamma)$ фиксирована, $h(u) = g'(u)$ ($0 \leq u \leq 1$), а $h^+(u)$ и $h^-(u)$ — положительная и отрицательная части функции $g'(u)$, т. е.

$$h^+(u) = \frac{|g'(u)| + g'(u)}{2}, \quad h^-(u) = \frac{|g'(u)| - g'(u)}{2}.$$

Ясно, что $|g'(u)| = h^+(u) + h^-(u)$, $g'(u) = h^+(u) - h^-(u)$, а из условия $g(0) = g(l) = 0$ следуют равенства

$$\int_0^l h^+(u) du = \int_0^l h^-(u) du = \frac{1}{2} \int_0^l |g'(u)| du.$$

Поскольку для любой функции $g(x)$ из $A(q', \gamma)$ имеет место представление

$$g(x) = \int_0^x g'(u) du, \quad 0 \leq x \leq l,$$

то с помощью неравенства Гельдера мы можем сверху оценить величину $\|g\|_{\infty}$:

$$\begin{aligned} \|g\|_{\infty} &= \max_{0 \leq x \leq l} |g(x)| = \max_{0 \leq x \leq l} \left| \int_0^x g'(u) du \right| \leq \\ &\leq \max_{0 \leq x \leq l} \int_0^x h^+(u) du \leq \int_0^l h^+(u) du = \frac{1}{2} \int_0^l |g'(u)| du \leq \\ &\leq \frac{1}{2} \left(\int_0^l |g'(u)|^{q'} du \right)^{1/q'} \left(\int_0^l du \right)^{1/q} \leq \frac{1}{2} \gamma^{1/q'} l^{1/q}. \end{aligned}$$

Таким образом

$$\|g\|_{\infty} \leq \frac{1}{2} \gamma^{1/q'} l^{1/q} \quad (3)$$

и чтобы завершить в) нам необходимо построить экстремальную функцию $g_0 \in A(g', \gamma)$, для которой неравенство (3) превращается в равенство.

Легко проверить, что функция

$$g_0(x) = \begin{cases} \gamma^{1/q'} x l^{-1/q'}, & 0 \leq x \leq l/2 \\ \gamma^{1/q'} (l-x) l^{-1/q'}, & l/2 \leq x \leq l \end{cases}$$

принадлежит классу $A(q', \gamma)$ и, кроме того

$$g_0\left(\frac{l}{2}\right) = \frac{1}{2} l^{1/q} \gamma^{1/q'}$$

т. е. является экстремальной.

с) В силу части а), часть с) будет доказана, если в требуемых доказательствах неравенствах множество $A(q', \gamma)$ заменить множеством $A^\circ(q', \gamma)$. Сначала докажем 2-е неравенство, т. е. случай, когда $p' \leq q'$. Пусть $g \in A^\circ(q', \gamma)$ фиксирована и точка $c \in (0, l)$ выбрана таким образом, что g монотонно возрастает на $(0, c)$ и монотонно убывает на (c, l) . Не нарушая общности считаем, что $c \leq l/2$, так как в противном случае рассмотрим функцию $g(l-x)$.

Определим числа γ_+ и γ_- равенствами

$$\gamma_+ = \int_0^c ((h^+(u))^{q'}) du, \quad \gamma_- = \int_c^l (h^-(u))^{q'} du$$

и положим

$$\bar{g}(x) = \begin{cases} \gamma_+^{1/q'} x^{1/q}, & 0 \leq x \leq l/2 \\ \gamma_-^{1/q'} (l-x)^{1/q}, & l/2 < x \leq l. \end{cases}$$

Заметим, что $\bar{g}$ не обязана быть непрерывной. Применяя неравенство Гельдера мы можем поточечно оценить $g(x)$ на сегменте $[0, c]$:

$$\begin{aligned} g(x) &= \int_0^x h^+(u) du \leq \left(\int_0^x (h^+(u))^{q'} du \right)^{1/q'} \left(\int_0^x du \right)^{1/q} \leq \\ &\leq \gamma_+^{1/q'} x^{1/q} = \bar{g}(x) \quad (0 \leq x \leq c). \end{aligned}$$

Ввиду условия $g(x) \in A^\circ(q', \gamma)$, для любого $x \in [0, l/2]$ имеем

$$g(x) \leq g(c) \leq \gamma_+^{1/q'} c^{1/q} \leq \gamma_+^{1/q'} x^{1/q}, \quad 0 \leq x \leq l/2.$$

А это означает, что $g(x) \leq \bar{g}(x)$ для любого $x \in [0, l/2]$.

Аналогично, рассматривая функцию $g(l-x)$ и учитывая равенство $g'(l-x) = h^-(l-x)$, $0 \leq x \leq l/2$, получаем

$$\begin{aligned} g(l-x) &= \int_0^{l-x} h^-(l-u) du = \int_{l-x}^l h^-(u) du \leq \\ &\leq \left(\int_{l-x}^l (h^-(u))^{q'} du \right)^{1/q'} \left(\int_{l-x}^l du \right)^{1/q} \leq \gamma_-^{1/q'} (l-x)^{1/q}. \end{aligned}$$

Поэтому

$$g(x) \leq \gamma_-^{1/q'} (l-x)^{1/q} \leq \bar{g}(x), \quad l/2 \leq x \leq l.$$

Итак, $g(x) \leq \bar{g}(x)$ для любого $x \in [0, l]$ и мы можем сверху оценить $\|g\|_{p'}$:

$$\begin{aligned} \|g\|_{p'}^{p'} &= \int_0^l (g(x))^{p'} dx \leq \int_0^l (\bar{g}(x))^{p'} dx = \int_0^{l/2} \gamma_+^{p'/q'} x^{p'/q} dx + \\ &+ \int_{l/2}^l \gamma_-^{p'/q'} (l-x)^{p'/q} dx = \frac{q}{p'+q'} (\gamma_+^{p'/q'} + \gamma_-^{p'/q'}) \left(\frac{l}{2}\right)^{p'/q} + 1. \end{aligned}$$

Но сумма $\gamma_+^{p'/q'} + \gamma_-^{p'/q'}$ ($p' \leq q'$) при условии $\gamma_+ + \gamma_- = \gamma$ принимает свое максимальное значение тогда, когда $\gamma_+ = \gamma_- = \gamma/2$.

В самом деле, если

$$L(\gamma_+, \gamma_-) = \gamma_+^{p'/q'} + \gamma_-^{p'/q'} - \lambda \gamma_+ - \lambda \gamma_- - \lambda \gamma$$

— функция Лагранжа, то из необходимых условий экстремума

$$\frac{\partial L}{\partial \gamma_+} = \frac{p'}{q'} \gamma_+^{p'/q'-1} - \lambda = 0,$$

$$\frac{\partial L}{\partial \gamma_-} = \frac{p'}{q'} \gamma_-^{p'/q'-1} - \lambda = 0$$

закключаем, что $\gamma_+ = \gamma_- = \gamma/2$. Нетрудно проверить, что точка $(\gamma/2, \gamma/2)$, при условии $p' \leq q'$, является точкой максимума для суммы $\gamma_+^{p'/q'} + \gamma_-^{p'/q'}$. Следовательно

$$\begin{aligned} \|g\|_{p'}^{p'} &\leq \frac{q}{p'+q'} \left(\frac{\gamma}{2}\right)^{p'/q'} 2 \left(\frac{1}{2}\right)^{p'/q'+1} l^{p'/q'+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{p'/q} \times \\ &\times \frac{q}{p'+q'} \left(\frac{1}{2}\right)^{p'/q'} \gamma^{p'/q'} l^{p'/q'+1} = \frac{q}{p'+q'} \left(\frac{1}{2}\right)^{p'} \gamma^{p'/q'} l^{p'/q'+1}, \end{aligned}$$

$$\|g\|_{p'} \leq \frac{1}{2} \gamma^{1/q'} \left(\frac{q}{p'+q'}\right)^{1/p'} l^{1/q'+1/p'}.$$

Для того, чтобы доказать второе неравенство части с) (случай, когда $p' > q'$), рассмотрим функцию

$$g^*(x) = \begin{cases} \gamma^{1/q'} x^{1/q}, & \text{при } 0 \leq x \leq l/2^q \\ \frac{1}{2} \gamma^{1/q'} l^{1/q}, & \text{при } l/2^q < x \leq l-l/2^q \\ \gamma^{1/q'} (l-x)^{1/q}, & \text{при } l-l/2^q < x \leq l. \end{cases}$$

Если $g \in A^\circ(q', \gamma)$, то для любого $x \in [0, l/2^q]$

$$g(x) = \int_0^x g'(u) du \leq \left(\int_0^x |g'(u)|^{q'} du \right)^{1/q'} \left(\int_0^x u du \right)^{1/q} \leq$$

$$\leq \left(\int_0^l |g'(u)|^{q'} du \right)^{1/q'} x^{1/q} \leq \gamma^{1/q'} x^{1/q} = g^*(x),$$

т. е.

$$g(x) \leq g^*(x), \quad 0 \leq x \leq l/2^q.$$

Аналогичным образом, для любого $x \in [0, l/2^q]$

$$\begin{aligned} g(l-x) &= \int_0^x g'(l-u) du \leq \left(\int_0^x |g'(l-u)|^{q'} du \right)^{1/q'} \left(\int_0^x u du \right)^{1/q} \leq \\ &\leq \left(\int_0^l |g'(l-u)|^{q'} du \right)^{1/q'} x^{1/q} \leq \gamma^{1/q'} x^{1/q}, \end{aligned}$$

т. е.

$$|g(x)| \leq \gamma^{1/q'} (l-x)^{1/q} = g^*(x), \quad x \in \left(l \left(1 - \frac{1}{2^q} \right), l \right].$$

В силу части в)

$$g(x) \leq \frac{1}{2} \gamma^{1/q'} l^{1/q} = g^*(x), \quad l/2^q \leq x \leq l \left(1 - \frac{1}{2^q} \right).$$

Таким образом, $g(x) \leq g^*(x)$ ($0 \leq x \leq l$) и мы можем оценить $\|g\|_{p'}$ через норму функции g^* :

$$\begin{aligned} \|g\|_{p'}^{p'} &\leq \|g^*\|_{p'}^{p'} = 2 \left[\int_0^{l/2^q} \gamma^{p'/q'} x^{p'/q} dx + \int_{l/2^q}^{l/2} \gamma^{p'/q'} l^{p'/q} dx \right] = \\ &= 2 \left[\frac{q}{p'+q} \gamma^{p'/q'} \left(\frac{l}{2^q} \right)^{\frac{p'+q}{q}} + \frac{1}{2} \gamma^{p'/q'} l^{\frac{p'+q}{q}} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2^q} \right) \right] = \\ &= \left(\frac{1}{2} \right)^{p'} \gamma^{p'/q'} l^{p'/q+1} \left[\frac{q}{p'+q} + 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{q-1} \right] = \\ &= \left(\frac{1}{2} \right)^{p'} \left(1 - \frac{p'}{2^{q-1}(p'+q)} \right) \gamma^{p'/q'} l^{p'/q+1}. \end{aligned}$$

Значит

$$\|g\|_{p'} \leq \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2^{q-1}} \frac{p'}{p'+q} \right) \gamma^{1/q'} l^{1/q+1/p'}.$$

Этим доказательство леммы завершено, поскольку последнее неравенство верно для любого $g \in A^0(q', \gamma)$. В заключение отметим, что функции, построенные в части с) не являются экстремальными в том смысле, что они не принадлежат классу $A(q', \gamma)$.

Легко заметить, что лемма 1 остается в силе и в том случае, когда рассматриваемые в ней функции определены не на $[0, l]$, а на произвольном сегменте $[a, b]$. Поэтому мы можем сформулировать утверждение с) леммы в следующем виде.

Следствие 2. Пусть $\gamma > 0$ — произвольное число, $1 < q' < \infty$, q — число, сопряженное с q' и

$$A(q', \gamma, a, b) = \left\{ g : g \in L_{q'}^1(a, b), \int_a^b |g'(u)|^{q'} du \leq \gamma, g(a) = g(b) = 0 \right\}.$$

Тогда

$$\sup_{g \in A(q', \gamma, a, b)} \int_a^b |g(x)|^{p'} dx \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{p'} \frac{q}{p'+q} \gamma^{p'/q'} (b-a)^{p'/q'+1} \quad (4)$$

для любого $1 \leq p' \leq q'$ и

$$\sup_{g \in A(q', \gamma, a, b)} \int_a^b |g(x)|^{p'} dx \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{p'} \left(1 - \frac{1}{2^{q'-1}} \frac{p'}{p'+q}\right) \gamma^{p'/q'} (b-a)^{p'/q'+1} \quad (5)$$

для любого $q' < p' < \infty$.

Перейдем к оценке, а в некоторых случаях нахождению наилучшего приближения классов W_p^1 ($1 \leq p \leq \infty$) подпространством кусочно постоянных. Пусть $\Delta: 0 = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{N-1} < x_N = 1$ — произвольное разбиение отрезка $[0, 1]$, $\Delta_i = x_i - x_{i-1}$, ($i=1, 2, \dots, N$), $\bar{\Delta} = \max_{1 \leq i \leq N} \Delta_i$, а $S^0 = S^0(\Delta)$ — пространство кусочно-постоянных относительно этого разбиения:

$$S^0 = \{s(x) : s(x) = \text{const на } (x_{i-1}, x_i) i=1, 2, \dots, N\}.$$

Известно (см., например, [3], § 3.5), что для любых $p, q \in [1, \infty]$

$$E(W_p^1, S^0)_q = \sup \{ \|g\|_{p'} : g \in W_p^1(S^0)_0 \}, \quad (6)$$

где $1/p + 1/p' = 1$, $1/q + 1/q' = 1$, а

$$W_p^1(S^0)_0 = \{g : g \in W_p^1, g(x_i) = 0, i=0, 1, \dots, N\}.$$

Теорема 3. Допустим, что $p, q \in [1, \infty)$, а p' и q' числа, сопряженные с p и q соответственно. Тогда

а) Для любого $1 < p < \infty$ и $q = \infty$

$$E(W_p^1, S^0)_\infty = \frac{1}{2} \bar{\Delta}^{-1/p'}.$$

в) Если $p = 1$, $1 < q < \infty$, то

$$E(W_1^1, S^0)_q = \frac{1}{2} \bar{\Delta}^{-1/q}.$$

с) Если $q = 1$, $1 < p < \infty$, то

$$E(W_p^1, S^0)_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p'+1}\right)^{1/p'} \left(\sum_{i=1}^N \Delta_i^{p'+1}\right)^{1/p'} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p'+1}\right)^{1/p'} \bar{\Delta}.$$

В частности, если Δ^* — равномерное разбиение, т. е. узлы разбиения Δ^* определяются формулой $x_i^* = i/N$, $i=0, 1, \dots, N$, то

$$E(W_p^1, S_N^0)_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+p'} \right)^{1/p'} \frac{1}{N},$$

где S_N^0 — пространство кусочно-постоянных относительно этого разбиения.

д) Если $1 < q < \infty$, а $p \leq q$, то

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p'+1} \right)^{1/p'} \Delta^{-1/p'+1/q} &\leq E(W_p^1, S^0)_q \leq \\ &\leq \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2^{q-1}} \frac{p'}{p'+q} \right)^{1/p'} \Delta^{-1/p'+1/q}. \end{aligned}$$

е) Если $1 < q < \infty$ и $p > q$, то

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{p'+1} \right)^{1/p'} \left(\sum_{i=1}^N \Delta_i^{p'+1} \right)^{1/p'} \leq E(W_p^1, S^0)_q \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p'+q} \right)^{1/p'} \bar{\Delta},$$

а в случае равномерного разбиения

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{p'+1} \right)^{1/p'} \frac{1}{N} \leq E(W_p^1, S^0)_q \leq \frac{1}{2} \left(\frac{q}{p'+q} \right)^{1/p'} \frac{1}{N}.$$

ф) Если $p = \infty$, $1 < q < \infty$, то

$$\frac{1}{4} \sum_{i=1}^N \Delta_i^2 \leq E(W_\infty^1, S^0)_q \leq \frac{1}{2} \frac{q}{q+1} \bar{\Delta}.$$

В частности, когда $\Delta = \Delta^*$ — равномерное разбиение, то

$$\frac{1}{4N} \leq E(W_\infty^1, S_N^0)_q \leq \frac{q}{1+q} \frac{1}{2N}.$$

Замечание. Разумеется, что в случае равномерного разбиения пункты а), б), с) не перестают быть верными, если в этих пунктах $\bar{\Delta}$ заменить числом $1/N$. Если $E(W_p^1, S^0)_q$ рассматривать как функцию от переменных p и q , то результаты, приведенные в теореме, удобно написать в виде квадратной таблицы с вершинами $(1, 1)$, $(1, \infty)$, (∞, ∞) , $(\infty, 1)$, по горизонтали которого меняется p , а по вертикали — q . Например, в случае равномерного разбиения Δ^* таблица принимает вид:

В монографии [4] (гл. 6) показано, что в треугольнике с вершинами $(1, 1)$, $(1, \infty)$, (∞, ∞) (случай, когда $1 \leq p \leq q \leq \infty$) для произвольного разбиения Δ имеет место оценка

$$E(W_p^1, S^0)_q \leq \frac{1}{2} \Delta^{-1/p'+1/q},$$

причем точность установлена лишь в случае $p = \infty$, $q = \infty$. Когда $\Delta = \Delta^*$ — разбиение равномерное, $N = 2n$ — число четное, в [5] через нормы сплайнов Эйлера сверху оценены величины $E(W_1^1, S_{2n}^0)_q$ и $E(W_p^1, S_{2n}^0)_\infty$. В частности доказано, что

$$E(W_\infty^1, S_{2n}^0)_\infty \leq \frac{1}{4n} = \frac{1}{2N}, \quad E(W_\infty^1, S_{2n}^0)_1 \leq \frac{1}{8n} = \frac{1}{4N},$$

$$E(W_1^1, S_{2n}^0)_1 \leq \frac{1}{4n} = \frac{1}{2N}.$$

$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{c}
 (1, \infty) \\
 \left. \begin{array}{l}
 \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p'+1} \right)^{1/p'} \left(\frac{1}{N} \right)^{1/q+1/p'} \\
 \leq E(W_p^1, S_N^0)_q \leq \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2^{q-1}} \right) \times \\
 \times \frac{p'}{p'+q} \left(\frac{1}{N} \right)^{1/p'+1/q} \\
 \frac{1}{2} \left(\frac{1}{N} \right)^{1/q}
 \end{array} \right\} \\
 \rho=1
 \end{array} \\
 \begin{array}{c}
 (\infty, \infty) \\
 \left. \begin{array}{l}
 \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p'+1} \right)^{1/p'} \frac{1}{N} \leq \\
 \leq E(W_p^1, S_N^0)_q \leq \frac{1}{2} \left(\frac{q}{p'+q} \right)^{1/p'} \frac{1}{N} \\
 \frac{1}{4N} \leq \\
 \leq E(W_\infty^1, S_N^0)_q \leq \\
 \leq \frac{q}{1+q} \cdot \frac{1}{2N}
 \end{array} \right\}
 \end{array} \\
 \begin{array}{c}
 (\infty, 1) \\
 \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p'+1} \right)^{1/p'} \frac{1}{N} \longrightarrow
 \end{array}
 \end{array}$$

$$E(W_1^1, S_{2n}^0)_1 \leq \frac{1}{4n} = \frac{1}{2N}.$$

Из теоремы видно, что приведенные выше оценки сверху на самом деле являются точными.

Доказательство теоремы 3. а) Сначала предположим, что $p=1$, $q=\infty$ ($p'=\infty$, $q'=1$). В силу (6)

$$E(W_1^1, S^0)_\infty = \sup \|g\|_\infty : g \in W_1^1, g(x_i) = 0, i = 0, 1, \dots, N\}.$$

Зафиксируем функцию $g \in W_1^1(S^0)_0$ и положим

$$M = \max_{0 < x < 1} |g(x)| = \|g\|_\infty.$$

Существует точка $c \in [0, 1]$ (предположим из интервала (x_{l-1}, x_l)) такая, что $M = |g_0(c)|$. Ввиду того, что $g(x_{l-1}) = g(x_l) = 0$ заключаем

$$M = \left| \int_{x_{l-1}}^c g'(u) du \right| = \left| \int_c^{x_l} g'(u) du \right|.$$

Повтому

$$\begin{aligned}
 2M &= \left| \int_{x_{l-1}}^c g'(u) du \right| + \left| \int_c^{x_l} g'(u) du \right| \leq \\
 &\leq \int_{x_{l-1}}^c |g'(u)| du + \int_c^{x_l} |g'(u)| du = \int_{x_{l-1}}^{x_l} |g'(u)| du \leq 1
 \end{aligned}$$

а, значит, $\|g\|_\infty \leq 1/2$ ($g \in W_1^1(S^0)_0$).

Функция

$$\bar{g}(x) = \begin{cases} (1/x_1)x, & \text{если } 0 \leq x \leq x_1/2 \\ (1/x_1)(1-x), & \text{если } x_1/2 \leq x \leq x_1 \\ 0, & \text{если } x_1 < x \leq 1 \end{cases}$$

принадлежит множеству $W_1^1(S^0)_0$, и кроме того

$$\|\bar{g}\|_\infty = \frac{1}{2}.$$

Следовательно, $E(W_1^1, S^0)_x = 1/2$.

Пусть теперь $1 < p \leq \infty$, $q = \infty$ ($1 < p' < \infty$, $q' = 1$) и $g \in W_1^1(S^0)_0$. Определим числа γ_i равенствами

$$\gamma_i = \int_{x_{i-1}}^{x_i} |g'(u)| du, \quad i=1, 2, \dots, N.$$

Тогда из условия $|g''_i| < 1$ имеем $\sum_{i=1}^N \gamma_i \leq 1$, а из ортогональности функции g' к подпространству S^0 следует, что

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} h_i^+(u) du = \frac{1}{2} \int_{x_{i-1}}^{x_i} |g'(u)| du = \frac{\gamma_i}{2}, \quad i=1, 2, \dots, N,$$

где h_i^+ — положительная часть сужения функции g' на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$. Поскольку на каждом сегменте $[x_{i-1}, x_i]$

$$g(x) = \int_{x_{i-1}}^x g'(u) du, \quad x_{i-1} \leq x \leq x_i,$$

то

$$\begin{aligned} \int_{x_{i-1}}^{x_i} |g(x)|^{p'} dx &= \int_{x_{i-1}}^{x_i} \left| \int_{x_{i-1}}^x g'(u) du \right|^{p'} dx \leq \int_{x_{i-1}}^{x_i} \left(\int_{x_{i-1}}^{x_i} h_i^+(u) du \right)^{p'} dx = \\ &= \int_{x_{i-1}}^{x_i} \left(\frac{1}{2} \int_{x_{i-1}}^{x_i} |g'(u)| du \right)^{p'} dx \leq \frac{1}{2^{p'}} \gamma_i^{p'} \Delta_i. \end{aligned}$$

Поэтому

$$\|g\|_{p'}^{p'} = \sum_{i=1}^N \int_{x_{i-1}}^{x_i} |g(x)|^{p'} dx \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{p'} \bar{\Delta}_i \sum_{i=1}^N \gamma_i^{p'}.$$

Но $\gamma_1^{p'} + \gamma_2^{p'} + \dots + \gamma_N^{p'} \leq 1$, ибо $\sum_{i=1}^N \gamma_i \leq 1$ и $p' > 1$. Следовательно

$$E(W_{p'}^1, S^0)_\infty = \sup_{g \in W_1^1(S^0)_0} \|g\|_{p'} \leq \frac{1}{2} \bar{\Delta}^{-1/p'} \quad (1 < p \leq \infty).$$

Чтобы построить экстремальную функцию, для которой последнее неравенство превращается в равенство, выберем индекс j , при котором $\bar{\Delta} = x_j - x_{j-1}$ и для достаточно малых $\varepsilon > 0$ положим

$$g_\varepsilon(x) = \begin{cases} (1/2\varepsilon)(x - x_{j-1}), & \text{если } x_{j-1} \leq x \leq x_{j-1} + \varepsilon \\ 1/2, & \text{если } x_{j-1} + \varepsilon \leq x \leq x_j - \varepsilon \\ (1/2\varepsilon)(x_j - x), & \text{если } x_j - \varepsilon \leq x \leq x_j \\ 0, & \text{если } x \notin [x_{j-1}, x_j]. \end{cases}$$

Нетрудно убедиться в том, что $g_\varepsilon(x) \in W_1^1(S^0)$, для любого $\varepsilon > 0$ и

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|g_\varepsilon\|_{p'} = \left(\int_{x_{j-1}}^{x_j} \left(\frac{1}{2}\right)^{p'} dx \right)^{1/p'} = \frac{1}{2} \bar{\Delta}^{1/p'}.$$

Этим часть а) теоремы 3 доказана.

в) Если $p = 1$, $1 < q < \infty$ и $g \in W_q^1(S^0)$ ($1/q' + 1/q = 1$), то определим числа γ_i следующим образом:

$$\gamma_i = \int_{x_{i-1}}^{x_i} |g'(u)|^{q'} du, \quad i = 1, 2, \dots, N.$$

Ясно, что $\sum \gamma_i \leq 1$. Чтобы сверху оценить $\max |g(x)|$ на каждом промежутке $[x_{i-1}, x_i]$ применим неравенство Гельдера:

$$\begin{aligned} \max_{x_{i-1} < x < x_i} |g(x)| &= \max_{x_{i-1} < x < x_i} \left| \int_{x_{i-1}}^x g'(u) du \right| \leq \max_{x_{i-1} < x < x_i} \int_{x_{i-1}}^x h^+(u) du \leq \int_{x_{i-1}}^{x_i} h_i^+(u) du = \frac{1}{2} \int_{x_{i-1}}^{x_i} |g'(u)| du \leq \\ &\leq \frac{1}{2} \left(\int_{x_{i-1}}^{x_i} |g'(u)|^{q'} du \right)^{1/q'} \left(\int_{x_{i-1}}^{x_i} du \right)^{1/q} \leq \frac{1}{2} \gamma_i^{1/q'} \Delta_i^{1/q}. \end{aligned}$$

Таким образом

$$\max_{x_{i-1} < x < x_i} |g(x)| \leq \frac{1}{2} \gamma_i^{1/q'} \Delta_i^{1/q},$$

а значит, $\|g\|_\infty < (1/2) \bar{\Delta}^{1/q}$, ибо $\gamma_i \leq 1$ для любого i .

Функция

$$g_0(x) = \begin{cases} \frac{-1/q'}{\bar{\Delta}} (x - x_{j-1}) x_{j-1} \leq x \leq x_{j-1} + \frac{\bar{\Delta}}{2} \\ \frac{-1/q'}{\bar{\Delta}} (x_j - x), & x_{j-1} + \frac{\bar{\Delta}}{2} \leq x \leq x_j \\ 0, & \text{в остальных случаях} \end{cases}$$

(j — индекс, при котором $x_j - x_{j-1} = \bar{\Delta}$) принадлежит классу $W_{q'}^1(S^0)_0$, и, кроме того

$$|g|_{-} = g\left(x_{j-1} + \frac{\bar{\Delta}}{2}\right) = \frac{1}{2} \bar{\Delta}^{-1/q'}.$$

Следовательно

$$E(W_1^1, S^0)_q = \frac{1}{2} \bar{\Delta}^{-1/q} (1 < q < \infty),$$

и часть в) доказана.

с) Пусть теперь $q = 1$ ($q' = \infty$), $1 < p < \infty$ и $g \in W_{\infty}^1(S^0)_0$, т. е. $|g|_{\infty} \leq 1$ и $g(x_i) = 0$, $i = 0, 1, \dots, N$.

Рассмотрим функцию

$$\bar{g}(x) = \begin{cases} x - x_{i-1}, & \text{если } x_{i-1} \leq x \leq x_{i-1} + \Delta_i/2 \\ x_i - x, & \text{если } x_{i-1} + \Delta_i/2 \leq x \leq x_i \end{cases}$$

и покажем, что $|g(x)| \leq \bar{g}(x)$ на любом сегменте $[x_{i-1}, x_i]$, $i = 0, 1, \dots, N$. В самом деле, если $x \in [x_{i-1}, x_{i-1} + \Delta_i/2]$, то

$$|g(x)| = \left| \int_{x_{i-1}}^x g'(u) du \right| \leq |g|_{-} \int_{x_{i-1}}^x du < x - x_{i-1} = \bar{g}(x).$$

Если же $x_{i-1} \leq t \leq \Delta_i/2 + x_{i-1}$, то

$$|g(x_{i-1} + x_i) - t| = \left| \int_{x_{i-1}}^t -g'(u) du \right| \leq t - x_{i-1}.$$

Положив $x = x_{i-1} + x_i - t$ будем иметь $x \in [x_{i-1} + \Delta_i/2, x_i]$ и

$$g(x) \leq x_i - x = \bar{g}(x), \quad x_{i-1} + \Delta_i/2 \leq x \leq x_i.$$

Таким образом, $|g(x)| \leq \bar{g}(x)$ ($0 \leq x < 1$), а значит, $|g|_{p'} \leq |\bar{g}|_{p'}$ для любого $p' \in [1, \infty]$. Поскольку $\bar{g} \in W_{\infty}^1(S^0)_0$, то на основании (6) можем утверждать

$$E(W_p^1, S^0)_i = |\bar{g}|_{p'}.$$

Но

$$\begin{aligned} |\bar{g}|_{p'}^{p'} &= \int_0^1 (\bar{g}(x))^{p'} dx = \sum_{i=1}^N \int_{x_{i-1}}^{x_i} (\bar{g}(x))^{p'} dx = \\ &= \sum_{i=1}^N 2 \int_{x_{i-1}}^{x_{i-1} + \Delta_i/2} (x - x_{i-1})^{p'} dx = \sum_{i=1}^N 2 \int_0^{\Delta_i/2} t^{p'} dt = \\ &= 2 \left(\frac{1}{2}\right)^{p'+1} \frac{1}{p'+1} \sum_{i=1}^N \Delta_i^{p'+1} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{p'} \frac{1}{p'+1} \bar{\Delta}^{-p'} \sum_{i=1}^N \Delta_i = \left(\frac{1}{2}\right)^{p'} \frac{1}{p'+1} \bar{\Delta}^{p'}. \end{aligned}$$

Поэтому

$$E(W_p^1, S^0)_i = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p'+1} \right)^{1/p'} \left(\sum_{i=1}^N \Delta_i^{p'+1} \right)^{1/p'} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p'+1} \right)^{1/p'} \bar{\Delta}.$$

Когда же разбиение $\Delta = \Delta^*$ равномерное, то $\Delta_i = 1/N$ для любого $i = 1, 2, \dots, N$ и

$$E(W_p^1, S_N^0)_i = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p'+1} \right)^{1/p'} \frac{1}{N}.$$

Часть с) доказана.

Пусть теперь $1 < p, q < \infty$ и $g \in W_q^1(S^0)_0$. Определим числа γ_i равенствами

$$\gamma_i = \int_{x_{i-1}}^{x_i} |g'(u)|^{q'} du, \quad i = 1, 2, \dots, N.$$

Ясно, что $\sum \gamma_i \leq 1$. Так как $g \in W_q^1(S^0)_0$, то сужение функции g на сегмент $[x_{i-1}, x_i]$ ($1 \leq i \leq N$) является функцией из класса $A(q', \gamma_i, x_{i-1}, x_i)$ (см. следствие 2) и мы можем воспользоваться неравенствами (4) и (5).

d) Если $p < q$ ($p' > q'$), то в силу (5)

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} |g(x)|^{p'} dx \leq \left(\frac{1}{2} \right)^{p'} \left(1 - \frac{1}{2^{q-1}} \frac{p'}{p'+q} \right) \Delta_i^{p'/q+1}, \quad i = 1, 2, \dots, N.$$

Просуммировав последнее неравенство по i , получаем

$$\begin{aligned} |g|_{p'}^{p'} &= \int_0^1 |g(x)|^{p'} dx = \sum_{i=1}^N \int_{x_{i-1}}^{x_i} |g(x)|^{p'} dx \leq \\ &\leq \left(\frac{1}{2} \right)^{p'} \left(1 - \frac{1}{2^{q-1}} \frac{p'}{p'+q} \right) \sum_{i=1}^N \gamma_i^{p'/q'} \Delta_i^{p'/q+1} \leq \\ &\leq \left(\frac{1}{2} \right)^{p'} \left(1 - \frac{1}{2^{q-1}} \frac{p'}{p'+q} \right) \bar{\Delta}^{p'/q+1} \sum_{i=1}^N \gamma_i^{p'/q'}. \end{aligned}$$

Но $\sum \gamma_i^{p'/q'} \leq 1$, поскольку $\sum \gamma_i \leq 1$ и $p' > q'$. Поэтому, в силу (6)

$$\begin{aligned} E(W_p^1, S^0)_q &= \sup_{g \in W_q^1(S^0)_0} |g|_{p'} < \\ &\leq \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2^{q-1}} \frac{p'}{p'+q} \right)^{1/p'} \bar{\Delta}^{-1/p'+1/q} \quad (1 < p < q < \infty). \end{aligned}$$

Чтобы получить оценку снизу, положим

$$g_0(x) = \begin{cases} \bar{\Delta}^{-1/q} (x - x_{j-1}), & \text{если } x_{j-1} \leq x \leq x_{j-1} + \bar{\Delta}/2 \\ \bar{\Delta}^{-1/q} (x_j - x), & \text{если } x_{j-1} + \bar{\Delta}/2 \leq x \leq x_j \\ 0, & \text{если } x \notin [x_{j-1}, x_j]. \end{cases}$$

где индекс j выбран из условия $x_j - x_{j-1} = \bar{\Delta}$. Непосредственной проверкой легко убедиться в том, что $g_0(x) \in W_q^1(S^0)_0$. С другой стороны

$$\begin{aligned} \|g_0\|_{p'} &= \left(\int_{x_{j-1}}^{x_j} (g(x))^{p'} dx \right)^{1/p'} = \left(2 \int_{x_{j-1}}^{x_j + \bar{\Delta}/2} \bar{\Delta}^{-p'/q'} (x - x_{j-1})^{p'} dx \right)^{1/p'} = \\ &= 2^{1/p'} \bar{\Delta}^{-1/q'} \left(\int_0^{\bar{\Delta}/2} t^{p'} dt \right)^{1/p'} = 2^{1/p'} \bar{\Delta}^{-1/q'} \left(\frac{1}{p'+1} \right)^{1/p'} \left(\frac{\bar{\Delta}}{2} \right)^{1+1/p'} = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p'+1} \right)^{1/p'} \bar{\Delta}^{-1/p'+1/q'}, \end{aligned}$$

а значит

$$E(W_{p'}^1, S^0)_q \geq \|g_0\|_{p'} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+p'} \right)^{1/p'} \bar{\Delta}^{-1/p'+1/q'}$$

е) Если $p \geq q$ ($p' \leq q'$), то на каждом сегменте $[x_{i-1}, x_i]$, $i=1, 2, \dots, N$ мы можем воспользоваться оценкой (4), которая при указанных выше обозначениях запишется в следующем виде:

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} |g(x)|^{p'} dx \leq \left(\frac{1}{2} \right)^{p'} \frac{q}{p'+q} \gamma_i^{p'/q'} \Delta_i^{1+p'/q'}, \quad i=1, 2, \dots, N,$$

Суммируя по i , получаем

$$\begin{aligned} \|g\|_{p'}^{p'} &= \int_0^1 |g(x)|^{p'} dx = \sum_{i=1}^N \int_{x_{i-1}}^{x_i} |g(x)|^{p'} dx \leq \\ &\leq \left(\frac{1}{2} \right)^{p'} \frac{q}{p'+q} \sum_{i=1}^N \gamma_i^{p'/q'} \Delta_i^{1+p'/q'}. \end{aligned}$$

Поскольку $0 < p'/q' \leq 1$, то в силу неравенства Иенсена (см. [1], с. 62)

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N \gamma_i^{p'/q'} \Delta_i^{1+p'/q'} &= \sum_{i=1}^N \gamma_i^{p'/q'} \frac{\Delta_i^{p'/q'} \Delta_i^{1+p'/q'}}{\Delta_i^{p'/q'}} = \\ &= \sum_{i=1}^N \gamma_i^{p'/q'} \Delta_i^{p'} \Delta_i^{-p'/q'} \leq \bar{\Delta}^{-p'} \sum_{i=1}^N \gamma_i^{p'/q'} \Delta_i^{1-p'/q'} \leq \\ &\leq \bar{\Delta}^{-p'} \sum_{i=1}^N \left(\frac{p'}{q'} \gamma_i + \left(1 - \frac{p'}{q'} \right) \Delta_i \right) \leq \bar{\Delta}^{-p'} \left(\frac{p'}{q'} + 1 - \frac{p'}{q'} \right) = \bar{\Delta}^{-p'}. \end{aligned}$$

Следовательно

$$\begin{aligned} E(W_{p'}^1, S^0)_q &= \sup_{g \in W_{p'}^1(S^0)_0} \|g\|_{p'} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{q}{p'+q} \right)^{1/p'} \cdot \\ &\cdot \left(\sum_{i=1}^N \gamma_i^{p'/q'} \Delta_i^{1+p'/q'} \right)^{1/p'} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{q}{p'+q} \right)^{1/p'} \bar{\Delta}^{-p'/p'}. \end{aligned}$$

Этим правые части неравенств пункта е) доказаны, ибо в случае равномерного разбиения $\bar{\Delta} = 1/N$.

Чтобы получить оценки снизу, рассмотрим функцию g , определенную в е). Тогда

$$\|g\|_{q'}^{q'} = \sum_{i=1}^N \int_{x_{i-1}}^{x_i} |\bar{g}'(x)|^{q'} dx = \sum_{i=1}^N \int_{x_{i-1}}^{x_i} dx = \sum_{i=1}^N \Delta_i = 1,$$

т. е. $\bar{g} \in W_{q'}^1(S^0)_0$. С другой стороны

$$\|\bar{g}\|_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p'+1} \right)^{1/p'} \left(\sum_{i=1}^N \Delta_i^{p'+1} \right)^{1/p'},$$

откуда видно, что

$$E(W_{p'}^1, S^0)_q > \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p'+1} \right)^{1/p'} \left(\sum_{i=1}^N \Delta_i^{p'+1} \right)^{1/p'}.$$

Когда Δ — равномерное разбиение, то $\Delta_i = 1/N$, $i=1, 2, \dots, N$ и сумма, стоящая в последнем неравенстве, равна $1/N$.

г) Допустим, что $p = \infty$ ($p' = 1$) и $1 < q < \infty$. Тогда для любой функции $g \in W_{q'}^1(S^0)_0$, в силу е)

$$\|g\|_1 = \lim_{p' \rightarrow 1} \|g\|_{p'} \leq \frac{1}{2N} \lim_{p' \rightarrow 1} \left(\frac{q}{p'+q} \right)^{1/p'} = \frac{1}{2N} \frac{q}{1+q}.$$

т. е.

$$E(W_{\infty}^1, S^0)_q = \sup_{g \in W_{q'}^1(S^0)_0} \|g\|_1 \leq \frac{1}{2N} \frac{q}{1+q}.$$

С другой стороны, для функции g (которая принадлежит классам $W_{q'}^1(S^0)_0$ при любом q'), рассмотренной в пункте с) теоремы 3, имеем, что

$$\begin{aligned} E(W_{\infty}^1, S^0)_q &\geq \|g\|_1 = \lim_{p' \rightarrow 1} \|\bar{g}\|_{p'} = \\ &= \frac{1}{2} \lim_{p' \rightarrow 1} \left(\frac{1}{p'+1} \right)^{1/p'} \left(\sum_{i=1}^N \Delta_i^{p'+1} \right)^{1/p'} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^N \Delta_i^2. \end{aligned}$$

В частности, при равномерном разбиении $\Delta = \Delta^*$

$$E(W_{\infty}^1, S_{\Delta}^0)_q \geq \|g\|_1 = \frac{1}{4N}.$$

Итак, оба неравенства пункта г) установлены. В наших рассуждениях мы существенно воспользовались тем, что $\|g\|_{p'} \rightarrow \|g\|_1$ при $p' \rightarrow 1$ для произвольной непрерывной функции g . Докажем этот факт.

Пусть p'_n — произвольнаяходящая к 1 последовательность и

$$g_n(x) = |g(x)|^{p'_n}, \quad n=1, 2, 3, \dots$$

Тогда $g_n(x) \rightarrow |g(x)|$ для любого x и по теореме Лебега об ограниченной сходимости

$$\int_0^1 g_n(x) dx = \int_0^1 |g(x)|^{p_n} dx \rightarrow \int_0^1 |g(x)| dx.$$

Следовательно

$$\|g\|_{p_n} = \left(\int_0^1 |g(x)|^{p_n} dx \right)^{1/p_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^1 |g(x)| dx \right)^{1/p_n} = \|g\|_1.$$

Таким образом, $\|g\|_{p_n} \rightarrow \|g\|_1$ для любой последовательности p_n , которая сходится к единице, что и требовалось доказать.

Доказательство теоремы 3 завершено.

3°. Двумерный случай. Пусть m, n — натуральные числа,

$$\Delta_1 = \left\{ \frac{i}{n} : i = 0, 1, \dots, n \right\}, \Delta_2 = \left\{ \frac{j}{m} : j = 0, 1, \dots, m \right\}$$

— одномерные равномерные разбиения, $\Delta = \Delta_1 \times \Delta_2$, $\Delta_{i,j} = \left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n} \right] \times \left[\frac{j-1}{m}, \frac{j}{m} \right]$ ($i = 1, 2, \dots, n$; $j = 1, 2, \dots, m$) и S_0 — пространство кусочно-постоянных относительно разбиения Δ квадрата I , т. е.

$$S_0 = \{s(x, y) : s(x, y) = \text{const на } \Delta_{ij}\}.$$

Через S_0^x и S_0^y обозначим пространства кусочно-постоянных функций одной переменной относительно Δ_1 и Δ_2 соответственно.

Рассмотрим класс $W_p^{1,1}$, определенный во введении и найдем наилучшее приближение этого класса пространством кусочно-постоянных в метрике L_{∞} . Как в одномерном случае, здесь мы тоже воспользуемся общими соотношениями двойственности для двух переменных, приведенными в [6]. В нашем частном случае там (с. 41) установлено, что

$$E(W_p^{1,1}, S_0)_{\infty} = \sup_{g \in W_p^{1,1}(S_0)} (\|g\|_{p'} + \|g(\cdot, 1)\|_{p'} + \|g(1, \cdot)\|_{p'}), \quad (7)$$

где

$$W_1^{1,1}(S_0)_0 = \{g \in L_1^{1,1} : \|g^{(1,1)}\|_1 \leq 1, g^{(1,1)} \perp S_0, g(x, 0) = g(0, y) = 0, g(x, 1) \in W_1^1(S_0^x)_0, g(1, y) \in W_1^1(S_0^y)_0\},$$

$$W_1^1(S_0^x)_0 = \{g \in L_1^1(0, 1) : \|g'\|_1 \leq 1, g(i/n) = 0, 0 \leq i \leq n\},$$

$$W_1^1(S_0^y)_0 = \{g \in L_1^1(0, 1) : \|g'\|_1 \leq 1, g(j/m) = 0, 0 \leq j \leq m\},$$

$$\text{а } g^{(1,1)} \perp S_0 \text{ означает, что } \int_{\Delta_{ij}} g^{(1,1)}(u, v) dudv = 0,$$

$$i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m.$$

Отметим, что из определения множества $L_1^{1,1}$ и из условий $g(0, y) = g(x, 0) = 0$ следует, что каждая функция $g \in W_1^{1,1}(S_0)_0$ допускает представление

$$g(x, y) = \int_0^x \int_0^y g^{(1,1)}(u, v) dudv, (x, y) \in I.$$

Теорема 4. Для любого $p \in [1, \infty]$

$$E(W_p^{1,1}, S_0)_\infty = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n}\right)^{1/p'} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{m}\right)^{1/p'} + \frac{1}{2} \left(\frac{m+n-1}{mn}\right)^{1/p'}, \quad (8)$$

где p' — число, сопряженное с p .

Доказательство. Пусть функция $g \in W_1^{1,1}(S_0)_0$ фиксирована. Поскольку $g(x, 1) \in W_1^1(S_0^1)_0$, а $g(1, y) \in W_1^1(S_0^2)_0$, то в силу пункта а) теоремы 3

$$\|g(\cdot, 1)\|_{p'} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n}\right)^{1/p'}, \quad \|g(1, \cdot)\|_{p'} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{m}\right)^{1/p'}. \quad (9)$$

Докажем, что

$$\|g\|_{p'} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{m+n-1}{mn}\right)^{1/p'}.$$

Определим функции $h_{ij}(u, v)$ и числа γ_{ij} ($i = 1, 2, \dots, n; j = 1, \dots, m$) следующим образом:

$$h_{ij}(u, v) = \begin{cases} g^{(1,1)}(u, v), & \text{если } (u, v) \in \Delta_{ij} \\ 0, & \text{если } (u, v) \notin \Delta_{ij}, \end{cases}$$

$$\gamma_{ij} = \iint_{\Delta_{ij}} |g^{(1,1)}(u, v)| \, dudv = \iint_{\Delta_{ij}} |h_{ij}(u, v)| \, dudv.$$

Очевидно, что $\sum_{ij} \gamma_{ij} < 1$ (здесь и в дальнейшем вместо суммы

$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m$ напомним $\sum_{ij}$) и

$$g^{(1,1)}(u, v) = \sum_{ij} h_{ij}(u, v), \quad (u, v) \in I.$$

Если

$$h_{ij}^+(u, v) = \frac{1}{2} (|h_{ij}| + h_{ij}), \quad h_{ij}^-(u, v) = \frac{1}{2} (|h_{ij}| - h_{ij})$$

соответственно положительная и отрицательная части функции $h_{ij}(u, v)$, то

$$\iint_{\Delta_{ij}} h_{ij}(u, v) \, dudv - \iint_{\Delta_{ij}} h_{ij}^-(u, v) \, dudv = \iint_{\Delta_{ij}} h_{ij}^+(u, v) \, dudv = 0,$$

$$\iint_{\Delta_{ij}} h_{ij}^+(u, v) \, dudv + \iint_{\Delta_{ij}} h_{ij}^-(u, v) \, dudv = \iint_{\Delta_{ij}} |h_{ij}(u, v)| \, dudv = \gamma_{ij}.$$

Из последних равенств имеем, что

$$\iint_{\Delta_{ij}} h_{ij}^+(u, v) \, dudv = \iint_{\Delta_{ij}} h_{ij}^-(u, v) \, dudv = \frac{\gamma_{ij}}{2}$$

для любых $i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m$.

Положим

$$E_{ij} = \left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n} \right] \times \left[\frac{j-1}{m}, \frac{j}{m} \right] \cup \left[\frac{i}{n}, 1 \right] \times \left[\frac{j-1}{m}, \frac{j}{m} \right],$$

$$H_{ij}(x, y) = \int_0^x \int_0^y h_{ij}(u, v) dudv \quad (1 \leq i \leq n; 1 \leq j \leq m).$$

Нетрудно видеть, что $H_{ij}(x, y) = 0$ вне множества E , а во всех точках (x, y) множества E

$$H_{ij}(x, y) \leq \int_0^x \int_0^y h_{ij}(u, v) dudv = \frac{\gamma_{ij}}{2}, \quad (x, y) \in E.$$

Теперь можем оценить $\|g\|_{p'}$:

$$\begin{aligned} \|g(x, y)\|_{p'} &= \left\| \int_0^x \int_0^y g^{(1,1)}(u, v) dudv \right\|_{p'} = \\ &= \left\| \sum_{ij} \int_0^x \int_0^y h_{ij}(u, v) dudv \right\|_{p'} = \left\| \sum_{ij} H_{ij}(x, y) \right\|_{p'} \leq \\ &\leq \sum_{ij} \|H_{ij}(x, y)\|_{p'} \leq \sum_{ij} \left(\int_{E_{ij}} \left(\frac{\gamma_{ij}}{2} \right)^{p'} dx dy \right)^{1/p'} = \\ &= \sum_{ij} \frac{\gamma_{ij}}{2} \left(\frac{m+n-i-j+1}{mn} \right)^{1/p'} \leq \\ &\leq \frac{1}{2} \left(\frac{m+n-1}{mn} \right)^{1/p'} \sum_{ij} \gamma_{ij} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{m+n-1}{mn} \right)^{1/p'}. \end{aligned}$$

Таким образом

$$\|g\|_{p'} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{m+n-1}{mn} \right)^{1/p'},$$

а из (7) и (9) следует, что

$$E(W_p^{1,1}, S_0)_\infty \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} \right)^{1/p'} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{m} \right)^{1/p'} + \frac{1}{2} \left(\frac{m+n-1}{mn} \right)^{1/p'}, \quad (10)$$

т. е. левая часть (8) не больше его правой части.

Чтобы доказать обратное неравенство для достаточно малых $\varepsilon > 0$ рассмотрим функцию

$$h_\varepsilon(u, v) = \begin{cases} 1/2\varepsilon^2, & \text{если } 0 \leq x \leq \varepsilon, 0 \leq y \leq \varepsilon \\ -1/2\varepsilon^2, & \text{если } 1/n - \varepsilon \leq x \leq 1/n, \\ & 1/m - \varepsilon \leq y \leq 1/m, \\ 0, & \text{в остальных случаях} \end{cases}$$

и положим

$$g_\varepsilon(x, y) = \int_0^x \int_0^y h_\varepsilon(u, v) du dv.$$

Ясно, что $g_\varepsilon \in \mathcal{W}_1^{1,1}(S_0)_0$ при всех достаточно малых $\varepsilon > 0$. Так как

$$g_\varepsilon(x, 1) = \begin{cases} x/2\varepsilon, & \text{если } 0 \leq x \leq \varepsilon \\ 1/2, & \text{если } \varepsilon \leq x \leq 1/n - \varepsilon \\ (1/2\varepsilon)(1/n - x), & \text{если } 1/n - \varepsilon \leq x \leq 1/n \\ 0, & \text{если } 1/n \leq x \leq 1, \end{cases}$$

то легко проверить, что

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|g_\varepsilon(\cdot, 1)\|_{p'} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n}\right)^{1/p'}.$$

Аналогично

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|g_\varepsilon(1, \cdot)\|_{p'} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{m}\right)^{1/p'}.$$

Непосредственной проверкой можно убедиться в том, что

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|g_\varepsilon\|_{p'} = \frac{1}{2} \left(\frac{m+n-1}{mn}\right)^{1/p'}.$$

Таким образом, для любого $\delta > 0$ можно указать $\varepsilon > 0$ такое, что

$$\begin{aligned} & \|g_\varepsilon\|_{p'} + \|g_\varepsilon(\cdot, 1)\|_{p'} + \|g_\varepsilon(1, \cdot)\|_{p'} \geq \\ & \geq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n}\right)^{1/p'} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{m}\right)^{1/p'} + \frac{1}{2} \left(\frac{m+n-1}{mn}\right)^{1/p'} - \delta. \end{aligned}$$

Но $g_\varepsilon(x, y) \in \mathcal{W}_1^{1,1}(S_0)_0$, поэтому

$$E(\mathcal{W}_p^{1,1}, S_0)_\infty \geq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n}\right)^{1/p'} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{m}\right)^{1/p'} + \frac{1}{2} \left(\frac{m+n-1}{mn}\right)^{1/p'}.$$

Комбинируя последнее неравенство с (10), получаем (8). Теорема 4 доказана.

В заключение отметим, что утверждение теоремы 4 в случае $p = \infty$ ($p' = 1$) ранее было получено автором в работе [6].

Институт математики
АН Армянской ССР

Поступила 5. II. 1987

Ա. Մ. ԱՎԱԳՅԱՆ. Առաջին կարգի սահմանափակ տծանցյալ ունեցող մեկ և երկու փոփոխականի ֆունկցիաների դասերի լավագույն մոտարկումը կտոր առ կտոր հաստատուններով (ամփոփում)

Հորվածում ճշգրիտ գնահատականներ են ստացվել Արարելյան դասերը կամայական L_q տարածության մեջ կտոր առ կտոր հաստատուններով մոտարկելու դեպքում: Որոշ ճշգրիտ գնահատականներ ընդհանրացվել են երկու փոփոխականի ֆունկցիաների համար:

A. M. AVAKIAN. *On the best approximation of functions with bounded first derivative by piecewise constants in one and two dimensions* (summary)

In the paper exact error bounds are obtained in arbitrary L_q spaces, when Sobolev classes are approximated by piecewise constants. Some exact estimates are generalized for functions of two variables.

ЛИТЕРАТУРА

1. W. Rudin. Real and complex analysis, New York, Mc. GRAW—HILL,
2. У. Рудин. Основы математического анализа, М., Мир, 1976, 319 с.
3. Н. П. Корнейчук. Сплайны в теории приближения, М., Наука, 1984, 352 с.
4. L. L. Skaufers. Spline functions: Basic theory, New York, J. Wiley & Sons., 1981
5. Н. П. Корнейчук. О наилучшем приближении на отрезке классов функций с ограниченной r -й производной конечномерными подпространствами, Укр. матем. журн., 31, № 1, 1979, 23—31.
6. А. М. Авакян. Двойственные соотношения для некоторых классов функций двух переменных, Киев, Ин-т математики АН УССР, препринт 83. 41. 1983, 44 с.