О ПОСТРОЕНИИ ЦЕЛЫХ И КВАЗИЦЕЛЫХ ФУНКЦИЙ КОНЕЧНОГО ПОРЯДКА, РАВНОМЕРНО УБЫВАЮЩИХ В УГЛОВОЙ ОБЛАСТИ, II

Г. В. Бадалян

Известия Национальной Академии Наук Армении. Математика,
т. 32, № 2, 1997

В первой статье с тем же названием (настоящий журнал, т. 31, № 6, стр. 11 – 25, 1996) была рассмотрена задача о максимальной скорости убывания целых или квазицелых функций в угловой области $|\arg z| \leq \alpha/2$ при $0 < \alpha < \pi$. В отличие от теоремы Н. У. Аракеяна, не было сделано какого-либо утверждения относительно расположения нулей целых функций. Целью было выяснить существенность условия $p(r)r^{-\pi/\alpha} \downarrow 0$ при $r \rightarrow \infty$ и вывести условия, при которых аналоги результатов Аракеяна оставались бы справедливыми для целых и квазицелых функций. В настоящей работе рассматривается та же задача для $\pi \leq \alpha < 2\pi$.

§1. ВВЕДЕНИЕ

Эта работа является продолжением исследования, проведенного в работе [3]. Нас интересуют целые и квазицелые функции конечного порядка с быстрой скоростью убывания в угле $|\arg z| \leq \frac{\pi}{2\gamma} = \frac{\alpha}{2}$. Случай $\gamma \geq 1$ был рассмотрен в [3]. В настоящей статье рассматривается случай $1/2 < \gamma \leq 1$. Обе работы тесно связаны с работой Н. У. Аракеяна, доказавшего следующее утверждение (см. [1], стр. 189).

Теорема 1. Пусть $0 < \alpha < 2\pi$, $\rho = \max \left\{ \frac{\pi}{\alpha}, \frac{\pi}{2\pi - \alpha} \right\}$, и пусть $p(r)$, $r \geq 1$ – неотрицательная функция такая, что

$$p(r)r^{-\pi/\alpha} \downarrow 0 \text{ при } r \rightarrow \infty, \quad \int_1^{\infty} r^{-(\pi/\alpha+1)} p(r) dr \leq k < \infty. \quad (1)$$

Тогда существует целая функция $\omega_\alpha(z)$ порядка ρ и нормального типа, все нули

которой лежат вне угла $|\arg z| \leq \frac{\alpha}{2}$ и которая удовлетворяет неравенствам

$$\exp(-k|z|^{\pi/\alpha}) < |\omega_\alpha(z)| < \exp(-[\operatorname{Re} z^{\pi/\alpha} + p(|z|)]), \quad |\arg z| \leq \frac{\alpha}{2}, \quad |z| \geq 1. \quad (2)$$

Указанный тип или порядок нельзя понизить. По данному вопросу см. также [2] и замечание 1 в [3].

В данной работе рассматривается та же задача в случае $1/2 < \gamma = \frac{\pi}{\alpha} \leq 1$. В отличие от теоремы Аракеяна, не сделано какого-либо утверждения относительно нулей. Целью является выяснение существенности условия $p(r)r^{-\pi/\alpha} \downarrow 0$ при $r \rightarrow \infty$ в (1) и вывод аналогичных теорем для целых и квазицелых функций.

Пусть $T_*(r)$, $r > a > 0$ — монотонно возрастающая функция такая, что сходится интеграл

$$\int_a^\infty \frac{\ln T_*(r)}{r^{1+\gamma}} dr = \int_a^\infty \frac{\ln T_*(r)}{r^{1+\gamma}} dr, \quad a > 0. \quad (3)$$

Последовательность $\{M_n\}$ определим как

$$M_n = \sup_{r \geq a} \frac{r^n}{T_*(r)}. \quad (4)$$

Из [4], стр. 10 – 14 (см. также [3]) следует, что

$$T_*(r) = \sup_{n \geq 0} \frac{r^n}{M_n}, \quad (5)$$

т.е. $\{M_n\}$ является порождающей последовательностью для $T_*(r)$ и обладает свойством минимальности.

Рассмотрим последовательность $\{\dot{M}_n\}$, где $\dot{M}_n = M_n^\rho$, $\rho \geq 1$, и положим

$$\dot{T}(r) = \sup_{n \geq 0} \frac{r^n}{\dot{M}_n}. \quad (6)$$

Теорема 1. Из сходимости (3), где $T_*(r)$ определена в (5) и $1/2 < \gamma \leq 1$, $\rho = \frac{\gamma}{2\gamma-1} \geq 1$, следует сходимость интеграла

$$\int_a^\infty \frac{\ln \dot{T}(r)}{r^{1+1/\beta}} dr, \quad \beta = 2\rho - 1, \quad \rho \geq 1. \quad (7)$$

Доказательство. После замены r на $r^{1/\rho}$, будем иметь

$$\int_a^\infty \frac{\ln T_*(r)}{r^{1+\gamma}} dr = \frac{1}{\rho} \int_a^\infty \frac{\ln \dot{T}(r^{1/\rho})}{r^{1+1/\beta}} dr. \quad (8)$$

Но согласно (6)

$$T_*(r^{1/\rho}) = \sup_{n \geq 0} \frac{r^{n/\rho}}{M_n} = \sup_{n \geq 0} \left(\frac{r^n}{\dot{M}_n} \right)^{1/\rho} = [\dot{T}(r)]^{1/\rho}. \quad (9)$$

Из (8) и (9) следует одновременная сходимость (3) и (7).

Определение 1. Последовательность чисел $\{\mu_\nu\}$, где

$$0 < \mu_1 < \mu_2 < \dots < \mu_n < \dots, \quad \mu_{\nu+1} - \mu_\nu \geq h > 0, \quad \nu = 0, 1, \dots \quad (10)$$

принадлежит классу $A^*(1/\omega)$, $\omega > 0$, если сходится ряд

$$\sum \frac{\mu_\nu - \omega\nu}{\mu_\nu} \quad (11)$$

и

$$\mu_\nu - \omega\nu = \alpha_\nu = o(\nu^\delta), \quad 0 \leq \delta < 1/2, \quad \nu \rightarrow \infty. \quad (12)$$

Из (11) и (12) следует

$$\sum_{\mu_\nu \leq r} \frac{1}{\mu_\nu} = \frac{1}{\omega} \ln r + O(1), \quad r \rightarrow +\infty, \quad \frac{1}{\omega} = \rho.$$

Теорема 2 (см. [5], Теорема 8). Из сходимости (7) следует существование функции $0 \neq \varphi \in C^\infty[0, 1]$, удовлетворяющей условиям

$$1. \quad \varphi^{(n)}(1) = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad (13)$$

$$2. \quad \int_0^1 \varphi^{(n+1)}(t) t^{n-\tilde{\mu}_k} dt = 0, \quad \mu_{k_n} \leq n, \quad (13')$$

$$3. \quad |\varphi^{(n+1)}(x)| x^\delta \leq c c_1^2 \dot{M}_n, \quad n = 0, 1, \dots, \quad x \in [0, 1], \quad \delta \in (0, 1/2), \quad (14)$$

где последовательность $\tilde{\mu} = \{\tilde{\mu}_k\} \in A^*(\rho)$, $\dot{M}_n = M_n^\rho$.

Нам потребуются оценки (вообще говоря двусторонние) модулей следующих функций :

$$\Lambda_*(z, \mu) = \prod_{\nu=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{\mu_\nu^2} \right), \quad z = \sigma + iy, \quad |z \pm \mu_\nu| \geq \frac{h}{4}, \quad (15)$$

$$W(z, \mu) = e_{1, \infty}(z, \mu) = \prod_{\nu=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{\mu_\nu} \right) e^{-z/\mu_\nu}, \quad \operatorname{Re} z = \sigma > 0, \quad (16)$$

где μ_n — произвольная последовательность типа (10).

Теорема А. Вне кругов $\min |z \pm \mu_\nu| \leq h_1$ имеем

$$e^{-c_1|\sigma|}\Lambda^2(y, \mu) \leq |\Lambda_\sigma(\sigma + iy, \mu)| \leq e^{c_2|\sigma|}\Lambda^2(y, \mu), \quad (17)$$

где $h_1 \leq h/4$ и

$$\Lambda(y, \mu) = \prod_{\nu=1}^{\infty} \left(1 + \frac{y^2}{\mu_\nu^2}\right)^{1/2}. \quad (18)$$

Постоянные $c_1 > 0$, $c_2 > 0$ не зависят от σ и y .

Доказательство. См. [6], теорему 2.2.

Теорема В. Для функции $W(\sigma + iy, \mu)$, $\sigma > 0$, имеем

$$\begin{aligned} c_1 \Lambda(y, \mu) \exp\left(-\sigma \left(\sum_{\mu_\nu \leq r} \frac{1}{\mu_\nu} + c'_1\right)\right) &\leq \\ &\leq |W(\sigma + iy, \mu)| \leq c_2 \Lambda(y, \mu) \exp\left(-\sigma \left(\sum_{\mu_\nu \leq r} \frac{1}{\mu_\nu} - c'_2\right)\right), \end{aligned} \quad (19)$$

где постоянные $c_1 > 0$, $c'_1 > 0$, $c_2 > 0$ и $c'_2 > 0$ не зависят от σ и y .

Доказательство. Прежде всего заметим, что для $x > 0$

$$|W(x + iy, \mu)| = \Lambda(r, \mu) \prod_{\nu=1}^{\infty} \left(1 + \frac{2\mu_\nu x}{r^2 + \mu_\nu^2}\right)^{1/2} e^{-x/\mu_\nu},$$

где $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Следовательно, достаточно получить двусторонние оценки для функции

$$P(x, y) = \prod_{\nu=1}^{\infty} p_\nu(x, y),$$

где

$$p_\nu(x, y) = \left(1 + \frac{2\mu_\nu x}{r^2 + \mu_\nu^2}\right)^{1/2} e^{-x/\mu_\nu}.$$

Обозначим

$$P_{a,b}(x, y) = \prod_{a < \mu_\nu \leq b} p_\nu(x, y),$$

и оценим функции $P_{1,r-a}(x, y)$, $P_{r-a,r+a}(x, y)$, $P_{r+a,\infty}(x, y)$. Заметим, что функции $P_{1,r-a}(x, y)$ и $P_{r+a,\infty}(x, y)$ оцениваются аналогично ввиду того, что функция

$$g(u) = \frac{u}{r^2 + u^2}, \quad u \in (0, \infty)$$

достигает максимума в точке $u_0 = r$.

Для $\mu_\nu \geq r - a > 0$ и $\mu_\nu \geq r + a > 0$, $a > 0$ имеем

$$0 < \frac{2r\mu_\nu}{r^2 + \mu_\nu^2} < q < 1.$$

Поэтому для оценки

$$p_\nu(x, y) = \exp\left(\frac{1}{2} \ln\left(1 + \frac{2\mu_\nu x}{r^2 + \mu_\nu^2}\right) - x/\mu_\nu\right)$$

мы можем воспользоваться свойством степенного ряда логарифмической функции. Имеем

$$\exp\left(-x \sum_{\mu_\nu \leq r-a} \frac{1}{\mu_\nu}\right) < P_{1, r-a}(x, y) < \exp\left(-x \sum_{\mu_\nu \leq r-a} \frac{1}{\mu_\nu} + \sum_{\mu_\nu \leq r-a} \frac{\mu_\nu x}{r^2 + \mu_\nu^2}\right).$$

С другой стороны

$$\sum_{\mu_\nu \leq r-a} \frac{\mu_\nu x}{r^2 + \mu_\nu^2} < \frac{x}{r^2} \sum_{\mu_\nu \leq r-a} \mu_\nu \leq \frac{x \cdot r \cdot n(r)}{r^2} \leq c_2 x,$$

где $n(r)$ — числовая функция последовательности $\{\mu_\nu\}$. Так как $\mu_{\nu+1} - \mu_\nu \geq h > 0$, то $n(r) = O(r)$. Таким образом, мы доказали неравенства

$$\exp\left(-x \sum_{\mu_\nu \leq r-a} \frac{1}{\mu_\nu}\right) < P_{1, r-a}(x, y) < \exp\left(-x \left(\sum_{\mu_\nu \leq r-a} \frac{1}{\mu_\nu} - c_2\right)\right). \quad (20)$$

Для оценки $P_{r+a, \infty}(x, y)$ сперва заметим, что

$$\begin{aligned} \exp\left[-x \sum_{\mu_\nu \geq r+a} \left(\frac{1}{\mu_\nu} - \frac{\mu_\nu}{r^2 + \mu_\nu^2} + \left(\frac{\mu_\nu \sqrt{x}}{r^2 + \mu_\nu^2}\right)^2\right)\right] &< P_{r+a, \infty}(x, y) < \\ < \exp\left[-x \sum_{\mu_\nu \geq r+a} \left(\frac{1}{\mu_\nu} - \frac{\mu_\nu}{r^2 + \mu_\nu^2}\right)\right]. \end{aligned} \quad (21)$$

Поскольку

$$\frac{1}{\mu_\nu} - \frac{\mu_\nu}{r^2 + \mu_\nu^2} = \frac{r^2}{\mu_\nu(r^2 + \mu_\nu^2)},$$

то можем записать

$$\frac{1}{2} \frac{r^2}{\mu_\nu^3} \leq \frac{1}{\mu_\nu} - \frac{\mu_\nu}{r^2 + \mu_\nu^2} < \frac{r^2}{\mu_\nu^3}, \quad \left(\frac{\mu_\nu x}{r^2 + \mu_\nu^2}\right)^2 < \frac{x^2}{\mu_\nu^2}.$$

Поскольку $\mu_{\nu+1} - \mu_{\nu} \geq h > 0$, то имеем

$$0 < c' < \frac{r^2}{2} \sum_{\mu_{\nu} \geq r+a} \frac{1}{\mu_{\nu}^3} < \sum_{\mu_{\nu} \geq r+a} \left(\frac{1}{\mu_{\nu}} - \frac{\mu_{\nu}}{r^2 + \mu_{\nu}^2} \right) < 2r^2 \sum_{\mu_{\nu} \geq r+a} \frac{1}{\mu_{\nu}^3} \leq c'' < \infty.$$

Принимая во внимание неравенство

$$0 < \sum_{\mu_{\nu} \geq r+a} \left(\frac{\mu_{\nu} x}{r^2 + \mu_{\nu}^2} \right)^2 \leq x^2 \sum_{\mu_{\nu} \geq r+a} \frac{1}{\mu_{\nu}^2} \leq c \frac{x^2}{r} \leq c_2 x,$$

получим

$$0 < c_1 < P_{r+a, \infty}(x, y) < c_2 x, \quad (21')$$

где постоянные $c_1 > 0$ и $c_2 > 0$ не зависят от r и x .

Для оценки $P_{r-a, r+a}(x, y)$ используем следующее очевидное неравенство :

$$e^{-x/\mu_{\nu}} < p_{\nu}(x, y) < \exp \left(-\frac{x}{\mu_{\nu}} + \frac{\mu_{\nu} x}{r^2 + \mu_{\nu}^2} \right).$$

Имеем

$$e^{-x/\mu_{\nu}} < p_{\nu}(x, y) < \exp \left(-x \sum_{r-a < \mu_{\nu} \leq r+a} \frac{r^2}{\mu_{\nu} (r^2 + \mu_{\nu}^2)} \right).$$

Так как $\mu_{\nu+1} - \mu_{\nu} \geq h > 0$, то получим

$$0 < \sum_{r-a < \mu_{\nu} \leq r+a} \frac{1}{\mu_{\nu}} = O \left(\ln \frac{r+a}{r-a} \right) < c.$$

Это означает, что

$$e^{-c_1' x} < P_{r-a, r+a}(x, y) < e^{c_2' x}, \quad c_1' > 0, \quad c_2' > 0. \quad (22)$$

Далее имеем (см. (18))

$$\begin{aligned} \Lambda(y, \mu) &\leq \Lambda(r, \mu) = \prod_{\nu=1}^{\infty} \left(1 + \frac{y^2}{\mu_{\nu}^2} \right)^{1/2} \prod_{\nu=1}^{\infty} \left(1 + \frac{x^2}{y^2 + \mu_{\nu}^2} \right)^{1/2} \leq \\ &\leq \Lambda(y, \mu) \cdot \Lambda(x, \mu) \leq \Lambda(y, \mu) \cdot e^{cx}. \end{aligned}$$

Поскольку $\mu_{\nu+1} - \mu_{\nu} \geq h > 0$, то получим

$$1 < \Lambda(x, \mu) < e^{cx}.$$

Комбинируя эти неравенства с (20) — (22), мы завершим доказательство.

Перейдем теперь к выводу оценок для $|W(-\sigma - iy, \mu)|$ вне малых окрестностей

$$u_{\delta}(\mu_{\nu}) = |z - \mu_{\nu}| < \delta, \quad \nu = 1, 2, \dots$$

Теорема С. Для функции $|W(-\sigma - iy, \mu)|$, $\sigma > 0$ выполняются неравенства

$$A \frac{e^{-c_1 \sigma} \Lambda(y, \mu)}{\exp\left(-\sigma \left(\sum_{\mu_\nu \leq r} \frac{1}{\mu_\nu} - c_1'\right)\right)} \leq |W(-\sigma - iy, \mu)| \leq B \frac{e^{c_2 \sigma} \Lambda(y, \mu)}{\exp\left(-\sigma \left(\sum_{\mu_\nu \leq r} \frac{1}{\mu_\nu} + c_2'\right)\right)} \quad (23)$$

вне окрестностей $u_\delta(\mu_\nu)$, $\nu = 1, 2, \dots$, $0 < \delta < h/4$.

Доказательство. Имеем

$$W(-\sigma - iy, \mu) = e_{1, \infty}(-\sigma - iy, \mu) = \frac{\Lambda_*(\sigma + iy, \mu)}{e_{1, \infty}(\sigma + iy, \mu)} = \frac{\Lambda_*(\sigma + iy, \mu)}{W(\sigma + iy, \mu)}.$$

Применяя теоремы А и В, получим (23). Теорема С доказана.

Обозначим

$$\bar{\Gamma}(z, \mu) = \bar{\Gamma}(\sigma + iy, \mu) = \frac{1}{e_{1, \infty}(\sigma + iy, \mu)}, \quad \sigma > 0. \quad (24)$$

Нам нужна следующая версия теоремы В.

Теорема В'. Для функции $\bar{\Gamma}(\sigma + iy, \mu)$ и $\sigma > 0$, $|z| = |\sigma + iy| = r$ выполняются неравенства

$$\frac{\exp\left(\sigma \left(\sum_{\mu_\nu \leq r} \frac{1}{\mu_\nu} - c_1\right)\right)}{\Lambda(y, \mu)} \leq |\bar{\Gamma}(\sigma + iy, \mu)| \leq \frac{\exp\left(\sigma \left(\sum_{\mu_\nu \leq r} \frac{1}{\mu_\nu} + c_2\right)\right)}{\Lambda(y, \mu)},$$

где постоянные $c_1 > 0$, $c_2 > 0$ не зависят от σ и y .

Наконец, напомним определение квазицелых функций. Пусть $\{\lambda_\nu\}$ — числовая последовательность такая, что

$$\lambda_0 = 0 < \lambda_1 < \dots, \quad \lambda_{\nu+1} - \lambda_\nu \geq h > 0, \quad \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_\nu} = \infty.$$

Функция вида

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^{\lambda_k}, \quad (25)$$

определенная на римановой поверхности логарифмической функции $\text{Ln}(z)$, называется квазицелой, если радиус сходимости ряда (25) равен бесконечности.

Для квазицелых функций порядок и тип нами определяются так же, как это делается для целых функций, т.е.

$$\rho = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \lambda_n}{\ln |a_n|^{-1/\lambda_n}}, \quad (\sigma e \rho)^{1/\rho} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \lambda_n^{1/\rho} |a_n|^{1/\lambda_n}$$

(см. [7], стр. 250, 251).

§2. ОСНОВНОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Теорема 3. Из сходимости интеграла (3) следует существование целой или квазицелой функции, соответственно видов

$$f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k z^k, \quad \{\mu_\nu\} \in A^*(\rho) \quad \text{и} \quad f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k z^{\mu_k \rho}, \quad \{\mu_\nu \rho\} \in A^*(1)$$

порядка $\rho \geq 1$ и нормальных типов, удовлетворяющих условию

$$0 \neq |f(z)| \leq c \frac{r^{l_0}}{[T_*(r)]^\rho}, \quad |\arg z| \leq \frac{\pi}{2\gamma}, \quad \frac{1}{2} < \gamma \leq 1,$$

где число $l_0 > 0$ не зависит от z ($l_0 \geq 4\rho$).

Доказательство. Доказательство проведем для целой функции, где по ходу доказательства будет видно, что теорема 3 остается в силе и для квазицелых функций, указанного в теореме вида.

Из сходимости интеграла (3) следует сходимость интеграла (7). Следовательно удовлетворены условия теоремы 2.

Рассмотрим частный случай последовательности

$$A^*(\rho) \ni \bar{\mu} = \{\bar{\mu}_\nu\} = \{\mu'_\nu\} \cup \{\mu''_\nu = \nu\}_1^\infty, \quad \bar{\mu}_{\nu+1} - \bar{\mu}_\nu \geq h > 0, \quad (26)$$

$$\{\mu'_\nu\} \in A^*(\rho - 1), \quad \{\mu''_\nu\} \in A^*(1), \quad \{\mu'_\nu\} \cap \{\mu''_\nu\} = \emptyset,$$

а также последовательность вида (10), удовлетворяющую условию

$$\mu = \{\mu_\nu\} \in A^*(\rho), \quad \mu_{\nu+1} - \mu_\nu \geq h > 0. \quad (27)$$

Заметим, что во всех проводимых в настоящей работе вычислениях и оценках последовательность $\mu = \{\mu_\nu\}$ может быть заменена на $\{\nu/\rho\}$.

Обозначим

$$f_1(z) = \int_0^1 \varphi(t) p(zt, \sigma) \frac{dt}{t}, \quad -\frac{1}{\rho} < \sigma < \mu_1, \quad (28)$$

где функция $\varphi(t)$ удовлетворяет условиям теоремы 2 и

$$p(t, \sigma) = p_0(t, \sigma) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} \frac{\zeta t^{-\zeta} d\zeta}{e_{1,\infty}(-\zeta, \mu') e_{1,\infty}(\zeta, \mu)}, \quad (29)$$

где $e_{1,\infty}(\zeta, \mu)$ определена в (16), последовательности $\mu = \{\mu_\nu\}$ и $\mu' = \{\mu'_\nu\}$ определены в (27) и (26), соответственно.

Утверждаем, что искомая теоремой 3 целая (при $\mu = \{\nu/\rho\}$) или квазиполная (при $\mu = \{\mu_\nu\} \in A^*(\rho)$) функция имеет представление

$$f(z) = f_1(lz^\rho) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k z^{\mu_\nu \rho}, \quad (30)$$

где $f_1(z)$ определена в (28), $l > 0$ – удобно выбранное число.

Доказательству предположим следующие две леммы.

Лемма 1. В условиях теоремы 3 функция (30) целая (при $\mu = \{\nu/\rho\}$) или квазиполная (при $\mu = \{\mu_\nu\} \in A^*(\rho)$).

Доказательство. Доказательство проведем для случая $\mu = \{\nu/\rho\}$. Случай $\mu = \{\mu_\nu\} \in A^*(\rho)$ доказывается аналогично.

Нетрудно заметить, что из (29) следует равенство

$$p(t, \sigma) = \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}_{\zeta = -k/\rho} \frac{\zeta t^{-\zeta}}{e_{1,\infty}(-\zeta, \mu') e_{1,\infty}(\zeta, \nu/\rho)} + p(t, -\sigma_n), \quad (31)$$

где $n/\rho < \sigma_n < (n+1)/\rho$.

Поэтому

$$p(t, \sigma) = \sum_{k=1}^n a_k t^{k/\rho} + p(t, -\sigma_n), \quad (32)$$

где

$$a_k = \left(\frac{k}{\rho}\right)^2 \frac{e^{-1}}{e_{1,\infty}(k/\rho, \mu') \prod_{\substack{\nu=1 \\ \nu \neq k}}^{\nu=n} \left(1 - \frac{k}{\nu}\right) e^{k/\nu}}.$$

Из (28), согласно (32) будем иметь

$$f(z) = \sum_{k=1}^n b_k z^{k/\rho} + \int_0^1 \varphi(t) p(zt, -\sigma_n) \frac{dt}{t}, \quad (33)$$

где

$$b_k = a_k \int_0^1 t^{-1+k/\rho} \varphi(t) dt.$$

Полагая $y = 0$, $\tau = k/\rho$ и применяя теоремы В, С и В', получим

$$|a_k| = \frac{\tilde{\Gamma}(k/\rho, \mu')}{\tilde{\Gamma}(k/\rho, \mu)} \frac{1}{|\Lambda_*(k/\rho, \{\nu/\rho\})|_{\nu \neq k}} \frac{1}{2} \left(\frac{k}{\rho}\right)^2 = e^{O(k)} \frac{\tilde{\Gamma}(k/\rho, \mu')}{\tilde{\Gamma}(k/\rho, \mu)} = e^{O(k)} \frac{1}{\Gamma(k/\rho)}.$$

Аналогичную оценку можно получить для b_k . Докажем, что

$$\lim_{\sigma_n \rightarrow \infty} p(zt, -\sigma_n) = 0, \quad (34)$$

где $x = \operatorname{Re} z > 0$. Действительно, имеем

$$\begin{aligned} \frac{1}{|e_{1,\infty}(\sigma_n + iy, \mu')|} &= \frac{1}{\prod_{\nu=1}^{\infty} \left[\left(1 + \frac{\sigma_n}{\mu'_\nu} \right)^2 + \frac{y^2}{\mu'^2_\nu} \right]^{1/2} e^{-\frac{\sigma_n}{\mu'_\nu}}} = \\ &= \frac{\tilde{\Gamma}(\sigma_n, \mu')}{\prod_{\nu=1}^{\infty} \left(1 + \frac{y^2}{(\sigma_n + \mu'_\nu)^2} \right)^{1/2}}, \end{aligned} \quad (35)$$

и

$$\begin{aligned} \frac{1}{|e_{1,\infty}(-\sigma_n - iy, \mu)|} &= \frac{\left| \prod_{\nu=1}^{\infty} \left(1 + \frac{\sigma_n + iy}{\mu_\nu} \right) \exp \left(-\frac{\sigma_n + iy}{\mu_\nu} \right) \right|}{\left| \prod_{\nu=1}^{\infty} \left(1 - \left(\frac{\sigma_n + iy}{\mu_\nu} \right)^2 \right) \right|} \leq \\ &\leq \frac{e^{c\sigma}}{\tilde{\Gamma}(\sigma_n, \mu)} \frac{\prod_{\nu=1}^{\infty} \left(1 + \frac{y^2}{(\sigma_n + \mu_\nu)^2} \right)^{1/2}}{\Lambda^2(y, \mu)}, \end{aligned} \quad (36)$$

где $\Lambda(y, \mu)$ определена в (18).

Из (31), согласно (35) и (36) будем иметь

$$\begin{aligned} |p(zt, -\sigma_n)| &\leq \frac{\tilde{\Gamma}(\sigma_n, \mu')}{\tilde{\Gamma}(\sigma_n, \mu)} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{c\sigma}}{\Lambda^2(y, \mu)} \prod_{\nu=1}^{\infty} \left(\frac{1 + \frac{y^2}{(\sigma_n + \mu_\nu)^2}}{1 + \frac{y^2}{(\sigma_n + \mu'_\nu)^2}} \right)^{1/2} dy \leq \\ &\leq 2 \frac{\tilde{\Gamma}(\sigma_n, \mu')}{\tilde{\Gamma}(\sigma_n, \mu)} \int_0^{+\infty} \frac{e^{c\sigma}}{1 + y^2} dy \leq \frac{\exp \left(\sigma_n \sum_{\mu' \leq \sigma_n} \frac{1}{\mu'_\nu} \right)}{\exp \left(\sigma_n \sum_{\mu' \leq \sigma_n} \frac{1}{\mu_\nu} \right)} e^{c\sigma_n} \leq \\ &\leq e^{c'\sigma_n} \exp(-\sigma_n \ln \sigma_n), \end{aligned}$$

так как $\mu' \in A^*(\rho - 1)$, $\mu \in A^*(\rho)$. Этим доказана справедливость (34).

Поэтому из (33), после предельного перехода при $n \rightarrow \infty$, получим

$$f_1(z) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k z^{k/\rho}, \quad 0 < x < \infty.$$

Следовательно функция $f_1(z)$ аналитически продолжается на всю римановую поверхность логарифмической функции $\operatorname{Ln} z$, поэтому $f_1(z)$ является квазицелой.

Следовательно, функция

$$f(z) = f_1(lz^\rho) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k l^k z^k \quad (37)$$

целая и роста (ρ, σ) .

Совершенно очевидно, что если бы вместо последовательности $\mu = \{\nu/\rho\}$ мы взяли произвольную последовательность $\mu = \{\mu_\nu\} \in A^*(\rho)$, то получили бы квазирцелую функцию роста (ρ, σ) по степеням $\{\mu_\nu \rho\}$. Лемма 1 доказана.

Лемма 2. Функция $f_1(z)$ определенная в (28), где $\varphi(t)$ удовлетворяет условиям теоремы 2, имеет представление

$$f_1(z) = \frac{\pm 1}{\Gamma(n+1)} \int_0^1 \varphi^{(n+1)}(t) t^n p_n(zt, \sigma_n) dt, \quad \sigma < \sigma_n < n, \quad (38)$$

где

$$p_n(zt, \sigma) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} \frac{(zt)^{-\zeta} d\zeta}{\prod_{\nu=1}^n (-\zeta + \nu) e_{1,\infty}(-\zeta, \mu') e_{1,\infty}(\zeta, \nu/\rho)}, \quad -\frac{1}{\rho} < \sigma < \tilde{\mu}_1. \quad (39)$$

Доказательство. Из теоремы 2 следует

$$\varphi(t) = \frac{\pm 1}{\Gamma(n+1)} \int_t^1 \varphi^{(n+1)}(\tau) (t-\tau)^n d\tau.$$

Поэтому из (28) будем иметь

$$\begin{aligned} f_1(z) &= \frac{\pm 1}{\Gamma(n+1)} \int_0^1 p_n(zt, \sigma) \frac{dt}{t} \int_t^1 \varphi^{(n+1)}(\tau) (t-\tau)^n d\tau = \\ &= \frac{\pm 1}{\Gamma(n+1)} \int_0^1 \varphi^{(n+1)}(\tau) \mathcal{G}_n(z, \tau, \sigma) d\tau, \end{aligned} \quad (40)$$

где

$$\mathcal{G}_n(z, \tau, \sigma) = \frac{1}{\Gamma(n+1)} \int_0^\tau p_n(zt, \sigma) (t-\tau)^n \frac{dt}{t}. \quad (41)$$

Далее имеем

$$\mathcal{G}_n(z, \tau, \sigma) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} \frac{z^{-\zeta} \zeta d\zeta}{e_{1,\infty}(-\zeta, \mu') e_{1,\infty}(\zeta, \nu/\rho)} \int_0^\tau \frac{t^{-\zeta} (\tau-t)^n}{\Gamma(n+1)} \frac{dt}{t}.$$

С другой стороны, для $\text{Re}(-\zeta - 1) > -1$ ($\sigma = \text{Re}\zeta < 0$)

$$\frac{1}{\Gamma(n+1)} \int_0^\tau t^{-\zeta-1} (\tau-t)^n dt = \frac{\tau^{-\zeta+n}}{\Gamma(n+1)} \frac{\Gamma(-\zeta) \Gamma(n+1)}{\Gamma(-\zeta+n+1)} = \frac{\tau^{-\zeta+n}}{\prod_{\nu=1}^n (-\zeta + \nu)}.$$

Из условия (13') теоремы 2 и равенства

$$p_n(zt, \sigma) = \sum_{0 < \tilde{\mu}_k < \sigma_n} b_k^* (z \cdot t)^{-\tilde{\mu}_k} + p_n(zt, \sigma_n),$$

получим (38). Лемма 2 доказана.

Вернемся к доказательству теоремы 3. Нам нужна оценка сверху для $|p_n(zt, \sigma_n)|$, где $0 < n - l_0 < \sigma_n < n$, а z принимает комплексные значения, для которых существует интеграл

$$|p_n(zt, \sigma_n)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\sigma_n - i\infty}^{\sigma_n + i\infty} \frac{(zt)^{-\zeta} d\zeta}{e_{1,\infty}(-\zeta, \mu') e_{1,\infty}(\zeta, \nu/\rho) \prod_{\nu=1}^n (-\zeta + \nu)}. \quad (42)$$

Для этого оценим отдельно модули множителей подынтегральной функции в (42).

Заметим, что для $\zeta = \sigma_n + iy$, согласно теореме В, будем иметь

$$\frac{1}{|e_{1,\infty}(\sigma_n + iy, \nu/\rho)|} \leq \frac{\exp(\sigma_n \sum_{\nu/\rho \leq r} \frac{\rho}{\nu}) e^{c'' \sigma_n}}{\Lambda(r, \{\nu/\rho\})} \leq e^{c'' \sigma_n} \frac{\exp(\rho \sigma_n \ln r)}{\sinh(\frac{\pi}{2} \rho |y|)} \quad (43)$$

и

$$\begin{aligned} \frac{1}{|e_{1,\infty}(\sigma_n + iy, \mu')|} &\leq \frac{e^{c' \sigma_n} \Lambda(y, \mu')}{\Lambda^2(y, \mu') \exp((\rho - 1) \sigma_n \ln r)} \leq \\ &\leq \frac{e^{c' \sigma_n}}{\exp((\rho - 1) \sigma_n \ln r)} \cdot \frac{1}{\sinh(\frac{\pi}{2} (\rho - 1) |y|)}. \end{aligned} \quad (44)$$

Оценим, наконец, сверху

$$\frac{1}{\prod_{\nu=1}^n |\zeta - \nu|} = \frac{1}{\prod_{1 \leq \nu \leq \sigma_n} [y^2 + (\sigma_n - \nu)^2]^{1/2} \prod_{\sigma_n \leq \nu \leq n} [y^2 + (\sigma_n - \nu)^2]^{1/2}}.$$

Разберем два случая: а) $|y| \geq \sigma_n$ и б) $|y| < \sigma_n$.

В первом случае будем иметь ($k_0 = n - \sigma_n$)

$$\frac{1}{\prod_{\nu=1}^n |\zeta - \nu|} \leq \frac{1}{|y|^{\sigma_n}} \frac{1}{(1 + y^2)^{k_0/2}} \leq e^{c'' \sigma_n} \frac{\exp(-\sigma_n \ln r)}{(1 + y^2)^{k_0/2}},$$

так как $r = (\sigma_n^2 + y^2)^{1/2} \leq \sigma_n + |y| < 2|y|$.

В случае б) будем иметь

$$\frac{1}{\prod_{\nu=1}^n |\zeta - \nu|} \leq \frac{c}{\prod_{0 < \nu < \sigma_n} (\sigma_n - \nu) (1 + y^2)^{k_0/2}} \leq e^{c_2 \sigma_n} \frac{\exp(-\sigma_n \ln r)}{(1 + y^2)^{k_0/2}}.$$

Таким образом, в любом случае

$$\frac{1}{\prod_{\nu=1}^n |\zeta - \nu|} \leq e^{c_0 \sigma_n} \frac{\exp(-\sigma_n r)}{(1 + y^2)^{k_0/2}}. \quad (45)$$

Далее, с учетом (43) — (45) и неравенства

$$0 < c' < \frac{\Lambda(y, \mu')}{\Lambda(y, \{y/(\rho-1)\})} \leq c''$$

при $n - k_0 < \text{Re} z = \sigma_n < n$, будем иметь

$$\left| \frac{1}{e_{1,\infty}(-\zeta, \mu') e_{1,\infty}(\zeta, \nu/\rho) \prod_{\nu=1}^n (-\zeta + \nu)} \right| \leq \\ \leq c_0 e^{c\sigma_n} \frac{1}{\sinh(\frac{\pi}{2} \rho |y|) \sinh(\frac{\pi}{2} (\rho-1) |y|)} \cdot \frac{1}{1+y^2}.$$

Это значит, что если $|\arg z| \leq \frac{\pi}{2}(2\rho-1)$, то

$$|p_n(xt, \sigma_n)| \leq c'_0 e^c |xt|^{-\sigma_n} \int_0^\infty \frac{e^{y|\arg z|}}{e^{\frac{\pi}{2}(2\rho-1)y}} \frac{dy}{1+y^2} \leq \\ \leq c_0 \frac{e^{c\sigma_n}}{|z|^{\sigma_n}} t^{-\sigma_n}, \quad n - k_0 < \sigma_n < n, \quad k_0 \geq 4. \quad (46)$$

Возвращаясь к оценке $f_1(z)$, согласно (42), (46) и теореме 2, будем иметь

$$|f_1(z)| \leq c e^{c'n} \frac{\overset{\circ}{M}_n}{|z|^{\sigma_n}}, \quad |\arg z| \leq \frac{\pi}{2}(2\rho-1), \quad n = 1, 2, \dots$$

Заменяя z на lz^ρ , где $l > 0$ — удобно выбранное число, для функции (37) получим

$$|f(z)| = \left| \sum_{k=0}^{\infty} b_k^* z^k \right| \leq \frac{\overset{\circ}{M}_n}{|z|^{\sigma_n \rho}} = \frac{|z|^{l_0} \overset{\circ}{M}_n}{|z|^{n\rho}}$$

для любого $n - k_0 < \sigma_n < n$, если только

$$|\arg z| \leq \frac{\pi}{2} \frac{2\rho-1}{\rho} = \frac{\pi}{2\gamma},$$

где $\gamma \in (1/2, 1]$, $l_0 = \rho k_0 \geq 4\rho$.

Теорема 3 доказана.

ABSTRACT. In the first paper under the same title (this Journal, vol. 31, no. 6, pp. 11 – 25, 1996) the problem of maximal decrease rate of an entire or quasi-entire functions in an angular domain $|\arg z| \leq \alpha/2$ for $0 < \alpha < \pi$ was considered. In contrast to N. U. Arakelian's theorem, no assumption concerning positions of zeros of entire functions was done. The purpose was to clarify whether the condition $p(r)r^{-\pi/\alpha} \downarrow 0$ as $r \rightarrow \infty$ is essential, and to derive conditions under which the analogs of the Arakelian's results remain valid for entire and quasi-entire functions. The present paper considers the same problem for $\pi \leq \alpha < 2\pi$.

ЛИТЕРАТУРА

1. Н. У. Аракелян, "Построение целых функций, равномерно убывающих в угле", Изв. АН АрмССР, Математика, т. 1, № 3, стр. 162 — 191, 1966.
2. К. Н. Хачатрян, "Построение целых функций минимального порядка, убывающих в угле с заданной скоростью", Изв. АН АрмССР, Математика, т. 11, № 1, стр. 34 — 55, 1976.
3. Г. В. Бадалян, "О целых и квазидельных функциях конечного порядка, равномерно убывающих в угле, Γ ", Изв. НАН Армении, Математика, т. 31, № 6, стр. 11 — 25, 1996.
4. С. Мандельброт, Примыкающие ряды. Регуляризация последовательностей. Применения, ИЛ, М., 1955.
5. Г. В. Бадалян, "Построение бесконечно дифференцируемой функции с нулевыми моментами производных", Изв. НАН Армении, Математика, т. 30, № 3, стр. 1 — 12, 1995.
6. Г. В. Бадалян, "Обобщенная квазианалитичность и критерий единственности для одного класса аналитических функций", Изв. АН АрмССР, Математика, т. 38, № 2, стр. 339 — 378, 1974.
7. А. И. Маркушевич, Теория аналитических функций, т. 2, Наука, 1968.

2 июля 1996

Ереванский государственный университет