

С. К. Даль

Материалы по вертикальному распространению
пресмыкающихся, птиц и млекопитающих в долинах
рек Занги и Мисханы.

Несомненно, что долина р. Занги, связывающая горно-луговую и лесную зоны северной части Армянской ССР с зоной полупустыни долины Аракса, является миграционным путем как далекого прошлого, так и настоящего времени.

Господствующая в бассейне озера Севан горно-луговая зона, вниз по течению Занги, постепенно переходит в горные степи. Взаимное перекрывание этих зон, по А. К. Магакьяну (6), происходит в окрестностях селения Н. Ахта, примерно на высоте 1750—1780 метров над ур. моря. Далее и несколько западнее, параллельное распространение зоны горных лугов и горных степей тянется вниз по долине Занги до впадения в эту реку ее правого притока Караджеранки (1450 т.). Ниже Караджеранки и Озонлара река Занга почти 5 километров течет в зоне горных степей. За Гюмушем уже находится каменистая полупустыня с типичными флористическими группировками, распространенными вплоть до Аракса.

Разнообразие в экологическую обстановку долины среднего и верхнего течения реки Занги вносит ее правобережье. Мощный приток Занги, река Мисхана с одноименной долиной на протяжении 35 километров прорезает зоны субальпийских лугов и леса (правобережье р. Мисханы). У слияния Занги и Мисханы зона леса несколько удаляется, а ниже опять местами подходит к пойме Занги, господствуя на склонах гор, ограничивающих этот бассейн. В окрестностях селения Бжни, по правобережью развиты заросли ксероморфных кустарников, а выше их (против Солака) по склонам горы Алмалы имеются целые массивы можжевелового леса. Около Солака и ниже Бжни, по левому берегу Занги, находятся значительные площади садов (Урушанские и Халандар). Во многих пунктах по долине Занги берега ее и русло отлоги. Имеются заболоченные участки и реже родники. Местами эта долина представлена узким ущельем с отвесными скалами и крутым падением русла, несущим воду каскадами.

По долине р. Занги регулярно весной и осенью происходят перелеты болотных и водоплавающих птиц. По этому же пути сезонные миграции совершают и ряд других пернатых, в своих местообитаниях не связанных с водными площадями (сарычи, щурки, пеночки).

Особенный интерес в долине р. Занги и Мисханы представляют границы распространения млекопитающих, птиц и пресмыкающихся, свойственных определенным биокомплексам северных или южных районов Армянской ССР.

Цель настоящей статьи: зафиксировать распространение наземных позвоночных в долине реки Занги в настоящее время. Дальнейшая работа в этом направлении позволит разрешить интересную проблему об изменениях ареалов ряда видов в пределах Армянской ССР—вопрос, нами затронутый в шестом пункте выводов.

Работа по изучению распространения наземных позвоночных животных в долинах р. Занги и Мисханы, в основном, нами была проведена в 2 этапа.

1. В начале зимы 1945 г. (28 ноября—1 декабря) была пешком совершена экскурсия из сел. Н. Ахта до Караван-Сарай и затем по обоим берегам р. Мисханы—до сел. Улашик и истоков одноименной реки. От Караван-Сарай, по правобережью долина Занги была исследована до селения Бжни. От Бжни мы прошли до селения Фонтан.

2. Весной 1946 г. (10—25 мая) была проведена работа в окр. сел. Н. Ахта, Агпара и Караван-Сарай. От селения Солак по левому берегу Занги мы прошли до сел. Бжни. От Бжни по правому берегу до окр. Гюмуша, от последнего по левому берегу до окр. селения Канакер.

В дополнение к материалам, собранным нами за время этих двух экскурсий, в статью включены данные в этой области и из других работ, бывших в нашем распоряжении, а также из дневников многочисленных экскурсий, проведенных в окр. Еревана за 1933—1941 и 1945—1946 г. г.*

За время полевой работы большая помощь мне была оказана сотрудниками Зоологического Института Ак. Наук Арм. ССР—Т. М. Соснихиной, П. П. Гамбаряном и А. Х. Манукяном, которым я приношу искреннюю благодарность.

Пресмыкающиеся

1. *Каспийская черепаха*, *Clemmys caspica* Gm. В большом количестве наблюдались 22. V. 46 г. на заболоченной площади правобережья р. Занги в окр. Арзакана (1460). Обычна около Еревана (около 1000) и ниже города до долины Аракса.

2. *Греческая черепаха*, *Testudo graeca* L. По С. А. Чернову (7), найдена в окр. Пшакара (865) и около Еревана (ок. 1000).

3. *Кавказская агама*, *Agama caucasica* Eichw. Обычна около Еревана (ок. 1000) и выше в окр. Канакера (1290).

4. *Закавказская такырная круглоголовка*. *Phrynocephalus he-*

* В тексте статьи за пунктами регистрации животных, в скобках, помещены высоты в м над уровнем Черного моря.

Hoscoptus horvathi Meh. Наблюдались 13.X.46 г. в окр. Камир блура (920).

5. *Золотистая мабуя*, *Mabuya aurata septemtaeniata* R. По Чернову (7), добыта около Еревана (ок. 1000) и по правобережью Занги против Канакера (1200).

6. *Длинноногий сцинк*, *Eumeces schneideri princeps* Eichw. По Чернову (7), известен из окр. Паракара (865), с берега Занги (1200) и из окрестностей Еревана (ок. 1000).

7. *Прыткая ящерица*, *Lacerta agilis* L. Обычна на полях в окр. Агпари (1720), 20.V.46 г. нами добыта в садах Халандар (1630) несколько выше Бжни. По Чернову (7), известна из Мисханы (1980) и окрестностей Фонтана (ок. 2000).

8. *Полосатая ящерица*, *Lacerta strigata* Eichw. Отмечена нами 22.V.46 г. на песчаных наносах в пойме Занги в окр. Арзакана (1460).

9. *Средняя ящерица*, *Lacerta media* Lantz. et Суген. Добыт 1 экз. 21.V.46 г. под камнями в Урушанских садах (1495), находящихся по левобережью Занги ниже Бжни. По Чернову (7), известна из окр. Фонтана (ок. 2000).

10. *Скальная ящерица*, *Lacerta saxicola* Ev. В долинах рек Занги и Мисханы встречается два подвида:

a. *Lacerta saxicola disiliplii* Cam. Зарегистрирована от Канакера в окр. Еревана (950) до Караван-Сарай (1725).

b. *Lacerta saxicola armeniaca* Mehely. По Чернову (7), добыта в окр. Мисханы (1980) и около Тайчаруха (1770).

11. *Змееголовка*, *Ophisops elegans* Men. Несколько экземпляров наблюдались и 1 добыт 23.V.46 г. у селения Нурнус (1410), 24.V.46 г. змееголовки добыты ниже Арзни (1230 и 1250). По Чернову (7), известны из окр. Канакера (1290).

12. *Малоазиатская ящурка*, *Eremias strauchi* Kessl. По Чернову (7), добыта в окр. Еревана (ок. 1000) и Паракара (865).

13. *Закавказская ящурка*, *Eremias pleskei* Bedr. По Чернову (7), добыта в окр. селения Зар (1700).

14. *Желтопузик*, *Ophisaurus apodus* Pall. Молодой желтопузик добыт 23.V.46 г. в окр. Нурнуса (1410). Много взрослых экземпляров было зарегистрировано 24.V.46 г. по травянистым склонам ниже Арзни (1240—1260) и у Занги на высоте 1220 м.

15. *Слепозмейка*, *Typhlops vermicularis* Merg. По Чернову (7), этот вид известен из окр. Тохмакан-лича (950), окрестностей Еревана (ок. 1000), из Норка (1160), из окр. Канакера (1290) и Джервежа (1380).

16. *Западный степной удав*, *Eryx jaculus familiaris* Eichw. По Чернову (7), добыт в окр. Ботанического сада около Канакера (ок. 1200) и в окр. Норка (1160).

17. *Обыкновенный уж*, *Natrix natrix* L. По Чернову (7), добыт в окр. Паракара (865) и в окр. Еревана (ок. 1000).

18. *Водяной уж*, *Natrix tessellata* Laur. Зарегистрирован от Паракара (865) до Караван-Сарай (1725).
19. *Шахмар*, *Coluber jugularis erythrogaster* Fisch. По Чернову (7), известен из окрестностей Паракара (865) и Еревана (ок. 1000).
20. *Оливковый полоз*, *Coluber najadum* Eichw. Известен, по Чернову (7), из окр. Тохмакан-лица (ок. 950) и Еревана (ок. 1000).
21. *Разноцветный полоз*, *Coluber taeniatus* Men. Молодой экземпляр нами зарегистрирован на плато крепости в окр. Бжни (1540). По Чернову (7), известен с Севана (1916) и из окрестностей Еревана (ок. 1000—1300).
22. *Закавказский полоз*, *Elaphe hohenackeri* Str. По Чернову (7), добыт в окр. Еревана (ок. 1000).
23. *Четырехполосый полоз*, *Elaphe quatuorlineata* Lac. По Чернову (7), добыт в окр. сел. Дзак (1350).
24. *Медянка*, *Coronella austriaca* Laur. По Чернову (7), известна из окр. Фонтана (1815).
25. *Ошейниковая контия*, *Contia collaris* Mem. По Чернову (7), приведена для окр. Еревана (ок. 1000), Норка, (1160) и Джервежа (1380).
26. *Армянская контия*, *Contia punctatolineata* Boettg. Добыта нами 24.V.46 г. ниже Арзни (1250) на каменистом склоне у берега Занги. По Чернову (7), известна из окр. Норка (1160), окр. Еревана (ок. 1000) и Паракара (865).
27. *Кавказская кошачья змея*, *Taraphis fallax iberus* Eichw. По Чернову (7), известна из Еревана и его окрестностей (ок. 1000).
28. *Ящеричная змея*, *Malpolon monspessulanus* Herm. По Чернову (7), добыта в окр. Еревана (ок. 1000).
29. *Степная гадюка*, *Vipera ursini renardi* Christ. По Чернову (7), добыта в окр. Дарачичага (1850) и окр. Фонтана на горе Кетан-даг (ок. 2290).
30. *Гюрза*, *Vipera lebetina obtusa* Dwig. По Чернову (7), добыта в окр. Тохмакан-лица (950), в окр. Еревана (ок. 1000) и около Канакера (1290).

Птицы

1. *Перепел*, *Coturnix coturnix coturnix* L. От 13 по 17. V. 46 г. перепела были обычны в долине Занги около Н. Ахты (до 1800) и в окр. Агпары (1720—1725). На поле в окр. Арзакана эти птицы нами отмечены 22.V. 46 г. (1460). На южном склоне Памбакского хребта перепела зарегистрированы 24. VI. 40 г. на высоте 2575 м.
2. *Закавказская серая куропатка*, *Perdix perdix canescens* But. По наблюдениям в зимнее время года в долине Мисханы серые куропатки отмечены нами 29.XI. 45 г. на высоте 2580 м и 30.XI. 45 г. в нижней зоне леса на высоте 1850 м.

3. Кавказская каменная куропатка, *Alectoris graeca caucasica* Susch. По имеющимся сведениям (2), каменные куропатки на южном склоне Памбакского хребта встречаются по склонам от Рандамала (1730) до Тайчаруха (1770). Нами эти птицы наблюдались 1.XII.45 г. на скалистых склонах против селения Солак (1660). Пара каменных куропаток наблюдалась 12.V.46 г. в хаосе скал правобережья Занги между Агпарой и Караван-Саarem (1725). Следующая регистрация этих птиц сделана 24.V.46 г. в скалах по берегу Занги на высоте 1220 м.

4. Каспийский улар, *Tetraogallus caspius* Gm. Летом 1940 года (2) 9.VIII. нами найдены перья уларов в урочище Кер-оглы на высоте 2650 м. Зимой 1945 г. в этом же месте отмечен улар на высоте 2830 м н. у. м.

5. Кавказский тетерев, *Lyturus mlokosiewiczi* Tacz. Летом 1940 г. следы кавказских тетеревов мы наблюдали в Кер-оглы на высоте от 2500 до 2600 м (2), а зимой 1945 г. стая из 8 экземпляров этих птиц отмечена там же от 2430 до 2830 м. Соснин (5) приводит кавказских тетеревов для окр. Дарачичага (г. Алибек ок. 2830) и Карны-Ярыха (2440).

6. Вяхирь, *Columba palumbus* L. Несколько экземпляров наблюдалось 17.V.46 г. по старым деревьям на восточном склоне Мисханского хребта (1800—1900).

7. Сизый голубь, *Columba livia* Gm. Зарегистрирован от окр. Еревана (900) до Кер-оглы (2650).

8. Горлица, *Streptopelia turtur turtur* L. Зарегистрирована от окр. Бжни (1500) до Н. Ахты (1800) и склонов Мисханского хребта (1900).

9. Чернобрюхий рябок, *Pterocles orientalis* L. В 1939 г. зарегистрирован нами 14.III.—между селениями Шааб и Зар (1410), 19.III.—под горой Гядис (1450) и 27.III.—в окрестностях Эляра (1400). В 1946 г. эти птицы были встречены I.X. в окр. Кармир-блура (920)—около Еревана.

10. Лысуха, *Fulica atra atra* L. Наблюдалась в незначительном количестве 23.XI. 45 г. на разливах Занги в окр. Рандамала (1725).

11. Погоныш, *Rorzana porzana* L. Наблюдался 22.V.46 г. среди травы на сырой луговине около Занги ниже Бжни (1495).

12. Северный малый зуек, *Charadrius dubius curonicus* Gm. Зарегистрирован 24.V.46 г. на галечном берегу Занги в окр. сел. Птгнис (1230—1250). В долине Мисханы этот зуек нами отмечен в августе 1940 г. (2) от 1840 до 2200 м н. у. м.

13. Перевозчик, *Tringa hypoleucos* L. Зарегистрирован на Занге от Арзакана (1460) до окр. Агпары (1715).

14. Черныш, *Tringa ochropus* L. По зимним наблюдениям 1945 г. одиночные экземпляры чернышей были встречены 28. XI. на берегу Занги у Караван-Саара (1725) и около Агпары (1720). В долине Мисханы эти птицы отмечены на уровне 1740 м.

15. Бекас, *Capella gallinago gallinago* L. Зимой 1945 г. бекас на-

ми наблюдался 28. XI. на травянистом берегу Занги около Караван-Сарай (1725). Осенью, зимой и весной бекасы обычны по берегам Занги от ее низовьев до 1200 м н. у. м., по притоку Занги—Гедар-чаю поднимаются выше, вплоть до Башкенда (1450).

16. *Армянская серебристая чайка*, *Larus argentatus armenicus* But. Одиночные экземпляры и стаи серебристых чаек нами наблюдались 28 и 30 ноября 1945 г. в окр. Караван-Сарай (1725) и в долине реки Мисханы до 1750 м.

17. *Обыкновенная чайка*, *Larus ridibundus* L. Отмечена 16 и 17 V. 46 г. над Зангой в окр. Агпары (1720).

18. *Огарь*, *Tadorna ferruginea* Pall. На заболоченном участке в окр. Агпары (1720) одиночные экз. и пары огарей наблюдались 12, 13, 17 и 18. V. 46 г.

19. *Чирок-свистунок*, *Anas crecca crecca* L. Одиночные экземпляры и стаи чирков наблюдались нами 28 и 30 ноября в долине Мисханы до 1780 м н. у. м. и по Занге от Рандамала до сел. Кагсы (1675).

20. *Кряква*, *Anas platyrhynchos platyrhynchos* L. Зимой 1945 г. наблюдались вверх по Мисхане до 1780 м и по Занге 30. XI. 45 г. около сел. Агпара (1720). В 1946 году пролетающие селезни наблюдались 16. V. над болотом в окр. Агпары (1720), 22. V. на заболоченной площади правобережья Занги у Арзакана (1460) и 23. V. на Занге от 1420 до 1600 м н. у. м.

21. *Большой баклан*, *Phalacrocorax carbo* L. Осенью и зимой наблюдался по всей долине Занги.

22. *Белый аист*, *Ciconia ciconia ciconia* L. Вверх над Зангой между Агпарой и Караван-Сарай (1725) пара белых аистов пролетела 13. V. 45 г.

23. *Серая цапля*, *Ardea cinerea cinerea* L. В окр. Агпары (1720) серые цапли отмечены 14 и 16. V. 45 г. На берегу Занги эти птицы нами наблюдались 22. V. 46 г. ниже Арзакана (1460).

24. *Малая белая цапля*, *Egretta garzetta* L. В окр. Агпары (1720) на излучине Занги 19. V. 46 г. наблюдалась одна малая белая цапля и 22. V. 45 г. утром здесь же было 3 экз. этих птиц. Много белых цапель отмечено I. X. 46 г. на берегу Занги около Паракара (865).

25. *Малая выпь*, *Ixobrychus minutus* L. Зарегистрирована 16. V. 46 г. на краю оврага с текущей водой в окр. сел. Н. Ахта.

26. *Кавказский сапсан*, *Falco peregrinus caucasicus* Klein. Наблюдался Сосниным (5) в долине р. Мисханы выше Тайчаруха (ок. 1800).

27. *Чеглок*, *Falco subbuteo subbuteo* L. Пролетающий чеглок отмечен 15. V. 46 г. в окр. Н. Ахты (1790) и 19. V. 46 г. в окр. Агпары (1720). Наблюдался 20. V. 46 г. в саду Халандар (1630) и 22. V. 46 г. у Занги против Арзакана (1480).

28. *Дербник*, *Falco columbarius aesalon* Tunst. Один экземпляр наблюдался I. XII. 45 г. на скалах в окр. Бжни (1550).

29. *Пустельга*, *Falco tinnunculus tinnunculus* L. Зарегистрирована от окр. Еревана (950) до Кер-оглы (2600).
30. *Кавказский тетеревятник*, *Accipiter gentilis caucasicus* Klein. Отмечен Сосниным (5) в окрестностях сел. Мисхана (1980).
31. *Тювик*, *Accipiter badius brevipes* Sev. Один экземпляр наблюдался 30. XI. 45 г. у нижней опушки леса Мисханского хребта против Караван-Сарая (1725). Сосниным (5) отмечен в августе 1924 и 1930 г. г. для окрестностей Мисханы (1980).
32. *Перепелятник*, *Accipiter nisus nisus* L. Самку перепелятника мы наблюдали 28. XI. 45 г. на ивах у крайних домов Караван-Сарая (1725) и 30. XI. 45 г. в нижней полосе леса против Тайчаруха (1770). Этот вид добыт Сосниным (5) в окр. Мисханы (1980).
33. *Степной лунь*, *Circus macrourus* Gm. Пролетающий над полям самец степного луня зарегистрирован 18. V. 46 г. между Агпарой и Караван-Сараем (1725).
34. *Черный коршун*, *Milvus korschun korschun* Gm. В течение 12—18. V. 46 г. неоднократно наблюдался в окр. Н. Ахты (1800) и Агпары (1720). В 1940 г. (2) наблюдался в скалах Кер-оглы (2600) и в большом количестве в долине Мисханы от Тайчаруха (1770) до Улашиха (1910).
35. *Стервятник*, *Neophron percnopterus percnopterus* L. Парящий над Зангой стервятник отмечен 21. V. 46 г. в окр. Бжни (1530) и 24. V. 46 г. у гнезда в скалах между Джаткраном и Арзни (1310). В 1940 г. зарегистрирован нами (2) над южным склоном Памбакского хребта на высоте 2800 м.
36. *Бородач*, *Gypaetus barbatus aureus* Habl. Зарегистрирован нами (2) в 1940 г. в скалах Кер-оглы (дол. Мисханы) на высоте 2675 м н. у. м.
37. *Беркут*, *Aquila chrysaetos fulva* L. Над скалами в окр. Агпары (1720) парящий беркут наблюдался 12. V. 46 г. Пара парящих беркутов отмечена нами I. XII. 45 г. в окр. сел. Кагсы (1750) и вторая пара около Бжни (1500).
38. *Орел-карлик*, *Aquila rapax* Gm. Наблюдался 17. V. 46 г. летящий у опушки леса в овраге Ару (окр. Агпары) на высоте около 1800 м. Соснин (5) добыл орла-карлика в окр. Мисханы (1980).
39. *Кавказский сарыч*, *Buteo buteo tenebriosi* Bogd. Несколько экземпляров отмечено 17. V. 46 г. по полям в овраге Ару (окр. Агпары) на высоте около 1800 м, 18. V. 46 г. этот вид зарегистрирован на поле в окр. Н. Ахты (1780) и 21. V. 46 г.—в окр. Бжни (1530).
40. *Сарыч*, *Buteo buteo* subsp. Между Караван-Сараем (1725) и Агпарой (1720) 12. V. 46 г. на значительной высоте (500—600 метров) среди днЯ пролетели 84 экз. этих птиц; направление пролета их было с юга на север.
41. *Змеяд*, *Circaetus ferox* Gm. Наблюдался Сосниным (5) в лесу около Мисханы (1980).

42. *Осоед*, *Pernis apivorus* L. Наблюдался Сосниным (5) в окр. Мисханы (1980).
43. *Скопа*, *Pandion haliaetus* L. Отмечена нами (2) на р. Улаших (2120) 8. VIII. 40.
44. *Филин*, *Bubo bubo interpositus* Roth. Зарегистрирован от окр. Еревана (150) до Кероглы (2650).
45. *Ушастая сова*, *Asio otus* L. Наблюдалась Сосниным (5) в окр. Мисханы (1980).
46. *Кукушка*, *Cuculus canorus canorus* L. Кукующие кукушки наблюдались от 12 до 18. V. 46 г. в окр. Агпары (1720) и 22. V. 46 г. в Урушанских садах (1495). Соснин (5) отметил этих птиц для окр. Мисханы (1980).
47. *Черный стриж*, *Apus apus apus* L. Летящие одиночные экземпляры отмечены 16. V. 46 г. над Зангой между Агпарой и Караван-Сараем (1720—1725).
48. *Белобрюхий стриж*, *Apus melba melba* L. Гнездовые колонии встречаются по скалам обрывов у Занги от окр. Арзни (1250) до окр. Халандар (1630).
49. *Сизоворонка*, *Coracias garrulus garrulus* L. Этот вид обычен в окр. сел. Н. Ахта. 12 и 13. V. 46 г. сизоворонки в значительном количестве были встречены по полям вдоль дороги на Севан (1780—1800). Соснин (5) наблюдал этих птиц в окр. Мисханы (1980).
50. *Золотистая щурка*, *Megops apiaster* L. Зарегистрированы пролетающие по долинам Занги и Мисханы от низовьев до окр. Мисханы (1980).
51. *Уодод*, *Upupa epops epops* L. Зарегистрирован 12. V. 46 г. на тропе между Н. Ахты и Караван—Сараем (1750), 16. V. 46 г. в окр. Агпары (1720), 23. V. 46 г. на поле в окр. Нурнуса (1430) и 16. V. 46 г. на берегу Занги выше Канакера (1230).
52. *Вертишайка*, *Jynx torquilla torquilla* L. Добыта Сосниным (5) в окр. Мисханы (1980).
53. *Ворон*, *Corvus corax corax* L. Отмечен 21. V. 46 г. летящим над скалами у Занги выше Бжни (1550).
54. *Серая ворона*, *Corvus corone sharpii* Oates. Экземпляры серых ворон отмечены от низовьев Занги (865) до Улашиха (1940).
55. *Сорока*, *Pica pica* L. Сороки встречаются от низовьев Занги (965) до Улашиха (1940) и восточной оконечности Мисханского хребта (1950).
56. *Сойка*, *Garrulus glandarius krynickii* Kalen. В значительном количестве были встречены 17. V. 46 г. в кустарниках на восточной оконечности Мисханского хребта (1900—2000). В кустах по ущелью Занги эти птицы зарегистрированы 21. V. 46 г. выше Бжни (1550). В долине Мисханы сойки нами наблюдались в 1940 г. в истоках реки Кумурлу на высоте 2000 м. По Ляйстеру и Соснину (5), в небольшом количестве гнездятся в садах около Еревана (945).
57. *Клушица*, *Rhyticocorax pyrrhocorax docilis* Gm. Отмечены 21.

V. 46 г. над скалами у Занги, в окр. Бжни (1550). В 1940 г. мы этих птиц наблюдали в скалах Кер-оглы (2600) и зимой 1945 г. в этом же месте от 2510 до 2900 м н. у. м.

58. *Скворец*, *Sturnus vulgaris caucasicus* Lор. Отмечен от низовьев Занги (865) до Севана (1916).

59. *Розовый скворец*, *Pastor roseus* L. Большие стаи этих птиц отмечены у скал 24. V. 46 г. в ущелье Занги ниже Арзни (1240—1250).

60. *Иволга*, *Oriolus oriolus caucasicus* Zar. Много иволов было встречено 21. V. 46 г. в Уршанских садах (1495) и 24. V. 46 г. в садах около Канакера (1200—1210).

61. *Щегол*, *Carduelis carduelis brevirostris* Zar. Стайки поющих щеглов наблюдались 15. V. 46 г. на старых ивах по берегу Занги в окр. Агпари (1720). Много этих птиц отмечено 21. V. 46 г. по деревьям у Занги в окр. Бжни (1500—1550) и в Урушанских садах (1495). Сосниным (5) добыты в окр. Мисханы (1980).

62. *Коноплянка*, *Acanthis cannabina bella* Br. Зарегистрированы от 1725 до 2450 м (Кер-оглы).

63. *Горная чечетка*, *Acanthis flavirostris brevirostris* Moore. В небольшом количестве наблюдалась зимой 1945 г. в скалах Кер-оглы на высоте 2150 м.

64. *Королевский выорок*, *Serinus pusillus* Pall. Отмечен 21. V. 46 г. перелетающим по скалам в окр. сел. Бжни (1530). Летом 1940 г. мы этих птиц наблюдали в урочище Кер-оглы на высоте 2400 м.

65. *Чечевица*, *Erythrina erythrina* Pall. Добыта Сосниным (5) в окр. Мисханы (1980).

66. *Кавказский зяблик*, *Fringilla coelebs solomkoi* Menzb. et Susch. Нами зарегистрирован зимой 1945 г. в нижней кромке леса против Караван-Сарая (1740).

67. *Каменный воробей*, *Petronia petronia exigua* Hell. Гнездовые колонии зарегистрированы от окр. Арзни (1250) до Улашиха (1940).

68. *Домашний воробей*, *Passer domesticus caucasicus* Bogd. Повсеместен в населенных пунктах.

69. *Просянка*, *Emberiza calandra calandra* L. Встречена 22. V. 46 г. по кустарникам у заболоченной площади правобережья Занги ниже Арзакана (1460) и 23. V. 46 г. на луговине у этой речки на высоте 1120—1440 м н. у. м.

70. *Обыкновенная овсянка*, *Emberiza citrinella citrinella* L. Стая этих птиц нами наблюдалась 30. XI. 45 г. в долине Мисханы между Тайчарухом и Рандамалом (около 1750 м).

71. *Черноголовая овсянка*, *Emberiza melanocephala* Scop. Наиболее высоко эта птица отмечена 23. V. 46 г. в окр. Нуруса (1410), ниже—до 1200 м черноголовые овсянки обычны.

72. *Садовая овсянка*, *Emberiza hortulana* L. От 12 по 17. V. 46 г. садовых овсянок было много во всех местообитаниях около Н. Ахты (1780—1800), в окр. Агпари (1720) и у восточной оконечности Мисханского хребта (1850). В ущелье Занги эти птицы отмечены 22. V. 46 г. на уровне 1495 м и 23. V. 46 г. от 1440 м н. у. м.

73. Горная овсянка, *Emberiza sia prageri* Zaub. Отмечена 17. V. 46 г. по скалам с кустарниками у восточной оконечности Мисханского хребта (1900—1950). На южном склоне Кер-оглы стаи этих птиц зарегистрированы зимой 1945 г. от 2100 до 2430 м н. у. м.

74. Полевой жаворонок, *Alauda arvensis cantarella* Bon. Гнездится от окр. Агпары (1720) до горно-луговой зоны (2230).

75. Рогатый жаворонок, *Eremophila alpestris penicillata* Gueld. Отмечен 12. V. 46 г. на склоне бугра над селением Караван-Сарай (1730).

76. Белая трясогузка, *Motacilla alba* L. От 12. V. по 24. V. 46 г. отмечена как обычная птица по всей долине Занги от 1200 до 1725 м. В 1940 г. летом зарегистрированы между Тайчарухом (1770) и Улашихом (1940).

77. Горная трясогузка, *Motacilla cinerea cinerea* Tunst. Нами наблюдалась 12. V. 46 г. по левобережью Занги между Агпаратой и Караван-Сараем (1725). Зимой 1945 г. этот вид отмечен нами I. XII. на Занге около селения Солак (1650).

78. Черноголовая трясогузка, *Motacilla flava feldegg* Mich. Обычная птица в долине Занги. Отмечена нами за 12—23. V. 46 г. от 1425 до 1725 м н. у. м.

79. Полевой конек, *Anthus campestris campestris* L. В поле в окр. Агпарты (1720) полевой конек был зарегистрирован 18. V. 46 г., впрочем этот вид отмечен 23. V. 16 г. на поле в окр. Нуруса (1430).

80. Лесной конек, *Anthus trivialis trivialis* L. Добыт 17. V. 46 г. в кустарнике на восточной оконечности Мисханского хребта (1900).

81. Краснозобый конек, *Anthus cervinus* Pall. Добыт 14. V. 46 г. на поле в окр. Н. Ахты (1780).

82. Среднеазиатский горный конек, *Anthus spinolella blakistoni* Sw. Зарегистрирован 28. XI. 45 г. на поле в долине Мисханы в окр. сел. Бабакиши (1740).

83. Стенолаз, *Tichodroma muraria* L. Добыт 9. VIII. 40. в Кер-оглы на высоте 2440 м.

84. Малый скальный поползень, *Sitta neumayer rupicola* Blanf. От окр. Еревана (940) до южного склона Кемурлу (2068).

85. Большая синица, *Parus major major* L. Встречена как обычная птица 30. XI. и I. XII. 1945 г. в садах по берегам Занги около селений Кахсы (1750) и Бжни (1500).

86. Чернолобый сорокопут, *Lanius minor* L. Отмечен 14. V. 46 г. в поле около сел. Н. Ахты (1790).

87. Жулан, *Lanius cristatus cobylini* But. В небольшом количестве встречен 14 и 15. V. 46 г. по деревьям и кустарникам в поле около Н. Ахты (1780—1790) и у Агпарты (1720). Добыт 20. V. 46 г. в окр. садов Халандар (1630) и 22. V. 46 г. наблюдался около Арзакана (1480). Сосниным (5) добыт в окр. Мисханы (1980).

88. Серая мухоловка, *Muscicapa striata pietmanni* Poche. Добыта Сосниным (5) в окр. Мисханы (1980).

89. *Мухоловка-белоголовка*, *Muscicapa albicollis semitorquata* Hom. Добыта Сосниным (5) в окр. Мисханы (1980).
90. *Пеночка-кузнечик*, *Phylloscopus collybitus* Vieill. Добыта Сосниным (5) в окр. Мисханы (1980).
91. *Пеночка весничка*, *Phylloscopus trochilus* L. Была обычна в хаосах скал между Агпарой (1720) и Караван-Сараем (1725). Наблюдалась 17. V. 46 г. в кустарниках по скалам на восточной оконечности Мисханского хребта (1950). Отмечена в окр. садов Халандар (1639) и 21. V. 46 г. в Урушанских садах (1495). В 1930 г. добывалась Сосниным (5) в долине Мисханы (1980).
92. *Зеленая пеночка*, *Phylloscopus trochiloides nitidus* Blyth. Отмечена и добыта нами (2) в долине Мисханы от Тайчаруха (1770) до верховьев Улашиха (2190).
93. *Речной сверчок*, *Locustella fluviatilis* Wolf. Пролетные экз. добыты 11. V. 46 г. на скалах с кустами около Н. Ахты (1800) и 13. V. 46 г. в таком же местообитании на восточной оконечности Мисханского хребта (1800).
94. *Дроздовидная комышевка*, *Acrocephalus arundinaceus arundinaceus* L. Несколько пар этих комышевок наблюдались 14. V. 46 г. в кустах у речки около Агпary (1720).
95. *Тростниковая комышевка*, *Acrocephalus scirpaceus fuscus* Nempr. et Ehr. Добыта Сосниным (5) в окр. сел. Мисханы (1980).
96. *Болотная комышевка*, *Acrocephalus palustris* Bechst. Нами (2) наблюдалась в кустах уроцища Кер-оглы летом 1940 г. на высоте 2450 м. Соснин (5) этот вид добывал в окр. Мисханы (1980).
97. *Камышевка-барсучек*, *Acrocephalus schoenobaenus* L. Много птиц этого вида было нами встречено 22. V. 46 г. по кустам на заболоченной площади правобережья Занги ниже Арзакана (1460).
98. *Садовая славка*, *Sylvia borin* Bodd. В большом количестве зарегистрированы 13 и 19. V. 46 г. в скалах с кустами по правобережью Занги между Агпарой и Караван-Сараем (1725); 14. V. 46 г. много садовых славок было на полях в окр. Н. Ахты (1790–1800). В кустах около садов Халандар (1630) эти птицы были встречены 20. V. 46 г. Добыты Сосниным (5) в окр. сел. Мисханы (1980).
99. *Серая славка*, *Sylvia communis icterops* Men. Добыта Сосниным (5) в окр. Мисханы (1980).
100. *Славка-завишка*, *Sylvia curruca caucasica* Ogn. et Ban. Добыта Сосниным (5) в окр. Мисханы (1980).
101. *Певчий дрозд*, *Turdus ericetorum* Turt. Добыт Сосниным (5) в окр. Мисханы (1980).
102. *Белозобый дрозд*, *Turdus torquatus amicorum* Hart. В небольшом количестве наблюдался 21. V. 46 г. по кустам и скалам в окр. Бжни (1550). По Соснину (5), эти птицы встречаются в лесу около Мисханы (1980).
103. *Черный дрозд*, *Turdus merula aterrimus* Mad. В кустарниках

восточной оконечности Мисханского хребта (1800) 17. V. 46 г. наблюдалась 2 черных дрозда.

104. *Пестрый каменный дрозд*, *Monticola saxatilis saxatilis* L. Нами зарегистрирован от окр. Нурнуса (1350) до восточной оконечности Мисханского хребта (2000).

105. *Синий каменный дрозд*, *Monticola solitarius solitarius* L. От окр. Арзни (1120) до Кер-оглы (2400) и истоков Улашиха (2460).

106. *Каменка*, *Oenanthe oenanthe oenanthe* L. Обычная птица по полям и скалам в окр. Н. Ахты, у Агпары и на восточной оконечности Мисханского хребта. Наблюдались здесь эти каменки 12. 15, 16 и 17. V. 46 г. от 1720 до 1850 м н. у. м. В 1940 г. этот вид отмечен в долине Мисханы от Тайчаруха (1770) до Улашиха (1940).

107. *Чернопегая каменка*, *Oenanthe hispanica melanoleuca* Guld. Зарегистрирована 21 и 23. V. 36 г. у подножья скал в окр. Бжни (1510) и ниже от 1420 до 1440 м н. у. м.

108. *Черношейная каменка*, *Oenanthe finschii barnesi* Oates. Наблюдалась 23. V. 46 г. в скалах под Нурнусом (1400—1410) и 24. V. 46 г. между Арзни и Джаткраном (около 1300).

109. *Луговой чеккан*, *Saxicola rubetra* L. В небольшом количестве наблюдался 12. V. 46 г. по кустам и сухой траве на полях около Н. Ахты (1780—1800) и 16. V. 46 г. на полях у подножья восточной оконечности Мисханского хребта (1750). В долине Мисханы нами (2) отмечен на высоте 2230 м н. у. м.

110. *Горихвостка*, *Phoenicurus phoenicurus phoenicurus* L. Зарегистрирована 15. V. 46 г. в каменистых россыпях у Занги ниже Агпары (1715). Сосниным (5) отмечена для окр. Мисханы (1980).

111. *Горихвостка-чернушка*, *Phoenicurus ochruros ochruros* Gm. Весной 1946 г. отмечены поющие птицы от Арзни (1300) до окр. Агпары (1715).

112. *Краснобрюхая горихвостка*, *Phoenicurus erythrogaster erythrogaster* Guld. Наблюдалась 3. VIII. 40 г. в скалах и осыпях верховьев р. Улаших (2460).

113. *Восточный соловей*, *Luscinia luscinia* L. Отмечен Сосниным (5) для окр. Мисханы (1980).

114. *Варакушка*, *Luscinia svecica* L. Наблюдалась 12. V. 46 г. в хаосе скал у Занги между Агпой (1720) и Караван-Сараем (1725). В 1940 г. отмечена нами для истоков Улашиха (2460).

115. *Кавказский крапивник*, *Troglodytes troglodytes hyrcanus* Zar. et Loud. Зимой 1945 г. между 30 ноября и 1 декабря наблюдался в значительном количестве в пойме р. Занги между сел. Бжни (1500) и Караван-Сарай (1725).

116. *Оляпка*, *Cinclus cinclus caucasicus* Mad. На Занге наблюдалась от 1420 м. По Мисхане до 1980 м н. у. м.

117. *Деревенская ласточка*, *Hirundo rustica rustica* L. В большом количестве наблюдалась 12 и 14. V. 46 г. в сел. Н. Ахта (1780) и Агпара (1720).

118. *Городская ласточка*, *Delichon urbica meridionalis* Hart. В очень большом количестве встречены 21. V. 46 г. около скал выше Бжни (1550) и у развалин крепости (1530). Массовые гнездования городских ласточек отмечены 23. V. 46 г. в скалах над Зангой от 1420 до 1440 м н. у. м. В 1940 г. этот вид отмечен в скалах Кер-оглы 8 и 9. VII на высоте 2500—2600 м н. у. м.

119. *Горная ласточка*, *Riparia rupestris rupestris* L. На гнездовиях от окр. Арзни (1250) до скал у садов Халандар (1630).

Млекопитающие

1. *Крот*, *Talpa europaea transcaucasica* Dahl. Норы кротов в значительном количестве нами обнаружены 20. V. 46 г. на песчаных и глинистых берегах Занги в окр. садов Халандар (1630). Ниже по левому берегу Занги эти животные найдены 21. V. 46 г. в окр. Бжни (1496—1500), 22. V. 46 г. в Урушанских садах (1492—1495), на луговинах и под скалами между Арзаканом и Караджераном (1460) и в окр. Караджерана (1450). В последнем местообитании норы кротов располагаются исключительно по канаве и у скал правобережья Занги. Ниже реки Караджеранки кроты не распространяются. (Добытые здесь экземпляры ничем не отличаются от имеющихся из Кироваканского района). В 1940 г. кроты нами отмечены (2) в скалах уроцища Кер-оглы (2300) и в истоках р. Улаших (2460). Обычны в долине р. Мисханы и по Мисханскому хребту почти всюду, где есть древесно-кустарниковая растительность.

2. *Кавказская бурозубка Сатунина*; *Sorex araneus satunini* Ogn. Найдена нами зимой 1945 г. в окр. селения Тайчарух (1770).

3. *Персидская белозубка*, *Crocidura leucodon persica* Thom. Найдена нами 29. XI. 45 г. в деревне Улаших (1940).

4. *Малая белозубка*, *Crocidura suaveolens* Pall. Добыто 2 экз. 15. V. 46 г. среди кустов шиповника на поле около сел. Н. Ахта (1800).

5. *Ночница серая*, *Myotis myotis myotis* Borkh. Известна из Тайчаруха (1770).

6. *Ушан*, *Plecotus auritus auritus* L. Добыт в Тайчарухе (1770).

7. *Кавказская каменная куница*, *Martes foina lehriingi* Sat. Зарегистрирована от окр. Еревана (940) до окр. Такялу (2580).

8. *Большая кавказская ласка*, *Mustela nivalis dininniki* Sat. Отмечена от окр. Еревана (940) до окр. Такялу (2580).

9. *Иранский барсук*, *Meles meles canescens* Blanf. Одиночные норы наблюдались от окр. Еревана (940) до окр. Тайчаруха (1750).

10. *Выдра*, *Lutra lutra* L. По собранным сведениям (2), выдра добыта в р. Улаших, примерно на уровне 2100 м н. у. м.

11. *Бурый медведь*, *Ursus arctos* L. Зимой 1945 г. зарегистрирован местными жителями в окр. селения Такялу и Улаших (около 2000).

12. Волк, *Canis lupus* L. В 1940 г. (2) нора волка зарегистрирована в урочище Кер-оглы (2700). В 1945 г. следы волков на свегу в этом же районе отмечены на уровне 2580 м. Зимой обычны около Еревана и реже—около Улуханлу.

13. Закавказская горная лисица, *Vulpes vulpes alticola* Ogn. Наблюдалась 28 и 30. XI. 45 г. в окр. Тайчаруха (1770). Следы лисиц в урочище Кер-оглы отмечены от 1900 до 2580 м н. у. м.

14. Рысь, *Lynx lynx orientalis* Sat. В коллекциях Зоол. инст. АН Арм. ССР имеются экземпляры из окр. Цахкадзора (1880).

15. Соня, *Dymomys nitidula* Pall. На Памбакском хребте нами добыта в окр. Воскресеновки (1810). По имеющимся наблюдениям, сони водятся в садах окр. Еревана (Норк, 1160).

16. Мышевка кавказская, *Sicista caucasica* Vin. Добыта в окр. Тайчаруха (2) примерно, на уровне 1780 м.

17. Мыши лесные, *Silvimus silvaticus* L. Несколько штук добыты 12. 18. V. 46 г. в окр. Н. Ахта (1780—1820), обычны в садах окр. Еревана (1000).

18. Серый хомячек, *Cricetus migratorius* Pall. С Памбакского хребта известен (2) из погадок филина, собранных в Кер-оглы (2700). Добыты Сосниным в окр. сел. Мисхана (1980). Обычен в Н. Ахте (1780) и Ереване. Зимой 1946 г. (в январе) нами отмечен по каменистым, полупустынным местам в окр. Еревана (ок. 1000 м).

19. Переднеазиатский хомяк, *Mesocricetus auratus* Wat. Из долины р. Мисханы известен (2) из погадок филина, собранных в Кер-оглы (2700). Зимой 1945 г. большое количество нор этих животных нами отмечено по полям между Бжни и Фонтаном (1560—1800). В 1946 г. были добыты и неоднократно регистрировались от 12 по 18. V. в окр. Н. Ахты (1780—1810). Нора хомяка отмечена 23. V. 46 г. на глинистом склоне берега Занги ниже Нуриуса (1350).

20. Афганская слепушонка, *Ellobius fuscocapillus lutescens* Thom. Норы слепушат в большом количестве найдены 1. XII. 45 г. на гумнах в окр. Бжни (1550) и в меньшем количестве между Бжни и Фонтаном (1650—1800). В 1946 г. норы этих животных нами отмечены 22. V. по краям широкой поймы Занги ниже Арзакана (1465) и 24. V. на склонах бугров у Занги на высоте 1200 м н. у. м.

21. Водяная крыса, *Arvicola amphibius persicus* De-Fil. В 1940 г. водяные крысы нами отмечены (3) в долине р. Мисханы от Тайчаруха до Улашиха (1770—1940), встречаются они и вверх по последней речке. Зимой 1945 г. по долине Мисханы эти животные отмечены от 1715 до 1880 м. В 1945 г. добыты 20. V. в окр. садов Халандар (1630) и 21. V. в окр. Бжни (1495—1500).

22. Полевка обыкновенная, *Microtus arvalis* Pall. Зимой 1945 г. норы обыкновенных полевок в огромном количестве нами наблюдались в долине р. Мисханы от 1725 до 1940 м н. у. м. В значительном количестве встречена от 12 по 18. V. 46. г. в окр. Н. Ахты

(1720—1850), 24. V. 46 г. норы этих животных найдены на луговине около Занги на уровне 1200 м н. у. м.

23. *Песчанка персидская, Meriones persicus Blanf.* Зарегистрирована нора 24. V. 46 г. на намывном, галечно-глинистом берегу Занги на уровне 1230 м.

24. *Заяц-русак, Lepus europaeus cyrensis Sat.* Отмечены от по-лой в низовьях Занги (ок. 830) до Кер-оглы (2580).

Выводы

1. В долинах рек Занги и Мисханы от 865 до 3000 метров над уровнем моря зарегистрировано:

пресмыкающихся 30 видов,
птиц 119 видов (и подвидов),
млекопитающих 24 вида.

2. В распространении пресмыкающихся по долине р. Занги обращает на себя внимание далекое проникновение к югу прыткой, средней и полосатой ящериц, последняя встречается в долине р. Занги и в зоне полупустыни. Из пресмыкающихся, типичных для полупустынной зоны юга Армянской ССР, наибольшей vagильностью отличается разноцветный полоз, проникший до бассейна Севана.




Диаграмма 1. Вертикальное распространение комплексов пресмыкающихся в долинах рек Занги и Мисханы.

3. Вероятно, как следствие сезонных миграций в долине Занги, некоторые виды птиц, спустившись в холодное время года вниз, здесь задерживаются в отвечающей их потребностям обстановке. Из наиболее приспособившихся вне леса лесных птиц отметим сойку, гнедящуюся в садах долины Занги вплоть до полупустыни.

Из птиц, типичных для наших полупустынь, выше всего по долине Занги поднимаются сизоворонки и золотистые щурки, поселяясь в подходящих местообитаниях до горно-луговой зоны включительно.




Диаграмма 2. Вертикальное распространение комплексов птиц в долинах рек Занги и Мисханы

4. Распространение крота у нас тесно связано с северными лесными районами Армянской ССР. В долине р. Занги этот вид очагами занимает влажные площади только в непосредственной близости от реки. Повидимому, эти очаги являются небольшими островками когда-то более широкого распространения кротов в условиях юга Армянской ССР.

Наиболее далеко от зоны леса встречаются лесные мыши и сочи. Здесь точно также, как и в случае с сойкой, эти животные за-

селяют, главным образом, сады, а лесная мышь, кроме этого, приспособилась к существованию в скалах, а также среди островков кустарников и на полях.

5. В долине р. Занги на уровне около 1450 м н. у. м. для расселения некоторых наземных позвоночных, помимо биологической преграды, имеется существенная преграда физическая. Это — впадающие в Зангу реки Караджерак и Озанлар (по именам селений). В прошлом, повидимому, эта преграда ограничила продвижение на юг крота.




Диаграмма 8. Вертикальное распространение комплексов млекопитающих в долинах рек Занги и Мисхана.

6. При рассматривании всех трех диаграмм вертикального распространения пресмыкающихся, птиц и млекопитающих в долине р. Занги, обращает на себя внимание далекое захождение некоторых видов, свойственных северным лесным и горно-луговым зонам Армянской ССР, на юг, в зону полупустыни. Несомненно, что для лесных видов здесь основную роль играет наличие садов, находящихся в долине р. Занги. Наличие вне типичных зон прочих видов — неясно. С одной стороны, здесь может иметь место расширение ареалов, с другой — констатирование этих захождений может объясняться и как явление реликтового порядка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бутурлин С. А. и Дементьев Г. П. 1934—1941. Полный определитель птиц СССР, I—V.
2. Даль С. К. 1919. Позвоночные животные Памбакского хребта. Зоолог. сборник, V.
3. Даль С. К. 1944. Мелкие пушные звери Памбакского хребта. Зоолог. сборник, III.
4. Даль С. К. 1940—Насекомоядные и рукокрылые Арм. ССР и Нах. АССР. Зоолог. сборник, II.
5. Лайстер А. Ф. и Соснин Г. В. 1942. Материалы по орнитофауне Арм. ССР.
6. Магакян А. К. 1941. Растительность Армянской ССР.
7. Чернов С. А. 1939. Герпетологическая фауна Арм. ССР и Нах. АССР. Зоолог. сборник, I.
8. Чернов С. А. 1937. Определитель змей, ящериц и черепах Армении.

Ա. Կ. Դալ

ՆՅՈՒԹԵՐ ՁԱՆԴՈՒ ԵՎ ՄԻՍԽԱՆԱ ԳԵՑՑԵՐԻ ՀՈՎՔԵՑՆԵՐՈՒՄ ՍՈՂՈՒՆՆԵՐԻ,
ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱՋԻԿ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա Մ Փ Ո Փ Ե Լ Մ

Զանգու և Միսխանա գետերի հովիտները մի շարք կենդանիների համար սիգրացիան ճանապարհ են: Այս աշխատանքի նպատակն է արձանագրել ողնաշարագոր կենդանիների ներկայիս տարածվածությունը այդ հովիտներում, որը հնարավորություն կտա հետագայում լուծելու նրանց արեաների փոփոխությունների հարցը:

Միսխանա և Զանգու գետերի հովիտներում ծովի մակերեռույթից 865. ից մինչև 3000 մետր բարձրության վրա արձանագրված են՝

1. 30 տեսակ սոլուններ

2. 110 տեսակ թռչուններ

3. 24 տեսակ կաթնասուններ

Զանգու գետի հովտում նկատված են ողնաշարագոր կենդանիների մի շարք տեսակներ, որոնք հատուկ են Հայկական ՍՍՌ-ի հյուսիսային բիոկոմպլեքսներին: Նրանք շարժվել են շատ հեռու՝ զեղի հարավ, Դրանց թվին են պատկանում՝ Lacerta agilis, L. media, L. strigata, Garrulus glandarius, Talpa europea, Silvimus silvaticus, Dyromys nitedula և այլն:

Հայկական ՍՍՌ հարավի կիսանապատային գոնային հատուկ ողնաշարագոր կենդանիները այլ տիպի վայրերից շատ ավելի վեր են բարձրանում՝ Coluber taurergieri, Coracias garrulus և Merops apiaster:

Զանգու գետի հովտում ծովի մակերեռույթից մասավորագես 1450 մ բարձրության վրա, կենդանիների տարածմանն արգելակում են ոչ միայն բիոլոգիական, այլ և ֆիզիկական գործուները, հանձինս Զանգովի մեջ թափվող վտակների: Զանգովի հովտում անտառային տեսակների զեղի հարավ կատարվող շարժման մեջ հիմնական նշանակություն ունեն այդտեղ անող այլիները: