

С. М. Яблоков-Хнзорян

**EULAGIUS ACERNUS MOTSCHULSKY — НЕРАЗГАДАННЫЙ ВИД
(COLEOPTERA, MYCETOPHAGIDAE)**

В 1845 г. Мочульским с Кавказа описан новый род *Eulagius*, с единственным видом — *acernus*, являющимся его типом. Этот род и вид в дальнейшем приводился во всех соответствующих каталогах, но никем не был просмотрен и отнесен произвольно к трибе *Esarcini* (или подсемейству *Esarcinae*). Благодаря любезности А. Н. Желокhovцева я имел возможность неоднократно просматривать коллекцию Мочульского в музее МГУ и, наконец, обнаружить, совсем не на месте, две особи, наклеенные на одну и ту же этикетку с надписью, рукой Мочульского: *Eulagius acernus Motsch Caucas.*; *Cauc.*, являющиеся типами этого вида (наш голотип и паратип). Хотя сохранность этих типов довольно посредственная (усики и часть ног обломаны), они явно тождественны виду, описанному в дальнейшем Рейттером как *Tritoma univestis*, а затем выделенному им же в новый род *Atritomus*, который, как и вид Рейттера, впадает в синонимы. Соответственно существующая классификация должна быть изменена следующим образом:

Род *Eulagius Motschulsky*, 1845. Бюлл. Моск. И. об-ва испытателей природы, XVIII, 1: 92. — *Atritomus Reitter*, 1879. *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, XXIX: 88; — *Parabaptistes Ganglbauer*, 1899. *Käfer Mitteleur.*, III, 2: 838. тип рода *E. acernus Motsch.*, 1845. *L. c.*: 92 — *Atritomus univestis Reitt.* 1878, *Verh. Naturf. Ver. Brünn*, XVI: 166 (*Tritoma*).

Род принадлежит к подсемейству *Mycetophaginae* и насчитывает 5 описанных видов из Средиземноморья, Закавказья и Японии. *E. acernus* (под наименованием *univestis*) указан для Черноморского побережья Кавказа, центральной Грузии и Талыша, нами найден в северной Армении (Шагали, Киранц) и в Талыше (Алексеевка) в густом лесу, на мертвых или отмирающих стволах лиственных пород. В плодовых телах грибов или трутовиков нами не обнаружен.

Ա.Ա.Յաբլոկով-Խնզորյան
EULAGIUS ACERNUS MOTSCHULSKY (COLEOPTERA, MYCETOPHAGIDAE)

Հիսկնաբանական տեսակ

Ա Մ ֆ ո ֆ ո լ Մ

Չնայած այս տեսակը նշված է բոլոր համապատասխան ցուցակներում, նրա իսկական պատկանելիությունը մինչև այժմ մնում էր անհայտ: Այս տեսակի 2 տիպային անհատների հայտնաբերումը Մոսկվայում մեզ թույլ տվեց սահմանել հետևյալ համանունությունը:

Առն Eulagius Motschulsky, 1845. Бюлл. Моск. И. об-ва испытателей природы, XVIII, I : 92 - Atritonus Reitter, 1879. Verh. zool. bot. Ges. Wien, XXIX:88 - Parabaptistes Ganglbauer, 1899. Käfer Mitteleur., III, 2:838.

Առնի տիպը՝ E. acernus Motsch., 1845. L.c.:92 - Atritonus univestis Reitt., 1878, Verh. Naturf. Ver. Brünn, XVI:166 (Tritoma).

S.M.Iablokoff-Khnzorian
EULAGIUS ACERNUS MOTSCHULSKY-A MISUNDERSTOOD SPECIES
(COLEOPTERA, MYCETOPHAGIDAE)

S u m m a r y

Although this species is mentioned in all the corresponding catalogues, it was misunderstood. The study of its types in Moscou permitted us to establish its synonymy, which is:

Genus Eulagius Motschulsky, 1845. Bull. Soc. I. Natur. Moscou, 18, I:92- Atritonus Reitter, 1879. Verh. zool. bot. Ges. Wien, 29:88 - Parabaptistes Ganglbauer, 1899. Käfer Mitteleur., 3, 2:838. Type of the genus: E. acernus Motsch., 1845. L.c.:92 - Atritonus univestis Reitter, 1878. Verh. Naturf. Ver. Brünn, 16:166 (Tritoma).

As this genus and species are mentioned only in few papers the correct synonymy must be reestablished.