

Академия наук Армянской ССР
Институт зоологии
Зоологический сборник, ХУШ,
1982

Academy of Sciences of Armenian
SSR
Institute of zoology
Zoological Papers, XVIII, 1982

Л.В.Пхрикян

К ИЗУЧЕНИЮ ПЛОДОВИТОСТИ ASCARIDIA GALLI (SCHRANK, 1781)

Сведения о количестве яиц в гонадах у различных видов гельминтов немногочисленны (Мирецкий О.Н., 1937, Феоктистов П.И., 1940, цитировано из /1/). В этих работах приводятся данные по *Ascaris lumbricoides* и *Heterakis gallinarum*.

Материалом для настоящей работы служили самки аскаридий, добытые из кишечника кур Гетамечского племенного завода с сентября 1976 г. по октябрь 1977 г.

Завод расположен в 30 километрах от северо-западной окраины города Еревана на высоте 1200 м над ур.м.

С целью установления плодовитости паразитов нами производился подсчет яиц в гонадах 207 особей *A. galli*.

Длина вскрытых аскаридий колебалась в пределах от 50 до 90 мм

Четко разработанной единой методики по подсчету яиц в гонадах гельминтов в литературе не имеется. Суть методики, применяемой нами во время подсчета яиц аскаридий, заключалась в следующем: в чашке Петри, наполненной 10-15 мл обыкновенной воды, помещались аскаридии. Для облегчения полного удаления гонад из брюшной полости паразита делается разрез на его хвостовой части, отступя от кончика хвоста на 0,5-0,7 мм. Проводя гельминт между пальцами пинцета, удаляют гонады с яйцами. Затем при помощи кисточки гонады ополаскивают в воде до полного освобождения яиц и образования водяной взвеси. Подсчет яиц аскаридий производился под бинокулярным увеличением в 0,1 мл воды, помещенной в лунку предметного стекла. После десятикратного повторения подсчета полученные данные были экстраполированы на весь объем водяной взвеси яиц.

При подсчете яиц была учтена также величина аскаридий. С этой целью паразиты были измерены и условно сгруппированы по размерам (таблица):

Как видно из таблицы, количество яиц в гонадах аскаридий возрастает в зависимости от длины паразита.

Среднее количество яиц на каждую особь без учета величины паразита составляет 33 690 яиц.

Наибольшее число яиц содержится в гонадах аскаридий длиной

Таблица

Число яиц аскаридий в зависимости от
длины тела паразита

Длина тела гельминтов, мм	Число ис- следован- ных самок	Пределы ко- лебаний чис- ла яиц у от- дельных осо- бей, тыс.	Среднее количество яиц на особь	Общее число яиц во вскры- тых парази- тах
60-70	44	10-15	12 560	446 720
71-80	108	16-40	28 620	2 960 490
81-90	55	49-90	53 100	2 875 800

1.4. Փորհեստ

ՌԻՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ASCARIDIA GALLI (SCHRANK, 1788)
ՊԱՐԱԶԻՏԻ ՊՏՂԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՑԱՆ

Ա մ փ ո փ ու մ

Հողածուր բերված են *Ascaridia galli* պարազիտի պտղատվությանը
և քանակությանը ուսումնասիրության արդյունքները: Ասկարիդիաների պտղատվու-
թյունը հետազոտվել է նրանց սեռական օրգաններում ձվերի հաշվման եղանա-
ով:

Պարզված է, որ ասկարիդիաների ձվերի քանակը նրանց սեռական օրգաննե-
րում աճում է կախված պարազիտի երկարությունից:

Առավելագույն քանակությամբ ձվեր են հայտնաբերվել 71-90 մմ երկա-
րությամբ ունեցող ասկարիդիաների սեռական օրգաններում:

Ըստ մեր տվյալների ասկարիդիաների ձվերի միջին քանակությամբ,
նրանց սեռական օրգաններում, կազմում են 33,690 ձու:

L.V. PIKRIKIAN

STUDIES ON THE FERTILITY OF ASCARIDIA GALLI (SCHRANK, 1788)

S u m m a r y

The ascarid fertility by counting the eggs in the parasite go-
nads was studied.

It was established that the number of the eggs in the ascarid
gonads increases with the length of the parasite. The greatest egg
number was found in the gonads of ascarids with a length of 71-90mm.

The mean egg content in each parasite was 33690.

Л и т е р а т у р а

І. Б у р з я н ц е в А.В. 1975. Подсчет количества яиц в гона-
дах самок *Heterakis gallinarum* (Schränk, 1788).