ПЕТРОГРАФИЯ

Т. Ш. ТАТЕВОСЯН

К ПЕТРОГРАФИИ ОСНОВНЫХ И УЛЬТРАОСНОВНЫХ
ПОРОД г. АРАМАЗД

Основные и ультраосновные породы в Армении имеют значительное распространение. Они обнажаются по северо-восточному побережью оз. Севан, а также в Амасийском, Вединском, Красносельском районах.

Все эти выходы представлены небольшими телами габбро-перидотитов и дунитов и входят в состав офиолитового пояса Малого Кавказа. Геология и петрография этих интрузивов в пределах Армении освещены в ряде работ [13, 12, 3, 2, 4, 13, 14, 15, 8, 9].

Во всех вышеуказанных районах основные и ультраосновные породы рассматриваются как результат внедрения габбро-перидотитовой магмы по глубинному разлому в складчатые структуры, сложенные образованиями мела и эоцена. В этих ультраосновных породах наблюдается оруденение, представленное хромистым железняком.

В последние годы геологами Армянского геологического управления П. Л. Епремяном и О. Г. Оганесяном в Горисском районе, у г. Арамазд, на высоте 2200 м было обнаружено Сваранцское месторождение железа, связанное с основными и ультраосновными породами. Автором при изучении петрографии Баргушатского хребта были описаны оливинсодержащие основные породы г. Арамазд [14].

После обнаружения месторождения, массив г. Арамазд нами был осмолрен и картирован дополнительно. Настоящая статья написана на основании материала, собранного в 1959 г.

В геологическом строении Баргушата (юго-восточный отрог Сюникского (Зангезурского) хребта) принимают участие мощные образования палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Преобладающими являются вулканогенно-осадочные образования верхнего девона и нижнего эоцена. В окрестностях Сваранцского месторождения железа развиты меловые образования, представленные песчаниками и порфиритами.

Все вышеуказанные образования прорваны отдельными интрузивными телами общей площадью до 360 км².

Эти многофазные интрузивные тела являются северными сателлитами крупного Мегринского плутона, обнажающегося в южной части Армянской ССР.

Во время первой (преобладающей) фазы интрузивного процесса образовались основные и ультраосновные породы, а также габбро-диориты, гранодиориты, кварцевые монцониты, граниты и небольшие массивы щелочных сиенитов. Во время второй фазы внедрения образовались главным образом граносиениты и в третьей фазе — порфировидные граниты и гранодиориты. Большое развитие имеют также многочисленные жильные образования, представленные гранодиорит-порфирами, диабазами, кварцевыми порфирами, гиалоандезитами и другими породами.

В районе Баргушатских интрузивов развиты также молодые эффузивные образования, представленные андезитами, андезиодацитами и липаритами плиоценового возраста.

Возраст интрузивных тел в настоящее время многими исследователями считается верхнеэоценовым. Ввиду того, что аналогичные интрузивные образования в Сюнике прорывают верхний эоцен и в верховьях р. Мегри перекрываются образованиями плиоцена, как это установлено А. А. Габриеляном и Л. А. Тахтаджяном [5], то верхний возрастной предел этих интрузивов находится в широком интервале от верхнего эоцена до плиоцена.

Основные и ультраосновные породы г. Арамазд генетически связаны с Лернашенским интрузивным телом гранодиоритового состава, обнажающегося в районе *сс.* Лернашен, Лор и Дарабас. Этот массив является наиболее крупным из интрузивных тел Баргушатского хребта и наиболее разнообразным по петрографическому составу.

Лернашенский массив имеет сложное очертание и площадь современного среза составляет до 150 км². Северные периферические участки интрузивного тела в районе *сс.* Дарабас и Лор, на высоте 1500—1800 м сложены габбровыми породами, в которых пироксен в большинстве случаев замещен роговой обманкой.

Фиг. 1. Штуф розового сиенита со шлирами диорита. Вершина г. Арамазд.

В этих сиенитах много шлиров диоритового состава (фиг. 1).

К северу от этого участка в сторону водораздела Баргушатского хребта, т. е. в более верхних срезах интрузивного тела, состав пород интрузива постепенно меняется: габбровые породы через габбро-диориты постепенно переходят в гранодиориты и кварцевые монцониты, а на высоте 3400 м, т. е. в апикальной части интрузивного тела, кварцевые монцониты постепенно переходят в розоватые пегматоидные щелочные сиениты, которые слагают вершину г. Арамазд.

На юго-восточном склоне г. Арамазд, на высоте 2200 м картина переходов интрузивных пород сильно осложняется с появлением дунитов, троктолитов и других разновидностей оливинсодержащих основных и ультраосновных пород.

Здесь на площади 10—12 км² преобладающими породами являются кварцевые монцониты и гранодиориты, которые постепенно переходят в оливин-биотитовые и оливин-биотит-ортоклазовые габбровые породы. Последние в свою очередь переходят в перидотиты, пироксениты и магнетитовые дуниты. В средней части ЮВ склона г. Арамазд в виде 2—3 километровой зоны преобладают оливин-биотитовые габбровые породы. В зоне габбровых пород шириной до одного километра имеются разобщенные выходы ультраосновных пород, представленные магнетитовыми дунитами, перидотитами и оливиновыми пироксенитами.

Габбровые породы здесь отличаются очень изменчивым и пестрым минералогическим составом и непостоянством структурно-текстурных особенностей. Здесь встречаются как крупнозернистые, так и среднезернистые и мелкозернистые разновидности троктолита, анортозита, оливин-биотитового габбро, оливинового пироксенита и дунита. Хотя все вышперечисленные породы связаны между собой постепенными переходами, однако в редких случаях на отдельных штуфах наблюдаются факты прорыва ультраосновных пород габбровыми прожилками (фиг. 2). Реже наблюдается и обратное явление. Генетические взаимоотношения этих пород отмечаются во многих местах центрального участка Сваранцкого железорудного месторождения.

Фиг. 2. Штуф магнетитового оливинита инъецированного шлирами и прожилками габбро.

Вышеуказанные противоречивые возрастные взаимоотношения между основными и ультраосновными породами являются редкими отклонениями. В большинстве случаев совершенно наглядны постепенные переходы. Вышеуказанные отклонения от общего правила, по-видимому объясняются неравномерным ходом кристаллизации отдельных участков интрузии и продолжительностью тектонических процессов в результате чего из более глубоких частей интрузии в уже остывшую кору интрузии поступали порции магмы то основного, то ультраосновного состава.

В многочисленных канавах, горных выработках и естественных обнажениях местности Кечал-кар на обнаженном склоне выступают среднезернистые свежие троктолиты, среди которых

разбросаны многочисленные шлировые тела магнетитового дунита (фиг. 3). Размер этих шлиров колеблется от одного до десятка метров в поперечнике.

Фиг. 3. Постепенный переход перидотита в габбро.

выраженное полосчатое строение основных пород (фиг. 5). Полосы эти прослеживаются в северо-западном направлении. Мощность отдельных полос колеблется в широких пределах, от нескольких мил-

Сравнительно крупные тела дунитов, с которыми связано непостоянное магнетитовое оруденение, весьма редки. Вся эта серия основных и ультраосновных пород сечется жильными образованиями розоватого гранит-аплита. Сравнительно мощные жилы последних заполнены не переработанными ксенолитами и габбровыми породами (фиг. 4).

В центральном участке месторождения наблюдается хорошо вы-

Фиг. 4. Ксенолиты мелкозернистых основных пород в гранит-аплите.

Фиг. 5. Штуф полосчатого габбро-перидотита.

лиметров до нескольких десятков см и больше. Плоскости раздела разноцветных полос четкие с падением, близким к вертикальному.

Лейкократовые полосы сложены из преобладающего основного плагиоклаза с небольшим участием темноцветных минералов. Темные полосы сложены из оливина и магнетита с небольшим участием основного плагиоклаза (фиг. 6).

Приведенное выше описание взаимоотношений основных и ультраосновных пород приводит к выводу о том, что все эти породы являются одновременными образованиями и являются результатом дифференциации единой гранодиоритовой магмы.

Аналогичные генетические взаимоотношения магматических по-

род наблюдаются и в других телах Баргушата (около с. Софулу), хотя в меньшем масштабе.

Аналогичную картину взаимоотношений основных и ультраосновных пород Ю. А. Арапов [1] описал на г. Калакар в восточной части Мегринского плутона.

По данным С. С. Мкртчяна [11] оливин-ортоклазовое габбро имеется также у с. Нор-Аргадзор, по-видимому в таких же взаимоотношениях.

Оливин-биотитово-ортоклазовое габбро нами еще в 1948 году описано в коллекции А. Г. Ктикяна из Айоцдзора. Эти породы в дальнейшем подробно изучены Э. Г. Малхасяном [10].

У С. Дж. Шенда [17] приводятся описания классических примеров генетических взаимоотношений основных и ультраосновных пород в интрузивах гранитоидного и кварцево-мондонитового состава, как например в Дюлютском лополите в Миннесоте, у г. Табанкулу в Пондоленде (Южная Африка), в Сусимяке (Финляндия) и в других местах.

Фиг. 6. Штуф породы с полосами габбрового и перидотитового состава.

Петрографическое описание главных разновидностей пород

Кварцевые мондониты. Темно- и светлосерые среднезернистые породы с едва заметным розоватым оттенком слагают главное тело массива г. Арамазд.

Под микроскопом они часто обнаруживают мондонитовую и редко гипидноморфнозернистую структуру. Еще реже встречаются порфиридные структуры с гранофировой основной массой в виде прорастания мелких зерен калиевого полевого шпата, с размерами зерен в пределах десятых долей миллиметра.

В минералогическом составе кварцевых мондонитов принимают участие основной андезин, диопсид и энстатит, роговая обманка и биотит вторичного происхождения (за счет пироксена), ортоклаз и кварц. Из акцессорных минералов встречаются апатит и магнетит. Последний часто окружен вторичным биотитом.

В кварцевых мондонитах, на отдельных участках кварц постепенно исчезает и породы переходят в типичные мондониты.

Биотитовое габбро. После кварцевых мондонитов значительное место занимает названная порода. Это довольно свежая светлосерая, среднезернистая порода. На общем светлом фоне заметны темные

блестящие пачки биотита. В минералогическом составе биотитового габбро принимают участие лабрадор (N 65), диопсид, биотит, немного ортоклаз и из акцессорных минералов в заметном количестве магнетит.

Оливиновое габбро, оливин-биотитовое габбро, оливин-биотитово-ортоклазовое габбро, троктолиты и анортозиты

Вся эта серия пород связана с появлением оливина в вышеописанных габбровых породах. Все они являются промежуточными переходами между оливинитами с одной стороны и биотитовыми габбро и монцонитами—с другой.

В минералогическом составе этих пород принимают участие свежий, почти микротиновый основной плагиоклаз выше семидесятого номера, моноклинный пироксен из ряда диопсид-геденбергит, оливин, биотит и калиевый полевой шпат в весьма различных количественных взаимоотношениях, приведенных в табл. 1.

Таблица 1

Количественно-минералогический состав основных и ультраосновных пород Сваранцкого месторождения железа. (Объемные проценты подсчитаны на интеграционном столике)

Минералы	1	2	3	4	5	6	7
1. Оливин	86	39,5	15	—	30	11	—
2. Плагиоклаз	—	47	60	59,3	5	52	47,5
3. Пироксен	—	—	10	21,3	58	—	17,0
4. Роговая обманка	—	—	—	—	—	21	—
5. Биотит	—	—	9	11,0	—	—	4,8
6. Ортоклаз	—	—	1	—	—	12	27,2
7. Кварц	—	—	2	—	—	—	—
8. Магнетит	12	12,5	2	8,0	4	3	3,5
9. Прочие	2	—	1	0,4	2	1	—

1. Оливинит; среднее из двух образцов.	5. Пироксенит; среднее из 4 образцов.
2. Троктолит; среднее из 4 образцов.	6. Оливин ортоклазовое габбро; среднее из 4 образцов.
3. Оливин-биотитовое габбро; среднее из 5 образцов.	7. Монцонит; среднее из 4 образцов.
4. Биотитовое габбро; среднее из 3 образцов.	

Из акцессорных минералов значительное место, особенно в дунитах, занимает магнетит. Второе место занимает апатит, количество которого увеличивается с возрастанием количества магнетита.

Почти все главные минералы в этих породах имеют гипидиоморфную форму. После формирования слегка округленных зерен оливина образовались плагиоклаз и пироксен.

Ортоклаз ксеноморфно заполняет промежутки среди идиоморфных плагиоклазовых зерен, а биотит вторичного происхождения образуется за счет пироксена, и его метасоматические образования окружают изометрические зерна магнетита.

Перидотиты, оливиновые пироксениты и дуниты

Среди этих трех разновидностей ультраосновных пород Сваранцского месторождения железа, первые два по количеству занимают небольшое место. Большинство ультраосновных пород представлено мелкозернистыми и реже среднезернистыми дунитами, которые местами довольно сильно серпентинизированы, местами почти совершенно свежие. В минералогическом составе дунитов кроме оливина важную роль играет магнетит. Количество последнего колеблется в значительных пределах—от 10—12% до 30—40%. Содержание магнетита, концентрации которого рассматриваются как полезное ископаемое, весьма не постоянное, как в различных телах ультраосновных пород, так и в отдельных участках крупных тел. Там, где количество магнетита довольно большое, он образует ксеноморфные зерна с извилистыми контурами и в виде цемента заполняет промежутки оливиновых зерен.

Ниже приводим описание главных породообразующих минералов, которые в различных количественных взаимоотношениях встречаются почти во всех породах основного и ультраосновного комплекса г. Арамазд.

Оливин почти везде в этих породах образует округленные свежие кристаллы размером в долю миллиметра, а иногда до 2 мм. При серпентинизации приобретает характерную петельчатую структуру. Серпентин большей частью слабожелтого цвета, а иногда окрашен в буро-коричневый цвет.

В плагиоклазовых зернах, при серпентинизации оливина в породе возникают радиальные трещины. Изредка оливин по периферии обнаруживает пойкилитовую каемку, состоящую из пироксена и игольчатых зерен амфибола. Двупреломление оливина большое; $+2V=86-88^\circ$.

Ромбический пироксен встречается чаще в монцонитах и реже в оливиновом габбро. Представлен свежими призматическими зернами, обнаруживает четкий плеохроизм в светлорозоватых тонах по N_p и в светлозеленоватых тонах по N_g . По оптическим свойствам минерал принадлежит гиперстену.

Моноклинный пироксен представлен призматическими и слегка зеленоватыми зернами диопсида. По периферии переходит в зеленую роговую обманку, особенно в кварцевых монцонитах. Поперек призматической спайности наблюдается густая и короткая штриховка. Оптические показатели диопсида следующие: $CN_g=42^\circ$, $+2V=56^\circ$, $N_g-N_p=0,028$. Многочисленные мелкие включения магнетита окружены вторичным биотитом. Имеются также пойкилитовые включения мелких зерен плагиоклаза.

Биотит встречается почти во всех разновидностях рассматриваемых пород и везде вторичного происхождения. Значительное место он занимает в троктолитах и оливиновом габбро. Биотит в этих породах окрашен в красновато-бурый цвет и сильно плеохрон-

рует в бурых тонах. Схема абсорбции обыкновенная. Плеохроичные оболочки почти не заметные; часто обнаруживает искривления следов спайности. Кроме биотита за счет пироксена образуется также заметное количество зеленой роговой обманки.

Плагиоклаз в ультраосновных породах встречается в виде редких зерен, составляя 2—3%. В троктолитах и оливиновом габбро

Фиг. 7. Петельчатая микроструктура магнетитового дунита; $\times 8$; без анализатора.

содержание плагиоклаза доходит до 60%, а в анортозитах и лабрадоритах количество плагиоклаза составляет 80—90% (фиг. 7).

Совершенно свежие таблитчатые зерна плагиоклаза очень часто ориентированы по направлению полосчатой текстуры породы, являясь выражением структуры течения.

Номер плагиоклаза в кварцевых монцонитах выше 30; номера плагиоклаза в габ-

бровых породах доходят до 70—75, а в троктолитах и анортозитах — до 85—90. В составе плагиоклазов принимают участие также редкие зерна пироксена, оливина, ортоклаза, магнетита, биотита и апатита. Реже встречаются ксеноморфные зерна сфена.

Калиевый полевой шпат в монцонитах и кварцевых монцонитах составляет до 20—27%, а в габбро снижается до 10—12%. В небольшом количестве встречается и в плагиоклазитах.

Ксеноморфные зерна калиевого полевого шпата заполняют промежутки плагиоклазовых зерен в монцонитах; часто обнаруживают пертитовое строение. В крупных кристаллах наблюдаются округленные и оплавленные зерна альбита. Как пертитовое строение калиевых полевых шпатов, так и образование оплавленных зерен кислого плагиоклаза в ортоклазе, является результатом натриевого метасоматоза и альбитизации.

Фиг. 8. Панидиоморфнозернистая структура оливинового анортозита; $\times 8$; николи +.

Магнетит в ультраосновных породах играет важную роль. Его содержание в оливинитах в среднем составляет 12—15%, но местами доходит до 35—40% и реже до 70%, образуя рудные дуниты. Размеры зерен магнетита в пределах 1—2 мм. Если в основных поро-

дах магнетит выделяется одним из первых как включение в оливине или в пироксене, то в дунитах он чаще образует ксеноморфные зерна и в промежутках оливиновых зерен играет роль цемента (фиг. 8).

Химическая характеристика рудного дунита (оливинита) по данным Э. Х. Гуляна [6, 7] следующая:

FeO	33—43%	Cr ₂ O ₃	до 3%
MgO	17—21%	MnO	до 3%
SiO ₂	12—20%	V ₂ O ₅	от следов до 0,05%
Al ₂ O ₃	3—7%	P ₂ O ₅	до 0,23%

Кроме того, в составе руды принимают участие также В до 0,05%, S 0,03% и As, Pb, Mo, Cu (следы).

Результаты химических анализов наиболее распространенных разновидностей магматических пород Сваранцкого месторождения приведены в табл. 2.

Таблица 2

	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	+H ₂ O	Сумма
1	47,50	0,60	20,10	6,91	4,85	0,08	5,28	10,52	2,18	1,32	1,00	100,32
2	63,54	0,06	14,13	9,31	—	0,07	1,56	3,03	3,61	3,83	1,30	100,50

1. Среднее из 4 анализов оливинового габбро.

2. Среднее из 5 анализов кварцевых монцонитов.

(Анализы произведены в химической лаборатории ИГН АН АрмССР).

Выводы о генезисе основных и ультраосновных пород Сваранцкого месторождения железа

1. Описание Лернашенского интрузивного тела приводит к выводу, что в его составе наблюдается явно выраженное вертикальное зональное строение, обусловленное кристаллизационной дифференциацией гранодиоритовой магмы.

В результате этой дифференциации в более глубоких частях интрузии образовались габбро и габбро-диориты, а в верхних горизонтах и в апикальной части образовались гранодиориты, кварцевые монцониты и щелочные снениты.

2. Большое многообразие горных пород, их текстурно-структурных особенностей и минералогического состава наблюдается главным образом по периферии интрузивных тел, в так называемом „чехле“ интрузии, где важную роль играют ассимиляционные процессы и гибридизм. Мощность этого „чехла“ составляет примерно 500—600 м. Во внешнем чехле интрузивного тела породы имеют диоритовый состав.

3. В пользу этого вывода о роли ассимиляции в процессе формирования разновидностей и многообразии горных пород говорит тот факт, что в более глубоких разрезах в каньонах рек обнаружи-

ваются более однородные и не загрязненные породы габбрового состава, в которых важную роль играют оливин, пироксены и биотит.

О контаминации и гибрилизме свидетельствуют многочисленные останцы кровли и ксенолиты порфиритов, которые превратились в роговики и амфиболиты. Наблюдаются также явления гранитизации вмещающих пород.

4. Вся серия основных и ультраосновных пород, а также кварцевых монзонитов, связана между собой постепенными переходами и породы являются сингенетичными образованиями, возникшими как результат дифференциации гранодиоритовой магмы. Все они сложены почти из одних и тех же минералов в различных количественных взаимоотношениях.

5. Вся картина переходов и взаимоотношений основных и ультраосновных пород Сваранцского месторождения напоминает картину у г. Калакар в восточной части Мегринского плутона, описанную Ю. А. Араповым [1], где генезис пород он также объясняет процессами дифференциации и ассимиляции.

Генезис основных и ультраосновных пород Сваранцского месторождения нами представляется следующим образом: эти породы являются результатом повторного восходящего магматического потока из глубоких зон магматического очага, где в результате дифференциации накопились более основные компоненты гранодиоритового магматического очага. Повторное внедрение является результатом новых тектонических процессов в районе.

В пользу этого вывода говорят следующие факты:

- а) широкое развитие полосчатой текстуры в габбровых и ультраосновных породах с почти вертикальным падением разноцветных полос;
- б) вертикальная ориентированность таблитчатых плагиоклазовых зерен в этих породах;
- в) огнейсование более лейкократовых пород периферической части интрузии в пределах развития основных и ультраосновных пород.

Ереванский гос. университет

Поступила 31.X. 1959

Ք. Շ. ԹԱԵՎՈՍՅԱՆ

ԱՐԱՄԱԶԻ ԸՆԹԱՆ ՀԻՄՔԱՅԻՆ ԵՎ ՈՒՆՏՐԱՀԻՄՔԱՅԻՆ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՊԵՏՐՈԳՐԱՖԻԱՅԻ ԱՌԹԻՎ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Վերջին ժամանակներս Բարգուշատի լեռնաշղթայի Արամազդ լեռան հյուսիս-արևմտյան լանջում, Սվարանց գլուղի մոտ հայտնաբերված է երկաթի հանքավայր կապված հիմքային և ուլտրահիմքային ապարների հետ:

Схематическая геолого-петрографическая карта северо-восточных склонов г. Арамазд

1. Гранодиориты и кварцевые монцониты.
2. Троктолиты, габбро, габбро-диориты.
3. Диориты и сиенито-диориты.
4. Розовые сиениты.
5. Шлиры и линзы ультраосновных пород.
6. Порфириты зоцена.
7. Четвертичные образования.
8. Дайки андезитов.
9. Контактные роговики.
10. Свараниское месторождение железа.

Հեղինակը սույն հոդվածում տալիս է այդ տեղամասի գեոլոգոպեարոգրաֆիական նկարագրութիւնը, կապելով վերոհիշյալ ապարները Բարգուշատի լեռնաշղթայի գրանոդիորիտային կազմութեան այն ինտրուզիվ մարմնի հետ, որը մերկանում է Սիսիանի շրջանի Լեռնաշեն և Դարարաս գյուղերի շրջակայքում:

Արամազդ լեռը (3412 մետր բարձրութեամբ), տնի շատ բարդ պեարոգրաֆիական կառուցվածք: Նրա կազմում մասնակցում են գրանոդիորիտներ, կվարցային մոնցոնիտներ և մոնցոնիտներ, ինչպես նաև օլիվին-բիոտիտային գարրոներ, օլիվին-բիոտիտային-օրթոկլազային գարրոներ, տրակտոլիտներ, անորթոդիտներ, պերիդոտիտներ, մագնետիտային դունիտներ ու պիրօքսենիտներ: Բոլոր այս ապարները միմյանց հետ կապված են աստիճանական անցումներով և հանդիսանում են գրանոդիորիտային մագմայի ածսնցյալներ: Արամազդ լեռան հիմնական զանգվածը կազմում են գրանոդիորիտները և կվարցային մոնցոնիտները: Այնուհետև՝ հյուսիս-արևմրտյան լանջում հանքավայրի շրջանում զգալի տարածում ունեն օլիվին պարունակող զանազան հիմքային ապարներ, որոնցում ուլտրահիմքային ապարները կազմում են համեմատաբար փոքր չափերի մարմիններ: Քիչ թվով հանդիպում են նաև 40 մետր լայնութեան ու մի քանի հարյուր մետր երկարութեան, ուղղաձիգին մոտ անկում ունեցող դալկանման ուլտրահիմքային կազմ ունեցող մարմիններ, որոնց հետ և կապված է երկաթի հանքայնացումը:

Սույն հոդվածում արված է վերը հիշատակված ապարների երկրաբանական փոխհարաբերութիւնը և նրանց պեարոգրաֆիական նկարագրութիւնը: Վերջում հեղինակն ռնում է հետևյալ նգրակացութիւնները.

1. Բարգուշատի լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջում, Լեռնաշեն և Դարարաս գյուղերի շրջակայքում մերկացող գրանոդիորիտային ինտրուզիվ մարմինն ունի որոշակի կերպով արտահայտված ուղղաձիգ զոնալ կառուցվածք, որը հետևանք է գրանոդիորիտային մագմայի բլուրեղացման ընթացքում տեղի ունեցող դրավիտացիոն դիֆերենցացման:

Այդ դիֆերենցացման հետևանքով ինտրուզիվ զանգվածի ստորին մասերում առաջացել են հիմքային կազմի ապարները՝ դունիտներ, պերիդոտիտներ, գարրոներ, իսկ ավելի վերին մասերում՝ գրանոդիորիտները, կվարցային մոնցոնիտները և ալկալային սիենիտները:

2. Հրային ապարների տարբերակների, ինչպես և նրանց ստրուկտուրային և միներալոգիական կազմի մեծ բաղադրանութիւնը լավ է արտահայտված ինտրուզիվ մարմնի արտաքին մասում, այսպես կոչված նրա «պատյանում», ուր լուրջ դեր են խաղացել ասիմիլյացիոն պրոցեսները և հիրրիդիզմը: Այդ «պատյանի» հաստութիւնը կազմում է շուրջ 500—600 մետր:

3. Այդ եզրակացութեան օգտին է խոսում այն փաստը, որ ինտրուզիվ զանգվածի խորը կտրվածքներում, գետերի հովիտներում, մերկանում են ավելի միօրինակ գրանոդիորիտային կազմի ապարներ: Հիրրիդիզմի և կոնտամինացիայի մասին են վկայում ինտրուզիվ զանգվածի առաստաղի բազմաթիվ մնացորդները և պորֆիրիտների քսենոլիտները, որոնք մասամբ ենթարկվել են գրանիտացման կամ վեր են ածվել եղջրաքարերի ու ամֆիբոլիտների:

4. Ուլտրահիմքային ապարների, գարրոների, կվարցային մոնցոնիտների և գրանոգիորիտների ու սիենիտների նկարագրված ողջ շարքը կապված է աստիճանական անցումներով և հետևանք է գրանոգիորիտային մագմայի դիֆերենցիացիայի: Այդ շարքի բոլոր ապարները բաղկացած են նույն միներալներից, բայց պահպան քանակական հարաբերություններ:

5. Հրային ապարների փոխհարաբերության ողջ պատկերը նկարագրված շրջանում խիստ նման է Մեդրու գանգվածի արևելյան մասում գտնվող Կալաքար լեռան շրջակայքում նկատվող երևույթներին, որը նկարագրված է Յ. Ա. Արապովի կողմից:

Ուլտրահիմքային ապարների առաջացումը հեղինակը դիտում է որպես հետևանք այն բանի, որ արդեն դիֆերենցացված մագմատիկ ավազանի ստորին մասերից շնորհիվ նոր սեկտոնական պրոցեսների վեր է բարձրացել ուլտրահիմքային մագման տեղադրվելով, կամ ավելի ճիշտ ներարկվելով դեռևս չսառած գարրոնային գանգվածի մեջ: Այդ դատողության օգտին են խոսում հետևյալ փաստերը.

ա) գարրոներում լայն կերպով արտահայտված է զոլավոր ստրուկտուրան, ուր հերթափոխվում են ուլտրահիմքային և հիմքային կազմի զույգերի դառիթափ անկումով.

բ) գարրո-պերիդոտիտային զոլավոր ապարներում պլագիոկլազների ձողաձև բյուրեղները ունեն գրեթե ուղղաձիգ կողմնորոշում.

գ) ուլտրահիմքային ապարների հարևան մասերում հիմքային ապարներն ունեն գնելսային ստրուկտուրա:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Арапов Ю. А. К петрографии сиенито-диоритов горы Каладаш (Армения). Изв. АН АрмССР, № 5—6, 1944.
2. Асланян А. Т. Региональная геология Армении, 1958.
3. Бетехтин А. Г. Шоржинский хромитоносный перидотитовый массив (в Закавказье) и генезис месторождений хромистого железняка вообще. Хромиты СССР, под ред. А. Е. Ферсмана и А. Г. Бетехтина, М—Л., 1937.
4. Габриелян А. А. Севано-Зангезурский глубинный разлом и его геологическое значение. ДАН СССР, т. 106, № 3, 1956.
5. Габриелян А. А. и Тахтаджян А. Л. К вопросу о возрасте угленосных отложений Мегринского района АрмССР. ДАН АрмССР, № 1—2, 1944.
6. Гулян Э. Х. Новое железорудное месторождение в Армении. Бюллетень научно-технической информации, № 5 (17), 1958.
7. Гулян Э. Х. Сваранское железорудное месторождение. Труды управления геологии и охраны недр при Совете Министров Армянской ССР, № 2, 1959.
8. Егоян В. Л. Верхнемеловый вулканизм и ультраосновные интрузии восточной части Малого Кавказа. Изв. АН АзССР, № 6, 1953.
9. Егоян В. Л. и Хайн В. Е. Роль и место ультраосновных интрузий в развитии земной коры. Доклады АН СССР, том XCL, № 4, 1953.
10. Мадхасян Э. Г. Петрография интрузивных пород Даралагеза. Изд. АН АрмССР, 1958.
11. Мкртчян С. С. Зангезурская рудоносная область Армянской ССР. Изд. АН АрмССР, 1958.

12. Паффенгольц К. Н. Бассейн оз. Гокча (Севан). Геологический очерк. Тр. Всесоюзного геол. разв. объедин., вып. 219, 1934.
13. Паффенгольц К. Н. Геология Армении. Госгеолиздат, М.—Л., 1948.
14. Татевосян Т. Ш. К петрографии основных и ультраосновных пород Амасийского района. Изв. АН АрмССР, т. III, № 2, 1950.
15. Татевосян Т. Ш. К петрографии основных и ультраосновных пород Красносельского района. Изв. АН АрмССР, том IV, № 6, 1951.
16. Татевосян Т. Ш. О находке оливинового габбро и граиогаббро на Баргушатском хребте. Научные труды Ереванского гос. университета (серия геолог.) том 59, вып. 3, 1957.
17. Shand S. J. Eruptive rocks 3-th ed. London—New-York, 1947.