Т. Н. КЮРЕГЯН, А. Г. КОЧАРЯН

ФОРМЫ МИГРАЦИИ УРАНА В УГЛЕКИСЛЫХ ВОДАХ ОДНОГО ИЗ РАЙОНОВ КАВКАЗА

В последнее время возник интерес к выяснению форм миграции различных элементов в природных водах. Авторами сделана попытка определить расчетным путем формы миграции урана в основных типах углекислых вод одного из районов Кавказа и установить корреляционную зависимость между растворимым в воде ураном и содержанием растворенного углекислого газа.

С помощью термодинамических расчетов рядом авторов (Мак-Клейн, Баллвинкель, 1956, Брусиловский, 1960, Гаррелс, 1962, Лисицин, 1962) установлено, что уран в природных водах находится в форме различных комплексных ионов уранила: иона уранила $[UO_2^{2+}]$, его гидратированной формы $[UO_2OH^{1+}]$ и других комплексных соединений, которые уранил образует со многими анионами. Из этих соединений наиболее прочны в зоне гипергенеза карбонатные комплексы.

Для установления форм миграции урана в углекислых водах описываемого района, нами были использованы константы нестойкости урановых комплексов и расчетные формулы, опубликованные Лисициным А. К. (1962).

Аналитически определяемая концентрация урана в воде является в конечном счете суммой концентрации всех ураниловых комплексов, которые одновременно существуют в воде. Так как опробовались воды окислительной обстановки, то в расчетную формулу входят соединения только шестивалентного урана

Для удобства расчета нам необходимо было от стехиометрических концентраций перейти к активным концентрациям. Зная ионную силу раствора, по таблицам (Наденнский Б. П., 1959), мы определяли коэффициенты активности f_1 f_2 f_3 f_4 и далее—активные концентрации.

Таким образом, формула I приобретает следующий вид:

$$\begin{aligned} \Sigma [U] = & [UO_2^{2+}] \left[1 + \frac{[OH^{1-}] f_2}{10^{-9.8}} + \frac{[Cl^{1-}] f_2}{10^{-9.3}} + \frac{[SO_4^{2-}] f_2^2}{10^{-1.7}} + \frac{[SO_4^{2-}]^2 f_2^2}{10^{-2.55}} + \right. \\ & \left. + \frac{[SO_4^{2-}]^3 f_2^4}{10^{-3.4} f_4} + \frac{[CO_3^{2-}]^3 f_2^4}{10^{-18.4} f_4} + \frac{[CO_3^{2-}]^2 f_2^2}{10^{-14.7}} \right]. \end{aligned} \quad (II)$$

Так как фтор в большинстве случаев не определялся, а если опреде-

Таблица 1

Формы нахождения урана в некоторых типах углекислых вод одного из районов Кавказа

№№ проб	Формула химического состава	pH	ΣU	HCO ₃ ¹⁻	CO ₃ ²⁻	Cl ¹⁻	SO ₄ ²⁻	В данной пробе U находится в форме:							
								UO ₂ ²⁺	UO ₂ OH ¹⁺	UO ₂ Cl ¹⁺	UO ₂ SO ₃ ²⁻	UO ₂ (SO ₄) ₂ ²⁻	UO ₂ (SO ₄) ₃ ⁴⁻	UO ₂ (CO ₃) ₂ ²⁻	UO ₂ (CO ₃) ₃ ⁴⁻
								гм/л	гм/л	гм/л	гм/л	гм/л	гм/л	гм/л	гм/л
62	M _{3,6} $\frac{HCO_{68}^3 Cl_{16} SO_{15}^4}{Na_{80} Ca_{10} Mg_8}$	5,0	8,4 · 10 ⁻⁸	4,3 · 10 ⁻⁸	4,4 · 10 ⁻⁸	1,06 · 10 ⁻²	4,9 · 10 ⁻³	1,5 · 10 ⁻¹¹	4,6 · 10 ⁻¹¹	3,9 · 10 ⁻¹⁴	1,4 · 10 ⁻¹²	5,1 · 10 ⁻¹⁴	2,5 · 10 ⁻¹⁴	2,3 · 10 ⁻¹²	8,3 · 10 ⁻⁸
50	M _{2,7} $\frac{HCO_{50}^3 SO_{37}^4 Cl_{13}}{Ca_{45} Na_{37} Mg_{17}}$	5,5	2,1 · 10 ⁻¹⁰	2,4 · 10 ⁻²	7,2 · 10 ⁻⁷	6,0 · 10 ⁻³	8 · 10 ⁻³	2 · 10 ⁻¹²	3,8 · 10 ⁻¹¹	8,3 · 10 ⁻¹⁵	5,7 · 10 ⁻¹³	3,2 · 10 ⁻¹⁴	2,8 · 10 ⁻²³	1,9 · 10 ⁻¹⁰	8,9 · 10 ⁻¹²
4	M _{3,3} $\frac{HCO_{83}^3 SO_{14}^4}{Ca_{75} Na_{22}}$	5,9	4,2 · 10 ⁻⁹	1,1 · 10 ⁻²	6,6 · 10 ⁻⁵	3,0 · 10 ⁻³	5,5 · 10 ⁻⁴	2,9 · 10 ⁻¹⁵	7,9 · 10 ⁻¹⁴	4,6 · 10 ⁻¹⁷	5,1 · 10 ⁻¹⁷	1,9 · 10 ⁻¹⁹	1,9 · 10 ⁻²¹	2,5 · 10 ⁻⁹	1,6 · 10 ⁻⁹
226	M _{1,2} $\frac{HCO_{83}^3}{Ca_{62} Mg_{30}}$	6,0	7,0 · 10 ⁻⁸	1,8 · 10 ⁻²	1,4 · 10 ⁻⁶	2,0 · 10 ⁻³	8,5 · 10 ⁻⁴	1,9 · 10 ⁻¹⁰	7,5 · 10 ⁻⁹	4,7 · 10 ⁻¹³	4,3 · 10 ⁻¹²	1,3 · 10 ⁻¹⁴	4,2 · 10 ⁻¹⁶	6,1 · 10 ⁻⁸	9,3 · 10 ⁻¹⁰
80	M _{2,2} $\frac{Cl_{51} HCO_{37}^3 SO_{12}^4}{Na_{70} Ca_{15} Mg_{15}}$	6,5	1,2 · 10 ⁻⁸	1,4 · 10 ⁻²	3,7 · 10 ⁻⁶	2,0 · 10 ⁻²	2,0 · 10 ⁻³	8,5 · 10 ⁻¹²	1,0 · 10 ⁻¹⁰	5,0 · 10 ⁻¹⁴	4,1 · 10 ⁻¹³	5,8 · 10 ⁻¹⁵	2,6 · 10 ⁻¹⁵	1,1 · 10 ⁻⁸	5,1 · 10 ⁻¹⁰
147	M _{3,6} $\frac{HCO_{71}^3 SO_{11}^4 Cl_9}{Na_{70} Ca_{19} Mg_{11}}$	6,8	1,3 · 10 ⁻⁸	3,8 · 10 ⁻²	3,8 · 10 ⁻⁵	5,6 · 10 ⁻³	9,4 · 10 ⁻³	2,3 · 10 ⁻¹⁴	3,0 · 10 ⁻¹¹	1,3 · 10 ⁻¹⁶	7,0 · 10 ⁻¹⁸	1,1 · 10 ⁻¹⁵	4,4 · 10 ⁻¹⁶	1,2 · 10 ⁻⁸	0,1 · 10 ⁻⁸
80	M _{8,1} $\frac{HCO_{24}^3 Cl_{23}}{Na_{32} Ca_{13}}$	6,2	2,3 · 10 ⁻⁹	5,7 · 10 ⁻²	1,1 · 10 ⁻⁵	5 · 10 ⁻²	2,0 · 10 ⁻³	2,6 · 10 ⁻¹³	1,5 · 10 ⁻¹¹	2,8 · 10 ⁻¹⁴	2,3 · 10 ⁻¹⁴	3,2 · 10 ⁻¹⁶	1,6 · 10 ⁻¹⁷	1,6 · 10 ⁻⁹	6,1 · 10 ⁻¹⁰

Примечание: Концентрация CO₃²⁻ рассчитывается по формуле: $CO_3^{2-} = \frac{10^{-10,3} f_1 [HCO_3^{1-}]}{[H^{1+}] f_2}$, где: 10^{-10,3} — 2-я константа диссоциации H₂CO₃.

Таблица 2

Характеристика основных форм урановых комплексов в углекислых водах одного из районов Кавказа в зависимости от содержания CO_3^{2-} — иона

№№	Место проведения анализа	Формула химического состава	рН	ΣU	HCO_3^{1-}	CO_3^{2-}	В данной форме уран находится в воде							
				гм/л			UO_2^{2+}		$\text{UO}_2\text{OH}^{1+}$		$\text{UO}_2(\text{CO}_3)_2(\text{H}_2\text{O})_2^{4-}$		$\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}$	
				гм/л	%		гм/л	%	гм/л	%	гм/л	%		
75	В поле	$M_{8,1} \frac{\text{HCO}_{24}^3 \text{Cl}_{23} \text{SO}_2^4}{\text{Na}_{33} \text{Ca}_{13} \text{Mg}_3}$	6,2	$2,3 \cdot 10^{-9}$	$5,7 \cdot 10^{-2}$	$1,1 \cdot 10^{-5}$	$2,6 \cdot 10^{-15}$	$1,1 \cdot 10^{-2}$	$1,5 \cdot 10^{-11}$	0,67	$1,6 \cdot 10^{-9}$	70,0	$6,6 \cdot 10^{-10}$	28,0
75'	В лаборатории	$M_{7,2} \frac{\text{Cl}_{26} \text{HCO}_{21}^3 \text{SO}_2^4}{\text{Na}_{36} \text{Ca}_9 \text{Mg}_1}$	6,6	$2,3 \cdot 10^{-9}$	$4,5 \cdot 10^{-2}$	$2,2 \cdot 10^{-5}$	$8,0 \cdot 10^{-14}$	$0,4 \cdot 10^{-3}$	$8,0 \cdot 10^{-12}$	0,4	$1,0 \cdot 10^{-9}$	44,4	$1,2 \cdot 10^{-9}$	53,1
139	В поле	$M_{4,9} \frac{\text{HCO}_{63}^3 \text{SO}_{28}^4 \text{Cl}_9}{\text{Na}_{68} \text{Ca}_{19} \text{Mg}_{13}}$	6,8	$1,3 \cdot 10^{-8}$	$4,0 \cdot 10^{-2}$	$2,8 \cdot 10^{-5}$	$1,3 \cdot 10^{-13}$	$1 \cdot 10^{-3}$	$2,7 \cdot 10^{-11}$	0,2	$6,8 \cdot 10^{-9}$	52,3	$5,9 \cdot 10^{-9}$	45,3
139'	В лаборатории	$M_{4,6} \frac{\text{HCO}_{61}^3 \text{SO}_{27}^4 \text{Cl}_8}{\text{Na}_{65} \text{Ca}_{17}}$	7,0	$1,3 \cdot 10^{-8}$	$3,9 \cdot 10^{-2}$	$3,9 \cdot 10^{-5}$	$7,6 \cdot 10^{-14}$	$6 \cdot 10^{-11}$	$2,1 \cdot 10^{-11}$	1,6	$6,0 \cdot 10^{-9}$	46,1	$6,6 \cdot 10^{-9}$	50,8
201	В поле	$M_{6,0} \frac{\text{HCO}_{60}^3 \text{SO}_{27}^4}{\text{Ca}_{44} \text{Na}_{27} \text{Mg}_{27}}$	6,5	$2,1 \cdot 10^{-8}$	$5,0 \cdot 10^{-2}$	$1,9 \cdot 10^{-5}$	$5,7 \cdot 10^{-13}$	$2,7 \cdot 10^{-4}$	$9,1 \cdot 10^{-11}$	0,43	$1,1 \cdot 10^{-8}$	52,3	$9,5 \cdot 10^{-9}$	45,2
201'	В лаборатории	$M_{5,2} \frac{\text{HCO}_{68}^3 \text{SO}_{22}^4}{\text{Ca}_{45} \text{Na}_{37} \text{Mg}_{18}}$	6,8	$2,1 \cdot 10^{-8}$	$4,6 \cdot 10^{-2}$	$3,2 \cdot 10^{-5}$	$1,9 \cdot 10^{-13}$	$0,7 \cdot 10^{-3}$	$3,4 \cdot 10^{-11}$	0,16	$8,1 \cdot 10^{-9}$	37,0	$1,3 \cdot 10^{-8}$	61,0

лялся, то содержания его были менее 1 мг/л (от 0,04 до 0,6 мг/л), фторидными комплексами можно пренебречь (Наумов Г., 1963).

Термодинамические расчеты, основанные на вышесказанном, даны в таблице 1.

Как показали расчеты, количества хлорид-уранилового и сульфат-уранилового комплексов очень малы и не играют существенной роли в общей системе ураниловых комплексов (табл. 1). Это позволяет пренебречь и ими.

В результате упрощений, формула (2) приобретает для наших вод следующий вид:

$$\Sigma [U] = [UO_2^{2+}] \left[1 + \frac{[OH^{1-}]^2 f_2}{10^{-9,8}} + \frac{[CO_3^{2-}]^2 f_2^2}{10^{-14,7}} + \frac{[CO_3^{2-}]^3 f_2^4}{10^{-18,3} f_4} \right] \quad (III)$$

Нами произведено сравнение результатов расчетов, сделанных для проб, проанализированных сразу после отбора и параллельно в условиях стационара. Расчет показал, что в водах, проанализированных на месте, относительное содержание дикарбонатно-уранилового комплекса понижается при хранении, причем, с увеличением содержания $[CO_3^{2-}]$ иона увеличивается количество трикарбонат-уранила (табл. 2).

Как видно из табл. 2, содержание HCO_3^{1-} меняется, но не оказывает существенного влияния на изменение формы нахождения урана в исследуемых водах. В связи с этим, мы рекомендуем физико-химические расчеты производить по формуле (III) с использованием результатов химических анализов, произведенных в лабораторных условиях.

В результате проведенной работы выяснилось, что доминирующими формами нахождения урана в углекислых водах одного из районов Кавказа, независимо от их химического состава, являются диаквадикарбонатно- и трикарбонатно-ураниловые, концентрации которых зависят от щелочно-кислотной обстановки, общей минерализации вод и суммарного содержания в них урана.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР

Поступила 15.XII.1967.

Տ. Ն. ԿՅՈՒՐԵՂՅԱՆ, Ա. Գ. ԲՈՉԱՐՅԱՆ

ՈՒՐԱՆԻ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՉԵՎԵՐԸ ԿՈՎԿԱՍԻ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻՑ ՄԵԿԻ
ԱԾԽԱԹԹՎԱՅԻՆ ՋՐԵՐՈՒՄ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Այս աշխատանքում ի հայտ են բերվում ուրանի միգրացիայի ձևերը Կովկասի շրջաններից մեկի ածխաթթվային ջրերում:

Ածխաթթվային ջրերի համար առաջին անգամ հեղինակների կողմից կիրառվել են հայտնի թերմոդինամիկական հաշվարկային բանաձևերը:

Հետազոտութիւնները ցույց են տալիս, որ ուրանի գերակշռող ձևերը շրջանի ածխաթթվային ջրերում անկախ նրանց քիմիական կազմից, հանդիսանում են դիակվադիկարբոնատա- և տրիկարբոնատա-ուրանիլային: Վերջինների կոնցենտրացիան կախված է մի քանի փոփոխականներից՝ հիմնաթթվային միջավայրից, ջրի ընդհանուր միներալիզացիայից և նրա մեջ ուրանի ընդհանուր բաղադրութիւնից:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Брусиловский С. А. Исследования условий осаждения гидроокиси урана из низкотемпературных водных растворов. «Геохимия», № 7, 1961.
2. Гаррелс А. К. Минеральные равновесия. Изд. иностр. лит. М., 1962.
3. Лисицын А. К. О формах нахождения урана в подземных водах и условия его осаждения в виде UO_2 . «Геохимия», № 9, 1962.
4. Лисицын А. К. К характеристике среды при гидрогеохимических исследованиях. «Геохимия», № 2, 1963.
5. Мак-Клейн Л., Баллвинкель Е. Химия карбонатных соединений урана. Сб. «Химия ядерного горючего». Госхимиздат, М., 1956.