

УДК 56(116.3)

Е. С. ПОРЕЦКАЯ

### О ЮРСКИХ МОРСКИХ ЕЖАХ АРМЯНСКОЙ ССР

В середине прошлого столетия Г. Абих [3] при изучении геологии Кавказа обнаружил на юге Армении, в долинах рек Охчи и Базар-чай, верхнеюрские мраморовидные известняки с многочисленными иглами морских ежей (цидарид) и другими органическими остатками. Среди сильно перекристаллизованных обломков игл он определил похожие на *Cidaris coronatus* и *C. blumenbachii*, но не привел их описания и изображения. В дальнейшем ископаемые остатки морских ежей не привлекали внимание исследователей стратиграфии юры Армении и не изучались до настоящего времени. Возможно это связано с сравнительно редкой их встречаемостью в отложениях, выраженных в значительной своей части вулканогенными фациями. Но и единичные находки панцирей и игл морских ежей представляют интерес, расширяя наши знания об этой группе организмов, обитавших в юрском периоде на территории Армении.

Такие находки сделал за последние годы Н. Р. Азарян, изучавший стратиграфию юрских отложений на севере Армянской ССР. Он обнаружил в окрестностях селения Берд Шамшадинского района в отложениях, отнесенных к кимериджу, иглы *Diplocidaris gigantea* (Agassiz) и *Stereocidaris marginata* (Goldfuss)<sup>1</sup>. В районе горы Маралдаг (междуречье) Дебед и Агстев) в туфопесчаниках нижнего бата им были найдены панцири *Pygomalus ovalis* (Leske) и *Collyrites* sp. Третье местонахождение — окрестности селения Чинари Шамшадинского района. Здесь в известняковой линзе (мощн. 0,8 — 20,0 м) в разрезе туфопесчаников келловея собраны панцири *Holactypus sarthacensis* (Cotteau), *Echinobrissus clunicularis* (Lhw y d) и, как в предыдущем пункте, *Pygomalus ovalis* (Leske). Ниже дано описание этих трех видов.

*Diplocidaris gigantea* (Agass.) и *Stereocidaris marginata* (Goldf.) распространены в Западной Европе и Северной Африке от оксфорда до титона и найдены также в верхнем оксфорде Крыма. Как показывает распространение описанных трех видов, *Holactypus sarthacensis* Cott., известный из бата — келловея Франции, впервые встречен на территории СССР в келловее Армении, тогда как панцири другого вида того же рода — *H. depressus* (Leske) встречаются в среднем келловее Северного Кавказа, Крыма, Русской платформы, среднем и верхнем келловее Туаркыра. *Echinobrissus clunicularis* (Lhw y d), кроме келловея Армянской ССР, найден в верхнем бате

---

<sup>1</sup> Эти и следующие определения автора настоящей статьи.

юго-западных отрогов Гиссарского хребта, в среднем келловее Северного Кавказа, Крыма, центральных районов Русской платформы, в келловее Литовской ССР. В Западной Европе он известен от байоса до нижнего келловоя. *Rugomalus ovalis* (Leske), найденный в нижнем бате и келловее Армянской ССР, встречен в верхнем бате юго-западных отрогов Гиссарского хребта вместе с предыдущим видом, в бате — келловее хребта Большой Балхан (причем, в бате в массовом количестве) и указывается в Западной Европе от байоса до келловоя.

Таким образом, кроме *Holectypus sarthacensis* Cott., остальные виды, найденные в юре Северной Армении, распространены как в других районах Советского Союза, так и за его пределами. Хотя они не являются руководящими для одного какого-либо яруса юрской системы, но три из них определяют возраст отложений не моложе келловоя, а два другие — не древнее оксфорда.

### Отряд HOLECTYPOIDA

#### Подотряд HOLECTYPINA

#### Семейство Holectypidae Lambert, 1900

#### Род Holectypus Desor, 1842

#### *Holectypus sarthacensis* Cotteau, 1856


Табл. 1, фиг. 1 а—г

1857—1874. *Holectypus sarthacensis* Cotteau. Paleont. Franç. Terr. jurass., т. IX, стр. 424, табл. 106.

Голотип. Франция, Парижский бассейн, департамент Сарта; бат.

**Описание.** Панцирь средней величины, равномерно выпуклый, невысокий, округлый, с центральным вершинным щитком. Нижняя сторона вогнутая у перистома, с вздутыми краями. Амбулакры, заостренные у вершины, постепенно расширяются к амбитусу. Амбулакральные пластинки простые, низкие. Поры маленькие, округлые; пары пор расположены косо к оси амбулакра. Вершинный щиток компактный, с четырьмя крупными генитальными порами; мадрепорит доходит до центра. Перистом небольшой, центральный, сильно углубленный, с узкими, неглубокими жаберными вырезами. Перипрокт на значительном расстоянии от перистома, продольно-овальный, расположен своей большей частью на нижней стороне и частично в области амбитуса. Бугорки перфорированные и кренулованные, крупнее на нижней стороне.

**Сравнение.** Описываемый вид отличается от близкого и широко распространенного вида *Holectypus depressus* (Leske) вздутыми краями нижней стороны панциря, небольшим перистомом и значительным расстоянием от него до перипрокта, доходящего до амбитуса. От *H. hemisphaericus* (Agassiz) он отличается более низким положением пери-



Фиг. 1. а—г. *Helictypus sarthacensis* Cocheau. а — вид сверху, б — вид снизу, в — вид сзади, г — вид сверху,  $\times 1$ . Армянская ССР, Шамшадинский район, селение Чинари. Келловей.

Фиг. 2. а—г. *Echnobryssus clunicularis* (Lihwyd). а — вид сверху, б — вид снизу, в — вид сбоку, г — вид сверху,  $\times 1$ . Оттуда же.

Фиг. 3. а—в. *Puzosia ovalis* (Leske). а — вид сверху, б — вид снизу, в — вид сбоку. Оттуда же.

прокта и относительно меньшими высотой панциря и величиной перистоста.

*Распространение.* Бат — келловей Франции, келловей Армянской ССР (Шамшадинский район).

### Отряд CASSIDULOIDA

#### Подотряд CASSIDULINA

Семейство Echinobrissidae d'Orbigny, 1855

Род. Echinobrissus Breynius, 1732

*Echinobrissus clunicularis* (Liljw y d, 1699)

Табл. 1, фиг. 2 а—г

1867—1871. *Echinobrissus clunicularis* Cotteau. *Paléont. franç. Terr. jurass.*, т. IX, стр. 244, табл. 66, фиг. 4—8; табл. 67.

1955. *Echinobrissus clunicularis* Герасимов. *Руковод. ископаемые мезозоя центр-обл. Европ. части СССР*, ч. II, стр. 22, табл. IV, фиг. 1—5.

1963. *Echinobrissus clunicularis* Jesionek—Szymanska. *Echinides irrégyl, du Dogger de Pologne*, стр. 316, табл. III, фиг. 1, 2; табл. IV в тексте, фиг. 1—6.

Голотип. Франция, Парижский бассейн; бат.

*Описание.* Панцирь маленький, невысокий, немного удлинённый, спереди слегка сужен и округлен, сзади незначительно расширен и слабо рассечен. Верхняя сторона выпуклая в передней части и слегка уплощенная косо в задней, где развита анальная борозда. Последняя неглубокая и узкая у вершинного щитка, расширяется и резко углубляется в области перипрокта и снова выполаживается к заднему краю. Нижняя сторона вогнутая в области перистоста, с выпуклыми и слегка волнистыми краями. Амбулакры неширокие, субпеталондные. Амбулакральные пластинки простые, низкие. В каждой паре пор внутренние—округлые или слегка овальные, наружные—более удлинённые. Вблизи перистоста ряды пор удвоены, флосцелль выражена слабо. Вершинный щиток незначительно смещен вперед. Генитальные пластинки 1, 2, 3, 4, близкие по величине с крупными порами; III глазная маленькая, II и IV крупнее, глазные I и V вытянуты назад и доходят до верхней части перипрокта; в середине между ними и генитальными 1 и 4, а также вблизи от перипрокта наблюдаются дополнительные пластинки. Перистостом пятиугольный, углубленный, смещен вперед. Перипрокт супрамаргинальный, продольно-овальный, сильно углубленный. Маленькие бугорки, сохранившиеся на нижней стороне, в углубленных ареалах.

*Сравнение.* *Echinobrissus clunicularis* отличается от других видов удлинённой формой равномерно выпуклого, уплощенного, косо и слабо рассеченного сзади панциря неширокой бороздой от вершинного щитка до заднего края и глубоким перипроктом в ее средней части.

*Распространение.* Байос—бат Англии; бат Франции, Швейцарии; верхний бат юго-западных отрогов Гиссарского хребта; бат—нижний келловей Польши; средний келловей Европейской части СССР (Москов-

ская, Рязанская области), Северного Кавказа, Крыма; келловей Литовской ССР, Армянской ССР (Шамшадинский район).

### Отряд SPATANGOIDA

#### Подотряд PROTOSTERNATA

#### Семейство Disasteridae A. Gras, 1848

#### Подсемейство Collyritinae Beurlen, 1934

#### Род Pygomalus Pomel, 1883

#### *Pygomalus ovalis* (Leske, 1778)

Табл. 1, фиг. За—в

1778. *Spatangites ovalis* Leske. Additamenta ad J. T. Klein natur. disposit. Echinoderm., стр. 253, табл. XLI, фиг. 5.

1867—1874. *Pygomalus ovalis* Cotteau. Paléont. franç. Terr. jurass., т. IX, стр. 47, табл. 7, фиг. 6—13.

1962. *Pygomalus ovalis* Порецкая. Тип Echinodermata — Иглокожие. Класс Echinoidea — Морские ежи, стр. 91, табл. XXIX, фиг. 2.

1963. *Pygomalus ovalis* Jęsiónek-Szumanska. Echinides irregul. du Dogger de Pologne, стр. 364, табл. V, фиг. 1; табл. VIII в тексте.

Голотип. Швейцария, район Базеля; бат.

**Описание.** Панцирь небольшой и средней величины, овальный, слегка суживающийся к заднему концу. Наибольшая ширина в передней половине. Спереди панцирь круто выпуклый, высокий, без борозды, с наибольшей высотой вблизи переднего края у вершины непарного амбулакра. Остальная часть верхней стороны слегка уплощенная, с незначительным понижением к нерезко усеченной задней стороне. Боковые стороны сильно и равномерно выпуклые. Нижняя сторона плоская со слабо выпуклым задним интерамбулакром. Продольный профиль панциря имеет форму неправильного четырехугольника с округленными углами, почти параллельными нижней и верхней сторонами и изогнутыми боковыми. Амбулакры довольно узкие, не петалондные, непарный прямой, парные незначительно изогнутые; задние, отделенные от передних, немного шире их. Амбулакральные пластинки довольно высокие. Поры маленькие, овальные; внутренние обычно мельче наружных и более круглые. Вершинный щиток разорванный. Его передняя часть, приближенная к переднему краю, удлиненная; крупные глазные пластинки II и IV отделяют генитальные 2 и 3 от 1 и 4; мадрепорит больше других; глазная III маленькая. Оторванные задние глазные I и V, неправильной формы, охватывают верхнюю часть перипрокта, примыкая друг к другу по средней линии над его вершиной. Снизу перипрокт окаймляет полулунная пластинка, которую считают измененной генитальной 5. Перипрокт продольно-овальный, кверху слегка заостренный, расположен в верхней части задней стороны панциря, которая ниже слегка уплощена. Перистом округлый или пятиугольный с неровным контуром. Бугорки маленькие, перфорирован-

