

РЕФЕРАТЫ

Р. Н. ТАЯН, Ю. А. МАРТИРОСЯН

О ВЫЯВЛЕНИИ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ЯДРЕ
БАХАДЖУРСКОЙ ГОРСТ-АНТИКЛИНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ

В многочисленных работах по региону терригенно-осадочные отложения разреза р. Вохчи, подверженные интенсивному динамометаморфизму и слагающие центральную часть Бахаджурской горст-антиклинальной структуры, выделены как образования байкальского или герцинского структурных этажей.

В настоящее время в разрезе правого берега р. Вохчи (участок Бахаджур, в 3 км к северо-востоку от с. Лернадзор) в шлифах из редких глинистых прослоев, среди мощной толщи плагиоклаз-кварцевых песчаников установлена globotruncana и многочисленные трудноопределяемые срезы других фораминифер. Обнаруженные глоботрунканы, согласно определению Ю. А. Мартиросян, характерны для отложений низов верхнего мела (турон—коньяк). Подобные формы, но значительно худшей сохранности, установлены нами также в сильно деформированных, разлинзованных отложениях левобережья р. Вохчи.

Приведенные данные дают основание терригенно-осадочные образования центральных частей Бахаджурской горст-антиклинальной структуры отнести к низам верхнего мела.

