ФАЗОВО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБСИДИАНОВ ГЕГАМСКОГО ХРЕБТА ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ

© 2008 г. В. Р. Израелян

0009, Ереван, ЗАО Горнометаллургический институт, ул. Корюна, 14, Республика Армения
e-mail: v_israelyan@mail.ru
Поступила в редакцию 20.02.2008 г.

В статье приведены результаты электронно-микроскопического исследования обсидианов Гегамского хребта (Армения). Из множества разновидностей обсидианов этого месторождения в данной статье приведены результаты исследований двух месторождений. В этих, практически рентгеноаморфных образцах в режиме микродифракции электронов были идентифицированы минералы из группы глины и цеолитов, которые никак не могут быть матричными. Постмагматические эти новообразования, сформированные в результате взаимодействия гидротермов различного состава и температуры, в определенной степени проливают свет на физико-химические условия формирования этих месторождений. Кроме того, полученные результаты позволят разработать технологии синтеза продукции различного назначения на основе обсидианов.

Интерес к строению и фазовому составу природных стекол обусловлен их широким применением в различных областях промышленности и техники как в естественном, так и переработанном виде. Многие из природных стекол и материалов, в которых стеклофаза составляет основную часть, являются также сырьем для получения техногенной продукции (петростиллаты, цеолиты, адсорбенты, теплозвукоизоляционные и др. материалы). Данные об их строении, фазовом составе позволяют усовершенствовать существующие и разработать новые эффективные технологии переработки, получить изделия с заданными свойствами, расширить области их применения, управлять процессами структурообразования композиционных материалов на их основе.

Одним из кардинальных вопросов общей проблемы строения стекла является вопрос характера и степени его неоднородности. Эти вопросы имеют особое значение для вулканических стекол, что обусловлено сложностью состава матричного расплава, переменчивостью P – T условий магматического очага и магмопроводящей системы, как и разнообразием форм извержения и условий охлаждения.

Кроме того, данные о строении и фазовом составе стекол позволяют решить некоторые спорные вопросы, касающиеся физико-химических параметров магматических очагов, что важно для общей вулканологии и экспериментальной минералогии и петрологии.

Наряду со всей этой генетической информацией, они содержат также информации о постмагматических процессах, влияющих на фазово-структурные характеристики матричного продукта.

В выявлении этих вопросов решающая роль принадлежит кристаллической составляющей стекла, которая практически недоступна для петрографии и рентгенографии.

Из всех методов физико-химического анализа наиболее информативным является электронная микроскопия, что обусловлено высокой разрешающей способностью.

Характерной особенностью обсидианов практически всех месторождений Армении является то, что даже в пределах одного месторож-

дения они отличаются окраской, текстурой, блеском, степенью прозрачности и многими внешними признаками.

Нами ранее были проведены микроструктурные исследования множества обсидианов из различных месторождений Армении (Израелян, 1981; Israelyan, 1995; Armenian Obsidions..., 1998).

Обсидианы Гегамского хребта также представлены множеством разных типов, отличающихся окраской, текстурой и другими внешними признаками. По этим признакам нами отобраны порядка 12 разновидностей.

Исследованию были подвергнуты однородные черные прозрачные, мориноподобные, а также прозрачные, полосчатые с белым налетом вдоль полос, полосчатые с разной окраской полос, придающей им агатовую текстуру. Эти полосы окрашены в сероватый, беловатый, коричневатый-бежевый и черные цвета. Ширина полос не превышает 0,8 – 2,5 мм.

Кроме этих разновидностей были отобраны также прозрачные коричневатые с белыми волокнистыми включениями, окрашенные в фиолетово-оранжево-желтоватые цвета разности и многие другие. Описание этих разновидностей, как и результатов исследования в пределах одной статьи не представляется возможным.

В настоящей статье приводятся результаты исследования черного полосчатого, с белым налетом на полосах, образца (Г-5) и обсидиана с разноокрашенными полосами (Г-4).

По химическому составу эти образцы мало отличаются друг от друга (табл. 1). По содержанию микроэлементов они также близки.

Электронно-микроскопический анализ осуществлен методом одноступенчатых Pt / C реплик, полученных после травления естественных сколов в 0,5% HF в течение 5 секунд. Кроме этих препаратов были получены также реплики с экстракцией, что было необходимо для проведения исследований в режиме микродифракций электронов. Этот метод позволяет четко идентифицировать кристаллические составляющие. В качестве эталона, для определения константы прибора, была использована методика напыления на поверхность препарата Al, Au, Ag или Cu.

Результаты проведенных исследований поз-

волили в этих разновидностях выявить минералы, которые никак не могли быть матричными.

В образце Г-5 (черно-прозрачный с белым налетом в полосках) были идентифицированы минералы, явно вторичного образования.

Они представлены глинистыми минералами, гидрослюдами и минералами из группы цеолитов.

Из глинистых минералов были идентифицированы каолинит d/n – 7,1; 3,55; 2,48; 2,33 диккит d/n – 3,59; 2,58; 2,54; 2,34; монтмо-

Таблица 1

Результаты химического анализа исследованных обсидианов

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	TiO ₂	P ₂ O ₅	MnO	Fe ₂ O ₃	FeO	Na ₂ O	K ₂ O	H ₂ O	п.п.п	Σ
Г-4	75,00	15,12	0,94	0,80	0,13	0,20	0,04	0,45	сл.	3,06	4,00	н.о	0,22	99,96
Г-5	74,49	14,92	1,29	1,22	0,13	0,10	0,05	0,85	сл.	3,50	3,06	н.о	0,49	100,1

Рис. 1. Электронные микрофотографии и микроэлектрограммы обр. Г-5, а – диккит, б – каолинит, в – цеолиты.

Рис. 2. Электронные микрофотографии обр. Г-4: а – серовато-белая полоса, б – коричнево-бежевая полоса, в – черноватая полоса.

риллонит $d/n - 4,49; 3,07; 2,56; 1,68$ (рис.1а, б), а из цеолитовых минералов были идентифицированы высококремнистые клиноптилолит $d/n - 8,9; 7,9; 3,97; 3,95$ и морденит $d/n - 9,03; 4,51; 3,91$ (рис.1в).

Образец Г-4 был исследован по отдельным прослойкам.

В серовато-белой полоске были идентифицированы гейландит $d/n - 5,09; 4,64; 3,91; 3,42$ и анальцит $d/n - 5,61; 3,43; 2,92$; (рис.2а).

В коричневато-бежевой полоске было выявлено наличие гидробиотита $d/n - 2,59; 1,66; 1,53$; ферригалуазита $d/n - 4,45; 3,68; 2,33; 1,48$ (рис.2б).

В черноватой полосе кроме этих минералов были идентифицированы также натролит d/n

$- 6,53; 5,87; 4,64; 4,36$ и томсонит $d/n - 6,6; 4,64; 3,51; 2,95; 2,86$ (рис.2в).

Кроме реплик с экстракцией эти образцы были исследованы также с помощью суспензионных препаратов и псевдореплик, полученных с суспензионных препаратов. Суспензионные препараты изготавливались из общей пробы.

В этих препаратах очень четко выделялись слюдистые составляющие (рис.3а,б), а также минералы группы цеолитов (рис.3в).

Результаты и обсуждение. Полученные результаты указывают на то, что в магматическом очаге описываемых обсидианов функционировали гидротермы различного состава, которые, взаимодействуя с вулканическим стеклом, генерировали вышеописанные новообразования. Эти взаимодействия описаны в различных работах (Петров, 1967; Сидоренко, 1980).

В изученных нами обсидианах различных месторождений Армении (как современной, так и Западной), а также Камчатки, наличие таких новообразований ранее не наблюдалось. В качестве эталона были использованы морионоподобные обсидианы Артенинского месторождения Армении, как наиболее чистые, не подвергнувшиеся вторичным воздействиям.

Однако, при других исследованиях было установлено, что вулканические стекла, в том числе и обсидианы, обладают способностью вступать в химические реакции, что обусловлено их микронеоднородным строением (Израелян, 1998).

Полученные результаты в определенной степени проливают свет на спорные вопросы генезиса как глинистых минералов, так и цеолитов.

Заключение. В результате исследований, проведенных методом электронной микроскопии, были получены результаты, которые в определенной степени расширяют представления о механизме формирования месторождений глинистых минералов и цеолитов.

Полученные результаты позволяют также разработать технологии для синтеза техногенной продукции различного назначения на основе обсидианов.

ЛИТЕРАТУРА

- Израелян В.Р. Исследования структуры обсидианов и перлитов некоторых месторождений Армянской ССР. В сб.: Перлит. М.: Наука, 1981 с 187-194.
- Израелян В.Р. Вулканогенные пористые заполнители для бетонов. Ереван: Изд. Айастан, 1998, 119 с.
- Петров В.П. Вулканическое стекло и цеолитообразование. Сб.: «Водные вулканические стекла и минералы» М.: Наука, 1967.
- Сидоренко А.В. Проблемы геологии цеолитов. В сб.: Природные цеолиты, М.: Наука, 1980, с. 5-30.
- Israelyan V. Nanostructural peculiarities of volcanic glasses. IV Int. Congr. On advanced materials, Cancun, Mexico 1995, CD ROM.
- Armenian Obsidians structure and phase composition. Mat. Of XVII Intern. Congr. On glasses, San Francisco - 1998, CD ROM.

Рецензенты А.Х.Мнацаканян и С.Г.Каранетян

Рис 3. Электронные микрофотографии суспензионных препаратов и псевдореплики. а, б – слюдистые минералы, в – минералы группы цеолитов

**ԳԵՂԱՄԱ ԼԵՌՆԱԵՂԹԱՅԻ ՕՐՍԻՊԻԱՆՆԵՐԻ ՖԱՋԱՅԻՆ ՄԻՆԵՐԱԼՈԳԻԱԿԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՄԻԿՐՈՍԿՈՊԻԱԿԱՆ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՉԱՅՆ**

Վ.Ռ. Իսրայելյան

Ամփոփում

Հոդվածում բերված են Գեղամա լեռնաշղթաի օրսիդիանների էլեկտրոնային միկրոսկոպիայի եղանակներով հետազոտությունների արդյունքները:

Ստացված արդյունքները ցույց տվեցին, որ նրանցում գոյություն ունեն այնպիսի միներալներ, որոնք առաջնային լինել չէին կարող: Դրանք ներկայացված են կավային, ցեոլիտային, հիդրոփայլարային խմբերի միներալներով:

Սրանք առաջացել են տարբեր ջերմաստիճանների և քիմիական բաղադրակազմերի հիդրոթերմների հետ փոխազդելու հետևանքով:

Ստացված արդյունքները ընդլայնում են համապատասխան հանքավայրերի առաջացման հետ կապված պատկերացումները:

Սրանք հետմագմատիկ, երկրորդային նոր առաջացումներ են, որոնք արյունք են հրաբխային ապակու քիմիական տարբեր բաղադրակազմերի և ջերմաստիճանների ստորգետնյա ջրերի (հիդրոթերմեր) հետ փոխազդեցությունների հետևանքով:

Դրանից բացի, ստացված արդյունքները հնարավորություն կնձեռնեն մշակել տեխնոլոգիաներ օրսիդիանների հիման վրա տարբեր նշանակության տեխնոգեն արսուադրանքներ ստանալու ուղղությամբ:

**PHASE - MINERALOGICAL PECULIARITIES OF THE GEGHAM RANGE
OBSIDIANS BY ELECTRONIC MICROSCOPY DATA**

V.R. Israelian

A b s t r a c t

The article highlights the outcomes of electronic microexamination of the Gegham Range obsidians and covers 2 deposits only. In electron micro-diffraction condition we identified clay- and ceolite- group minerals that could nowise be matrix. To a considerable extent these post-magmatic neo-formations formed as a result of interaction of different-composition and different – temperature hydrotherms explain physico-chemical conditions of formation of the studied deposits. Besides, the obtained outcomes would underpin the development of a technology of synthesis of obsidian-based products for various purposes.