О НЕЙТРАЛЬНЫХ СЛАБЫХ ТОКАХ В БЕЗНЕЙТРИННЫХ ЛЕПТОННЫХ РЕАКЦИЯХ

А. Г. СЕДРАКЯН

В связи с экспериментальным наблюдением реакций $\bar{\nu}_\mu e^- \rightarrow \bar{\nu}_\mu e^-$, $\begin{pmatrix} \nu_\mu \\ - \\ \nu_\mu \end{pmatrix} + N \rightarrow \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ - \\ \nu_\mu \end{pmatrix} + \text{адроны}$, которые указывают на существование нейтрального слабого тока, изучены предсказания модели Вайнберга для рассеяния электрона на электроне. Получены поправка к дифференциальному сечению электромагнитного рассеяния и средняя поляризация рассеянной частицы и проанализированы условия, при которых эти эффекты могут быть обнаружены.

1. В связи с экспериментальным наблюдением безмюонных реакций [1]

$$\bar{\nu}_\mu e^- \rightarrow \bar{\nu}_\mu e^-, \quad \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ - \\ \nu_\mu \end{pmatrix} + N \rightarrow \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ - \\ \nu_\mu \end{pmatrix} + \text{адроны} \quad (1)$$

возрос интерес к вопросу о существовании нейтральных слабых токов и к единым моделям слабых и электромагнитных взаимодействий, содержащим нейтральный Z^0 -бозон [2]. Наблюдение реакций (1) нельзя еще считать полным доказательством существования нейтрального слабого тока. Существуют схемы четырехфермионного слабого взаимодействия без нейтральных токов [3], которые допускают реакции (1). Окончательное доказательство существования нейтрального слабого тока можно получить на основе изучения лептонных реакций

$$e^+ e^- \rightarrow \mu^+ \mu^-, \quad (2)$$

$$e^+ e^- \rightarrow e^+ e^-,$$

$$e^- e^- \rightarrow e^- e^-. \quad (3)$$

Эффекты слабого взаимодействия в этих реакциях предсказываются едиными теориями электромагнитных и слабых взаимодействий, содержащими промежуточный Z^0 -бозон. Экспериментальное обнаружение и исследование эффектов слабого взаимодействия в реакциях (2) и (3) было бы не только доводом в пользу моделей с нейтральным Z^0 -бозоном, но и проверкой параметров этих теорий.

2. Существование нейтрального слабого тока в реакциях $e^+ e^- \rightarrow \mu^+ \mu^-$ и $e^+ e^- \rightarrow e^+ e^-$ проявляется в трех эффектах:

а) поправка к электромагнитному сечению,

б) асимметрия дифференциального сечения относительно $\theta = \pi/2$,

в) средняя поляризация конечных частиц.

Зависимость этих эффектов от угла Вайнберга приведена на рис. 1. Эти эффекты при энергиях 3—5 Гэв составляют $\sim 1\%$ и становятся существенными при высоких энергиях. Но при высоких энергиях становятся су-

ущественными также эффекты слабого взаимодействия в реакции $e^+ e^- \rightarrow$ адроны и в связи с тем, что при высоких энергиях трудно отличить адроны от мезонов, экспериментальное исследование этих эффектов в реакциях (2)

Рис. 1. Зависимость эффектов слабого взаимодействия от угла Вайнберга в реакции $e^+ e^- \rightarrow \mu^+ \mu^-$ при $E = 20$ Гэв: а) поправка к дифференциальному сечению, б) асимметрия процесса относительно $\theta = 90^\circ$, в) средняя поляризация конечной частицы.

и (3) затруднительно. Предсказания для реакций $e^+ e^- \rightarrow \mu^+ \mu^-$ и $e^+ e^- \rightarrow e^+ e^-$ содержатся в работах [4—9].

3. В настоящей работе рассматриваются эффекты слабого взаимодействия в реакции $e^- e^- \rightarrow e^- e^-$.

Лагранжиан взаимодействия записывается в виде

$$L_{\text{int}} = i \bar{u}_e \gamma_\alpha u_e A_\alpha + i \bar{u}_e (g_V + g_A \gamma_5) \gamma_\alpha u_e Z_\alpha^0. \quad (4)$$

В модели Вайнберга параметры g_V и g_A определены следующим образом:

$$g_V = \frac{3e}{4} \operatorname{tg} \theta_W - \frac{e}{4 \operatorname{tg} \theta_W}, \quad g_A = \frac{e}{4} \left(\operatorname{tg} \theta_W + \frac{1}{\operatorname{tg} \theta_W} \right), \quad (5)$$

где θ_W — угол Вайнберга.

Экспериментальное и теоретическое рассмотрение реакции $\nu_e e^- \rightarrow \nu_e e^-$ для угла Вайнберга дает оценку $\sin^2 \theta_W \leq 0,35$ [10, 11]. Исследование полулептонных реакций в рамках модели Вайнберга (независимо от вида адронного слабого тока) дает $\sin^2 \theta_W \geq 0,3$ [12, 13]. В настоящей работе для оценки эффектов использована величина $\sin^2 \theta_W = 0,32$.

Направим импульс одного из начальных электронов по оси Z , а его вектор поляризации по оси Y . Так как энергия электронов велика, то массой их можно пренебречь и в с. ц. м. для 4-импульсов начальных электронов можно записать

$$p_1 = (0, 0, E, iE), \quad p'_1 = (0, 0, -E, iE),$$

для 4-импульсов конечных электронов имеем

$$p_2 = (E \sin \theta \sin \varphi, E \sin \theta \cos \varphi, E \cos \theta, iE),$$

$$p'_2 = (-E \sin \theta \sin \varphi, -E \sin \theta \cos \varphi, -E \cos \theta, iE).$$

Мы рассматриваем случай поперечно поляризованных начальных электронов и записываем 4-векторы поляризации в виде

$$s_1 = (0, s_1, 0, 0), \quad s'_1 = (0, s_2, 0, 0).$$

Для продольно поляризованных конечных электронов 4-векторы поляризации имеют вид

$$s_2 = \frac{h_1}{m_e} p_2, \quad s'_2 = \frac{h_2}{m_e} p'_2,$$

где h_1 и h_2 — их спиральности.

Рассмотрение процесса $e^- e^- \rightarrow e^- e^-$ мы проводим на основе диаграмм Фейнмана, изображенных на рис. 2.

Рис. 2.

Матричный элемент этого процесса имеет вид

$$M = \frac{e^2 (\bar{u}_2 \gamma_\alpha u_1) (\bar{u}'_2 \gamma_\alpha u'_1)}{(p_2 - p_1)^2} - \frac{e^2 (\bar{u}'_2 \gamma_\alpha u_1) (\bar{u}_2 \gamma_\alpha u_1)}{(p'_2 - p'_1)^2} + \frac{(\bar{u}_2 \Gamma_\alpha u_1) (\bar{u}'_2 \Gamma_\alpha u'_1)}{(p_2 - p_1)^2 + m_z^2} - \frac{(\bar{u}'_2 \Gamma_\alpha u_1) (\bar{u}_2 \Gamma_\alpha u'_1)}{(p'_2 - p'_1)^2 + m_z^2}, \quad (6)$$

где $\Gamma_\alpha = (g_V + g_A \gamma_5) \gamma_\alpha$.

Для дифференциального сечения с поляризованными начальными и конечными частицами получаем

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\alpha^2}{4E^2} \left\{ (1 - h_1 h_2) \left[\frac{1 + z^2}{(1 - z^2)^2} + s_1 s_2 \frac{\cos 2\varphi}{4} \right] + \frac{(1 + h_1 h_2) (g_V^2 + g_A^2)}{8\pi\alpha (1 - z^2) (a^2 - z^2)} [2a + (a - 1) z^2 + a(1 + z^2) z^2 + 4az^2] + \frac{(1 - h_1 h_2) (g_V^2 - g_A^2)}{8\pi\alpha (1 - z^2) (a^2 - z^2)} [4a(1 + z^2) - s_1 s_2 \cos 2\varphi (a - z^2)(1 - z^2)] + \frac{(1 + h_1 h_2)}{4(1 - z^2)^2} (5 + 2z^2 + z^4) + \frac{(h_1 + h_2) g_V g_A}{4\pi\alpha (1 - z^2) (a^2 - z^2)} (az^4 + 6az^2 + 4z^2 - 3a) \right\},$$

где

$$z = \cos \theta, \quad a = 1 + \frac{m_z^2}{2E^2}. \quad (7)$$

Существование Z^0 -бозона проявляется в двух эффектах.

а. Поправка к сечению электромагнитного рассеяния электронов, обусловленная слабым взаимодействием. Величина поправки k (отношение интерференционных членов в сечении к сечению электромагнитного рассеяния) ограничена сверху. Из сравнения членов типа

$$\frac{1}{(1-z^2)^2} \quad \text{и} \quad \frac{g_V^2 + g_A^2}{8\pi a} \frac{2a}{(1-z^2)(a^2-z^2)}$$

видно, что вклад слабой поправки наиболее существенно проявляется при $\theta = 90^\circ$, когда

$$k \lesssim \frac{5}{2} \frac{g_V^2 + g_A^2}{8\pi a} \cdot 100\%. \quad (8)$$

В модели Вайнберга при $E \rightarrow \infty$ получаем $k \lesssim 50\%$. При энергии $E = 100$ Гэв поправка $\sim 40\%$, а при $E = 20$ Гэв она $\sim 7\%$. Зависимость слабой поправки от угла рассеяния показана на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость поправки к дифференциальному сечению электромагнитного рассеяния от угла рассеяния θ при энергиях 10 и 20 Гэв и поляризациях 0 и 0,92.

б. Возникновение средней поляризации рассеянной частицы, которая есть

$$\langle h \rangle = \frac{\sum_{h_1} d\sigma(h_1 = 1) - \sum_{h_1} d\sigma(h_1 = -1)}{\sum_{h_1, h_2} d\sigma} = \frac{g_V g_A \alpha (az^4 + 6az^2 + 4z^2 - 3a)}{8\pi(1-z^2)(a^2-z^2) \sum_{h_1, h_2} d\sigma/d\Omega} \quad (9)$$

Для нее можно получить ограничение

$$\langle h \rangle \lesssim \frac{g_V g_A}{8\pi\alpha a} \cdot 100\% \quad (10)$$

При $E=100$ Гэв средняя поляризация составляет примерно 5%, а при $E=20$ Гэв она очень мала $\sim 0,6\%$. Зависимость $\langle h \rangle$ от угла рассеяния θ показана на рис. 4. Так как $\langle h \rangle \sim g_V g_A$, то средняя поляризация $\langle h \rangle$ обусловлена только слабым взаимодействием, и ее обнаружение непосредственно указывало бы на существование нейтрального слабого тока.

Рис. 4. Зависимость средней поляризации конечной частицы от угла рассеяния θ при $E=100$ Гэв.

Отметим, что учет массы электрона дает эффект порядка m_e^2/E^2 , фотонные диаграммы высших порядков (α^2) существенны при низких энергиях [7—9], а чисто слабая поправка в сечении составляет величину порядка нескольких процентов. Приведенные оценки для поправки к сечению позволяют надеяться обнаружить эффект слабого взаимодействия уже при энергиях $E=15$ Гэв. Для обнаружения поляризационных эффектов нужны энергии порядка 100 Гэв.

Обнаружение отмеченных нами эффектов в реакциях

однозначно указывало бы на существование Z^0 -бозона и нейтрального слабого тока. Предсказания, связанные со слабым нейтральным током, при относительно низких энергиях экспериментально выгоднее проверять в реакциях (2), а при высоких энергиях—в реакции (3).

Автор благодарен А. Н. Заславскому за постановку задачи и С. Г. Матиняну за полезное обсуждение.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. L. E. I. Hasert et al. Phys. Lett., 46B, 121 (1973); 46B, 138 (1973).
2. S. Weinberg. Phys. Rev. Lett., 19, 1264 (1967); Phys. Rev., D5, 1412 (1972).
3. Б. Понтекорво. Письма ЖЭТФ, 19, 233 (1974).
4. J. Godine, A. Hankey. Phys. Rev., D6, 3301 (1972).
5. A. Love. Nuovo Cim. Lett., 5, 113 (1972).
6. W. K. Tung, A. K. Mann, E. A. Paschos. Phys. Lett., 41B, 355 (1972).
7. R. W. Brown et al. Phys. Lett., 43B, 403 (1973).
8. P. A. Dicus. Phys. Rev., D8, 890 (1973).
9. R. Budny. Phys. Lett., 45B, 340 (1973).
10. H. H. Chen, B. W. Lee. Phys. Rev., D5, 1874 (1972).
11. H. S. Gurr, F. Reines, H. W. Sobel. Phys. Rev. Lett., 28, 1406 (1972).
12. E. A. Paschos, L. Wolfenstein. Phys. Rev., D7, 91 (1973).
13. A. Pais, S. B. Treiman. Phys. Rev., D6, 2700 (1972).

ԹՈՒՅՆ ԶԵՂՈՔ ՀՈՍԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ա. Գ. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ

$$\bar{\nu}_\mu e^- \rightarrow \bar{\nu}_\mu e^-, \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ - \\ \nu_\mu \end{pmatrix} + N \rightarrow \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ - \\ \nu_\mu \end{pmatrix} +$$

ադրոններ ուժեղափոխության փոքր ճանաչման հայտնաբերման կապակցությամբ, որոնք հաստատում են թույլ շեղման հոսանքների գոյությունը, ուսումնասիրվել է էլեկտրոն-էլեկտրոն ցրումը Վայնբերգի մոդելում: Ստացված է ուղղումը էլեկտրամագնիսական ցրման կտրվածքին, ցրված մասնիկի միջին բևեռացումը և քննարկված են այն պայմանները, որոնց դեպքում այդ էֆեկտները կարող են հայտնաբերվել:

ON THE NEUTRAL WEAK CURRENTS

A. G. SEDRAKYAN

Connected with the experimental indications of the existence of the neutral weak current in reactions $\bar{\nu}_\mu e^- \rightarrow \bar{\nu}_\mu e^-, \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ - \\ \nu_\mu \end{pmatrix} + N \rightarrow \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ - \\ \nu_\mu \end{pmatrix} - \text{hadrons}$, the predictions of Weinberg's model for electron-electron scattering are studied. The correction to the differential cross-section and the average polarization of the scattered particle are obtained. These effects at high energy would serve as direct evidences of the existence of the neutral weak current.