УДК 539.172.3

ИЗМЕРЕНИЕ АСИММЕТРИИ СЕЧЕНИЯ РЕАКЦИИ $\gamma p \rightarrow p \pi^0$ ДЛЯ УГЛА РОЖДЕНИЯ ПИОНА 65° В С.Ц.М. В РЕЗОНАНСНОЙ ОБЛАСТИ

Р. О. АВАКЯН, Г. А. АВДАЛЯН, А. Э. АВЕТИСЯН, К. Ш. АГАБАБЯН,
А. В. АГАРОНЯН, А. А. АРМАГАНЯН, Л. Г. АРУТЮНЯН, А. С. БАГ-
ДАСАРЯН, Г. А. ВАРТАПЕТЯН, С. С. ДАНАГУЛЯН, В. С. ЕГАНОВ,
А. П. КАРАПЕТЯН, Г. О. МАРУКЯН, Э. М. МАТЕВОСЯН, Р. М. МИР-
ЗОЯН, А. А. ОГАНЕСЯН, Ж. В. ПЕТРОСЯН, И. П. ПРОХОРОЕНКО,
Е. М. СХТОРЯН, Р. Ц. САРКИСЯН, С. П. ТАРОЯН, Г. М. ЭЛБАКЯН,
Э. О. АВАКЯН, М. А. ОГАНЕСЯН

Ереванский физический институт

(Поступила в редакцию 20 марта 1983 г.)

Представлены результаты измерений величины асимметрии сечения реакции $\gamma p \rightarrow p \pi^0$ под углом рождения пиона 65° в с.ц.м. в интервале энергий $0,81 \div 1,38$ ГэВ. Полученные результаты сравниваются с разными теоретическими предсказаниями.

Настоящая работа является продолжением цикла исследований по изучению угловой и энергетической зависимости величины асимметрии сечения фоторождения π^0 -мезонов, проводимых в Ереванском физическом институте [1, 2]. В ней представлены результаты измерений величины асимметрии для угла рождения пиона $65^\circ \pm 3^\circ$ в с.ц.м. при энергиях $E_\gamma = 0,81 \div 1,38$ ГэВ. Поляризованный пучок гамма-квантов был получен на Ереванском электронном ускорителе с помощью когерентного тормозного излучения электронов с энергией 4,6 ГэВ на кристалле алмаза. Необходимое направление вектора поляризации пучка фотонов относительно плоскости реакции достигалось соответствующей ориентацией плоскостей $[022]$ и $[0\bar{2}\bar{2}]$ кристалла с помощью гониометрической установки [3].

На рис. 1 приведена схема экспериментальной установки. Выделение реакции $\gamma p \rightarrow p \pi^0$ осуществлялось регистрацией γ -кванта от распада π^0 -мезона в совпадении с протоном отдачи. Детектирование гамма-кванта проводилось с помощью счетчика полного поглощения на основе кристалла $NaI(Tl)$ с диаметром 200 мм и длиной 300 мм. Детектирование протона отдачи осуществлялось с помощью пробежного спектрометра. Для определения угла вылета протона использовались 4 многонитяные пропорциональные камеры с размерами 128×128 мм² и 256×256 мм². Отделение протонов от сопутствующих заряженных пионов проводилось с помощью двух (dE/dx) счетчиков. Энергия протона определялась с помощью соотношения пробег—энергия на основе использования информации от счетчиков пробежного спектрометра.

Информация с установки выводилась в линию с ЭВМ «Электроника-60» и ЕС-1022. Разрешение по энергии первичных фотонов, определяемое установкой, составляло ± 21 МэВ.

В процессе измерений форма спектра и положение пика поляризованных фотонов определялись и затем периодически контролировались парным γ -спектрометром. На рис. 2 приведена зависимость поляризации фотонов от энергии для тормозного спектра с пиковой энергией 1,1 ГэВ. Вычисление поляризации проведено методом, описанным в работе [4].

Рис. 1.

Рис. 1. Экспериментальная установка: $NaI(Tl)$ — спектрометр полного поглощения; $\bar{A}_1, \bar{A}_2$ — антисчетчики; C_1 — апертурный счетчик; C_2, C_3 — счетчики (dE/dx); МПК — система многослойных пропорциональных камер; $R_1 \div R_5$ — пробежные счетчики; $\bar{C}$ — антисчетчик.

Рис. 2.

Рис. 2. Энергетический спектр поляризации фотонов.

Для определения вклада фоновых реакций исследовалась зависимость числа регистрируемых событий ($p\gamma$) от угла смещения ($\pm 4^\circ \div \pm 12^\circ$) спектрометра полного поглощения относительно положения, соответствующего кинематике реакции $\gamma p \rightarrow p\pi^0$. Данные измерений сравнивались с расчетами, проведенными методом Монте-Карло. Оказалось, что вклад фона составляет до 7% в разных энергетических областях.

Рис. 3. Энергетическая зависимость асимметрии Σ для угла рождения π^0 -мезона $\theta_{\pi^0}^* = 65^\circ$ в с. д. м. Теоретические кривые взяты из работ [5], Феллер [6], ААБ [7].

На рис. 3 (а также в таблице) приведена зависимость величины асимметрии от энергии E_{γ} в интервале 0,81 ÷ 1,38 ГэВ при $\overline{\theta}_{\gamma\pi}^* = 65^\circ$ вместе с теоретическими предсказаниями Меткалфа и Уолкера [5], Феллера и др.

Таблица

E_{γ} (МэВ)	Σ	$\sigma(\pm)$	E_{γ} (МэВ)	Σ	$\sigma(\pm)$	E_{γ} (МэВ)	Σ	$\sigma(\pm)$
810	0,16	$\pm 0,1$	986	0,44	$\pm 0,03$	1220	0,28	$\pm 0,065$
854	0,365	$\pm 0,05$	1030	0,52	$\pm 0,03$	1260	0,265	$\pm 0,07$
898	0,315	$\pm 0,04$	1074	0,55	$\pm 0,04$	1300	0,38	$\pm 0,075$
942	0,315	$\pm 0,03$	1118	0,585	$\pm 0,06$	1340	0,35	$\pm 0,097$
			1162	0,465	$\pm 0,12$	1380	0,21	$\pm 0,12$

[6], Азнаурян и др. [7]. При этом величина асимметрии Σ определялась так

$$\Sigma = \frac{1}{P_{\gamma}} \frac{N_{\perp} - N_{\parallel}}{N_{\perp} + N_{\parallel}},$$

где $N_{\perp}$ и $N_{\parallel}$ — число $\rho\pi^0$ (γ) совпадений, когда первичные фотоны поляризованы перпендикулярно к плоскости рождения мезонов и параллельно ей, $\overline{P}_{\gamma}$ — эффективная поляризация фотонов. В приводимую ошибку включена как статистическая ошибка, так и ошибка в определении величины эффективной поляризации.

Как следует из рис. 3, результаты анализа Меткалфа—Уолкера не описывают экспериментальную зависимость асимметрии от E_{γ} . Из сравнения анализов Феллера и Азнаурян, выполненных до энергии 1,2 ГэВ, с результатами настоящей работы трудно отдать предпочтение одному из этих анализов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Авакян Р. О. и др. ЯФ, 26, 1014 (1976).
2. Авакян Р. О. и др. ЯФ, 29, 1212 (1979).
3. Авакян Р. О. и др. Изв. АН АрмССР, Физика, 10, 61 (1975).
4. Авакян Р. О., Акопов Н. З., Безверхая А. П. Препринт ЕФИ-265 (58), 1977.
5. Metcalf W. J., Walker R. L. Nucl. Phys., B76, 253 (1974).
6. Feller P. et al. Nucl. Phys., B104, 219 (1976).
7. Азнаурян И. Г. и др. Тезисы докладов Пятой конф. молодых ученых Ереванского физического института, Ереван, 1981.

ՌԵԶՈՆԱՆՍԱՑԻՆ ՏԻՐՈՒՅԹՈՒՄ $\gamma p \rightarrow p\pi^0$ ՌԵԱԿՑԻԱՅԻ ԿՏՐՎԱԾՔԻ
ԱՍԻՄԵՏՐԻԱՅԻ ԶԱՓՈՒՄԸ ԶԱՆԳՎԱԾՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
ՊԻՈՆԻ ԾՆՄԱՆ 65° ԱՆԿՑԱՆ ՀԱՄԱՐ

Ռ. Հ. ԱՎԱԳՅԱՆ, Գ. Ս. ԱՎԴԱԼՅԱՆ, Ա. Է. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, Կ. Շ. ԱՂԱՐԱՐՅԱՆ, Ա. Վ. ԱՀԱՐՈՆՅԱՆ,
Ա. Ս. ԱՐՄԱՂԱՆՅԱՆ, Լ. Գ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Ա. Ս. ԲԱՂԴԱՍՏԱՐՅԱՆ, Հ. Հ. ՎԱՐԴԱՊԵՏՅԱՆ,
Ս. Ս. ԳԱՆԱԳՈՒԼՅԱՆ, Վ. Ս. ԵԳԱՆՈՎ, Ա. Պ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, Հ. Հ. ՄԱՐՈՒՔՅԱՆ,
Է. Մ. ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ, Ռ. Մ. ՄԻՐԶՈՅԱՆ, Ա. Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, Ժ. Վ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ,
Ի. Պ. ՊՐՈՒՆՈՐԵՆԿՈ, Ե. Մ. ՍԵՏՈՐՅԱՆ, Ռ. Ց. ՍԱՐԳՍՅԱՆ, Ս. Պ. ԹԱՐՈՅԱՆ, Գ. Մ. ԷՐԱԿՅԱՆ,
Է. Հ. ԱՎԱԳՅԱՆ, Մ. Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Ներկայացված են $\gamma p \rightarrow p\pi^0$ ռեակցիայի կտրվածքի ասիմետրիայի մեծության լաբորատոր
արդյունքները զանգվածների կենտրոնի համակարգում պիոնի ծնման 65° անկյան համար
0,81–1,38 ԳԷՎ էներգետիկ տիրույթում: Ստացված արդյունքները համեմատվում են զանա-
զան տեսական կանխադուշակումների հետ:

MEASUREMENT OF $\gamma p \rightarrow p\pi^0$ REACTION CROSS SECTION
ASYMMETRY FOR 65° C.M.S. ANGLE OF PION PRODUCTION
IN RESONANCE REGION

R. O. AVAKYAN, G. A. AVDALYAN, A. E. AVETISYAN, A. A. ARMAGANYAN
K. Sh. AGABABYAN, A. V. AGARONYAN, L. G. ARUTYUNYAN, A. S. BAGDA-
SARYAN, G. A. VARTAPETYAN, S. S. DANAGULYAN, V. S. EGANOV, A. P. KA-
RAPETYAN, G. O. MARUKYAN, E. M. MATEVOSYAN, R. M. MIRZOYAN,
A. A. OGANESYAN, Zh. V. PETROSYAN, I. P. PROKHORENKO, E. M. SKHTO-
RYAN, R. Ts. SARKISYAN, S. P. TAROYAN, G. M. ELBAKYAN,
E. O. AVAKYAN, M. A. OGANESYAN

Measurement data on $\gamma p \rightarrow p\pi^0$ reaction cross section asymmetry for 65° c.m.s
angle of pion production in 0,81–1,38 GeV energy range are given. The data are
compared with various theoretical predictions.