УДК 535.23

ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕН РЕЛАКСАЦИИ ВОЗБУЖДЕННЫХ УРОВНЕЙ $3P_{1/2, 3/2}$ В ПЛОТНЫХ ПАРАХ АТОМАРНОГО Na ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

В. М. АРУТЮНЯН, А. Р. АРАМЯН, С. П. ИШХАНЯН,
А. А. ЛАЛАЯН, Т. А. ПАПАЗЯН

НИИ физики конденсированных сред ЕГУ

(Поступила в редакцию 9 апреля 1984 г.)

Исследована зависимость эффективных времен девозбуждения $3P_{1/2, 3/2}$ -уровней Na от плотности среды. В интервале плотностей $2,85 \cdot 10^{14} - 1 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$ обнаружено уменьшение указанных времен при увеличении плотности паров Na .

Экспериментальное исследование времен релаксации среды имеет важное значение при интерпретации разнообразных эффектов взаимодействия резонансного излучения с веществом. При распространении резонансного излучения в оптически плотной среде существенен эффект пленения излучения [1, 2], который приводит к увеличению среднего времени жизни резонансных уровней.

В работе [3] методом резонансной флуоресценции были проведены измерения эффективных времен жизни возбужденных уровней Na как функций плотности среды. Было зарегистрировано уменьшение эффективных времен жизни при увеличении температуры насыщенных паров Na (в пределах $320-355^\circ \text{C}$). Стоит отметить, что хотя такой результат экспериментально наблюдался более 50 лет назад [4] для резонансного излучения ртути, в случае атомного резонанса этот факт в дальнейшем, насколько нам известно, нашел подтверждение лишь в вышеупомянутой работе [3].

По всей видимости это связано с малой чувствительностью традиционных методов регистрации эффективных времен релаксации резонансных уровней и техническими трудностями проведения эксперимента.

Нами было проведено экспериментальное исследование релаксационных времен $3P_{1/2, 3/2}$ -состояний Na при температуре среды в пределах $300-340^\circ \text{C}$ поляриметрическим методом, который на 2—3 порядка [5] более чувствителен, чем известные методы спектроскопии. Сущность этого метода заключается в том, что при прохождении эллиптически-поляризованного излучения через двухуровневую резонансную среду происходит самовращение эллипса поляризации [6]. При этом угол поворота прямо пропорционален разности начальных заселенностей уровней ($\alpha \sim \Delta N$), и если заселенность верхнего уровня этой двухуровневой среды очень мала, т. е. ею можно пренебречь, то изменение величины угла поворота при фиксированных значениях интенсивности проходящего эллиптического излучения и расстройки резонанса будет полностью определяться изменением

заселенности нижнего уровня. Следовательно, исследуя самовращение в двухуровневой среде, где нижний уровень, в свою очередь, является возбужденным уровнем, мы имеем возможность на основе измерения временного поведения угла поворота определить временной ход изменения заселенности этого уровня.

В эксперименте с целью определения изменения во времени концентрации возбужденных атомов в состоянии $3P_{1/2}$ или $3P_{3/2}$ навстречу линейно-поляризованному интенсивному импульсу, резонансному переходом $3S_{1/2} - 3P_{1/2}$ или $3S_{1/2} - 3P_{3/2}$ и заселяющему соответствующий $3P$ -уровень, через среду пропускалось эллиптически-поляризованное лазерное излучение (параметр Стокса для круговой поляризации составлял $\sim 2 \cdot 10^{-2}$) с временной задержкой τ . Это излучение, находящееся в резонансе с переходом $3P_{1/2} - 4D_{3/2, 5/2}$ или $3P_{3/2} - 4D_{3/2, 5/2}$, после выхода из среды отражалось полупрозрачным зеркалом и попадало в анализирующую поляризацию систему. Измеряя отношение регистрируемых интенсивностей перпендикулярной и параллельной компонент этого излучения в зависимости от времени задержки τ между импульсами, из закона Малюса мы определяли временной ход величины поворота.

На рисунке приведена зависимость угла поворота α резонансного (переход $3P_{3/2} - 4D_{3/2, 5/2}$) самовращения эллипса поляризации от времени

Зависимость относительного угла поворота плоскости поляризации при разных температурах среды: а) $T = 300$; б) $T = 320$; в) $T = 340^\circ \text{C}$.

задержки τ при различных температурах насыщенных паров Na . Следует отметить, что параметры используемых в эксперименте перестраиваемых по частоте лазеров на красителе были следующими: длительность импульсов составляла примерно 15 нс, спектральные ширины $\sim 0,015$ нм, мощность линейно-поляризованного излучения — не более 80 кВт, а эллиптически-поляризованного излучения — не более 20 кВт, диаметры лазерных пучков ~ 3 мм, угол расходимости $\sim 4 \cdot 10^{-3}$ рад. Длина цилиндрической кюветы с парами натрия составляла 20 см, а диаметр — 2,3 см.

Как видно из графиков а, б, в на рисунке, в эксперименте наблюдается экспоненциальный спад заселенности $3P_{3/2}$ -уровня по мере увеличения времени задержки τ . При этом в зависимости от температуры среды наблюдается изменение эффективного времени спада τ_0 . С увеличением температуры, а следовательно, и плотности среды N , τ_0 уменьшается и составляет (см. рисунок): а) $\tau_0 = 1650 \pm 180$ нс при $N \approx 2,85 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$ (300°C)

б) $\tau_0 = 1285 \pm 150$ нс при $N \approx 5,25 \cdot 10^{14}$ см⁻³ (320°C) и в) $\tau_0 = 900 \pm \pm 60$ нс при $N \approx 10^{15}$ см⁻³ (340°C). Как следует из приведенных результатов, τ_0 уменьшается линейно с $\ln N$. Аналогичные результаты получены для уровня $3P_{1/2}$.

Таким образом, экспериментально найдено, что эффективное время жизни уровней $3P_{1/2, 3/2}$ Na в интервале плотностей среды $N \approx 2,5 \cdot 10^{14} - 10^{15}$ см⁻³ намного превышает спонтанное время распада (16 нс). Очевидно, что данное увеличение эффективного времени жизни первого возбужденного уровня Na связано с эффектом пленения резонансного излучения. Об этом также свидетельствует тот факт, что небольшое перпендикулярное смещение кюветы с парами натрия относительно траектории лазерных лучей приводит к заметному изменению значения τ_0 . По всей видимости в исследуемой области температур понижение значения τ_0 с ростом температуры связано с повышением вероятности столкновений, в которых участвуют возбужденные атомы, что и ведет к уменьшению эффективных времен жизни.

ЛИТЕРАТУРА

1. Holstein T. Phys. Rev., 72, 1220 (1947).
2. Биберман А. М. ЖЭТФ, 17, 416 (1947).
3. Korystynska A., Kowalczyk P. Opt. Commun., 25, 351 (1978).
4. Zemansky M. W. Phys. Rev., 29, 513 (1927).
5. Wieman C., Hansch T. W. Phys. Rev. Lett., 36, 1170 (1976).
6. Арutyунян В. М. и др. ЖЭТФ, 68, 44 (1975).

ՊՈԼԱՐԻՄԵՏՐԻԿ ՄԵԹՈԴՈՎ $3P_{1/2, 3/2}$ ԳՐԳՈՎԱՄ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ
ՌԵԼԱքՍԱՑԻԱՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՏՈՄԱԿԱՆ Na-ի
ԽԻՏ ԳՈԼՈՐՇԻՆԵՐՈՒՄ

Վ. Մ. ԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Ա. Ռ. ԱՐԱՄՅԱՆ, Ս. Պ. ԻՇԿԱՆՅԱՆ,
Ա. Ա. ԼԱԼԱՅԱՆ, Թ. Ա. ՓԱՓԱԶՅԱՆ

Հետազոտված է Na-ի $3P_{1/2, 3/2}$ մակարդակների ապազրգուման էֆֆեկտիվ ժամանակի կախումը միջավայրի խտությունից: Խտությունների $2,85 \cdot 10^{14} - 1 \cdot 10^{15}$ սմ⁻³ ինտերվալում դիտվում է եղված ժամանակների կարճացում Na-ի խտության մեծացմանը զուգընթաց:

POLARIMETRICAL INVESTIGATION OF RELAXATION TIMES OF $3P_{1/2, 3/2}$ EXCITED LEVELS IN DENSE VAPORS OF ATOMIC SODIUM

V. M. ARUTYUNYAN, A. R. ARAMYAN, S. P. ISHKHANYAN,
A. A. LALAYAN, T. A. PAPAZYAN

The dependence of effective decay times of $3P_{1/2, 3/2}$ levels of Na on the density of medium was investigated. The decrease in these times with the increase of sodium vapour density was detected in the $2.85 \cdot 10^{14} - 1 \cdot 10^{15}$ cm⁻³ density range.