УДК 621.373.82

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ФАЗОВАЯ САМОМОДУЛЯЦИЯ
В КВАЗИРЕЗОНАНСНЫХ СРЕДАХ

Г. Г. ГРИГОРЯН, М. Л. ТЕР-МИКАЕЛЯН, Г. А. ТОРОСЯН

Институт физических исследований НАН Армении

(Поступила в редакцию 19 августа 1993 г.)

Теоретически и экспериментально исследуется коническое излучение, возникающее на малых оптических длинах при распространении ультракоротких импульсов в двух- и трехуровневых квазирезонансных средах.

О так называемом «коническом излучении», возникающем в нелинейных средах, сообщалось во многих работах, начиная с 70-х годов. Механизмы, вызывающие это излучение, столь разнообразны, что конкретная интерпретация результатов эксперимента часто оказывается затруднительной. Причиной возникновения конического излучения могут быть процессы 4-х волнового смещения [1—3], самофокусировки [4], трехфотонного рассеяния [5], оптического черенковского излучения [6—7] и т. д. (см., например, обзор [8]).

Самый простой, но практически не исследованный механизм возникновения конического излучения обусловлен фазовой самомодуляцией [9], которая приводит к коническому излучению даже на сравнительно малых оптических длинах, когда перечисленные выше процессы еще не существенны.

Ограничимся для простоты вычислений линейно-поляризованным импульсом вида

$$E = \mathcal{E}(r, t) \exp[i(k_0 x - \omega_0 t + \varphi_0)] + \text{к.с.} \quad (1)$$

Здесь ω_0 , k_0 , φ_0 — частота, волновой вектор и фаза импульса на входе в среду, $\mathcal{E}$ — действительная огибающая импульса, ось x выбрана вдоль направления вектора k_0 . При прохождении в нелинейной среде импульс приобретает дополнительную фазу φ , обусловленную нелинейным показателем преломления. Это приводит как к смещению несущей частоты $\omega = \omega_0 + d\varphi/dt$, так и к изменению волнового вектора $k = k_0 + d\varphi/dr$. В газовых средах сравнительно простые модели двух- и трехуровневых систем дают возможность детально проанализировать этот процесс.

Для ультракороткого импульса, обладающего цилиндрической симметрией относительно оси распространения x , набег фазы в непоглощающей среде без дисперсии будет [10]:

$$\varphi = \frac{2\pi\omega_0 x}{c} \mathcal{P}(\rho, \tau), \quad (2)$$

где $\mathcal{P}$ — амплитуда поляризованности среды, которая для атомарных газов может быть вычислена непосредственно из уравнения Шредингера, $\tau = l - x/c$, $\rho^2 = y^2 + z^2$. Отметим, что модель непоглощающей среды без дисперсии соответствует адиабатическому приближению.

Как видим, производная $\partial\varphi/\partial\rho$ в общем случае отлична от нуля и, следовательно, у волнового вектора $\mathbf{k}$ появляется поперечная компонента k_x , что вызывает пространственно-угловое перераспределение излучения.

Пространственно-угловое распределение импульса будет описываться Фурье-преобразованием:

$$\mathcal{E}_k = \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{E}(\rho, \tau) e^{i(\varphi(\rho, \tau) - k_x \rho)} d\rho. \quad (3)$$

Функция $\mathcal{E}_k$ существенно отлична от нуля при тех значениях k_x , при которых показатель экспоненты минимален, т.е. в точках перегиба функции $\varphi(\rho, \tau)$ ($\partial^2\varphi/\partial\rho^2 = 0$) для $k_x = \partial\varphi/\partial\rho$ [11]. Таким образом, когда набег фазы в среде $\varphi < 2\pi$, основное излучение будет концентрироваться по образующей конуса, угол полураствора которого определяется из условия (см. рис. 1):

$$\operatorname{tg}\theta = k_x/k_x, \text{ где } k_x = \omega/c + \partial\varphi/\partial x. \quad (4)$$

Рис. 1 Угловое распределение $|E(k)|^2$ гауссовского импульса. а) на входе в среду; б) набег фазы $= 0,8 \cdot 2\pi$; в) набег фазы $= 1,6 \cdot 2\pi$.

Максимум спектрального распределения излучения, идущего по образующей конуса, будет смещен от начального значения ω_0 на величину $\partial\varphi/\partial\tau$ ($\tau = \tau_0$), где τ_0 — точка перегиба функции $\varphi(\tau)$.

Ситуация усложняется, если набег фазы в среде превосходит 2π . На огибающей импульса всегда существуют точки, в которых $\partial\varphi/\partial\rho$ одинаковы, т. е. одинаковы k_r . Если разность фаз между этими точками кратна π , то внутри основного конуса излучения возникает интерференционная картина, число колец которой может быть оценено из соотношения $N \sim \varphi/2\pi$. Подобная четкая интерференционная картина наблюдалась в жидких кристаллах [9].

Для двухуровневой среды угол полураствора конуса, вычисленный согласно (2)–(4), будет:

$$\theta = \frac{2\pi N d^2 x}{\hbar(\delta^2 + 4d^2 \mathcal{E}^2/\hbar^2)^{3/2}} \frac{\partial}{\partial \rho} \frac{4d^2 \mathcal{E}^2}{\hbar^2} (\rho = \rho_0). \quad (5)$$

Здесь N —плотность атомов, d —модуль дипольного момента атома, δ —расстройка резонанса, ρ_0 —точка перегиба функции $\mathcal{E}$.

Таким образом, величина угла не зависит от знака расстройки резонанса, но увеличивается с её уменьшением или с увеличением оптической длины Nd^2x и напряженности поля $\mathcal{E}$. В то же время, при больших нелинейностях $\alpha = (2\mathcal{E}d/\hbar\delta)^2 > 2$, величина угла θ начинает убывать с ростом α , стремясь к нулю при $\alpha \rightarrow \infty$ (самопросветленные среды).

В трехуровневой среде при распространении двух импульсов, частоты которых связаны условием двухфотонного резонанса, на каждой из накачек будут формироваться свои конусы излучения, углы полурастворов которых будут определяться следующими выражениями:

$$\theta_1 = \left| \frac{2\pi N d_1^2 x}{\hbar \delta_1 R^{3/2}} \left[(1 + I_1 - I_2) \frac{\partial I_2}{\partial \rho} - 2I_2 \frac{\partial I_1}{\partial \rho} \right] \right|, \quad (5)$$

$$\theta_2 = \left| \frac{2\pi N d_2^2 x}{\hbar \delta_2 R^{3/2}} \left[(1 + I_1 - I_2) \frac{\partial I_1}{\partial \rho} + 2I_1 \frac{\partial I_2}{\partial \rho} \right] \right|. \quad (6)$$

$$R^{3/2} = (1 + I_1 - I_2)^2 + 4I_1 I_2.$$

(Для вычисления амплитуды поляризованности среды были использованы результаты работы [12]). Здесь δ_1, δ_2 —однофотонная и двухфотонная расстройки резонансов, $\delta_1 = \omega_{21} - \omega_1$, $\delta_2 = \omega_{31} - \omega_1 - \omega_2$, d_i —модули дипольных моментов переходов между уровнями 1–2, 2–3 соответственно, $I_i = \mathcal{E}_i^2 d_i^2 / \hbar^2 \delta_i$. Производные по ρ берутся в точках перегибов функций $\mathcal{E}_1(\rho)$, $\mathcal{E}_2(\rho)$.

В случае вырожденной накачки, когда $\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2 = \mathcal{E}$, $\omega_1 = \omega_2 = \omega$, имеем один конус, угол которого равен

$$\theta = \left| \frac{4\pi N d_1^2 d_2^2 x}{\hbar^3 \delta_1^2 \delta_2 R^{3/2}} \frac{\partial \mathcal{E}^2}{\partial \rho} (\rho = \rho_0) \right|. \quad (7)$$

Экспериментально исследовалось распространение пикосекундных импульсов вблизи двухфотонного резонанса в парах атомов цезия (вырожденная накачка) и бария (невыврожденная накачка). В случае вырожденной накачки (переход $6S_{1/2} - 7S_{1/2}$ в атомах цезия,

$\lambda \sim 1,0796$ мкм) использовался лазер на $Nd^{3+}:YAlO_3$. Одноточный импульс длительностью 25 ± 5 псек и спектральной шириной ~ 2 см $^{-1}$ телескопировался до диаметра 1 мм и направлялся в Т-образную кювету с парами цезия. Длина кюветы составляла 25 см, а окна были изготовлены из кристаллического лейкосапфира и ориентированы так, чтобы избежать двулучепреломления. Энергия импульсов составляла 3 мдж. В эксперименте изменялось давление паров цезия, начиная с 10^{16} ат/см 3 и выше. Однофотонная расстройка резонанса составляла $\delta_1 = 2500$ см $^{-1}$, а двухфотонная — $\delta_2 = 15$ см $^{-1}$. При плотности атомов $N \sim 10^{16}$ ат/см 3 основная часть излучения, покидающего кювету, распространялась по конусу, угол полураствора которого составлял $1,8 \pm 0,1$ мрад (начальная расходимость пучка была $0,9 \pm 0,1$ мрад). В центре конуса при этом наблюдался провал. Набег фазы при этих значениях параметров, вычисленный согласно формуле (2), будет $0,8 \cdot 2\pi$. При увеличении плотности паров до $2 \cdot 10^{16}$ ат/см 3 угол полураствора конуса увеличивается вдвое, кольцо четко вырисовывалось, а внутри конуса появлялось центральное пятно (набег фазы при этом составляет $1,6 \cdot 2\pi$). Дальнейшее увеличение приводило к возникновению второго кольца, а максимальное число колец, заре-

Рис. 2. Поперечное сечение гауссовского пучка после прохождения кюветы с парами атомов цезия, $N > 2 \cdot 10^{16}$ ат/см 3 .

гистрированное в этом эксперименте, было 4 (рис. 2). При этом угловые размеры внешнего кольца превосходили 5 мрад.

В этом эксперименте было зарегистрировано уширение спектра накачки, обусловленное фазовой самомодуляцией, которое составляло более 8 см $^{-1}$.

В эксперименте с парами атомов бария в качестве накачек использовались первая и вторая гармоники пикосекундного перестраиваемого лазера на фосфатном стекле с неодимом, настроенного вблизи $\lambda = 1,062$ мкм. Энергии импульсов составляли ~ 1 мдж (первая гармоника) и $\sim 0,06$ мдж (вторая гармоника). Длительности импульсов

были порядка 15 ± 3 псек, а спектральная ширина $\sim 2 \text{ см}^{-1}$. Оба излучения были поляризованы в одной плоскости и линзой с $F=1$ м фокусировались в кювету с охлаждаемыми окнами. Эффективная длина нагреваемой зоны, вдоль которой обеспечивалась плотность атомов бария 10^{16} ат/см^2 , составляла 20 см. В эксперименте изменялась расстройка резонанса варьированием длины волны лазерного излучения.

Кольцевая структура импульсов стабильно наблюдалась как на первой, так и на второй гармонике при значениях двухфотонной расстройки резонанса, лежащих в диапазоне от $+30 \text{ см}^{-1}$ до -30 см^{-1} , независимо от знака расстройки. Радиусы колец возрастали с уменьшением расстройки двухфотонного резонанса, а при расстройках, больших, чем 30 см^{-1} , кольцевая структура пропадала. Уширение частотного спектра накачки в этом эксперименте составляло $\sim 5 \text{ см}^{-1}$.

В заключение авторы выражают благодарность Д. Г. Саркисяну за полезные дискуссии и помощь, оказанную в постановке эксперимента.

Частичное финансирование работы было выполнено за счет Американского физического общества.

ЛИТЕРАТУРА

1. A. C. Tam. Phys. Rev., A19, 1971 (1979).
2. D. Kleiber, K. Burnett, J. Cooper. Phys. Rev., A25, 1188 (1982).
3. A. Plekhanov, S. Rautian et al. Sov. Phys.—JETP, 61, 249 (1985).
4. D. Grishkowsky. Phys. Rev. Lett., 24, 866 (1970).
5. M. Rosenbluk, J. Shevy. J. Opt. Soc. Am., 85, 116 (1988).
6. I. Golub, R. Shuker, G. Erez. J. Phys., B19, 115 (1988).
7. Г. Г. Григорян, Б. В. Крыжановский. Оптика и спектроскопия, 67, 435 (1987).
8. M. Greshaw, C. Cantrell. Phys. Rev., A39, 126 (1989).
9. S. Durbin, S. Arakellian, J. Shen. Opt. Lett., 6, 411 (1981).
10. В. М. Арутюнян, Н. Н. Бадалян и др. ЖЭТФ, 58, 37 (1970).
11. А.Эрдейи. Асимптотические разложения. М., Мир, 1974.
12. Г. Г. Григорян, Д. Ю. Меликджанов, М. Л. Тер-Микаэлян. Оптика и спектроскопия, 69, 998 (1989).

ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՖԱԶԱՅԻՆ ԻՆՔՆԱՄՈՂՈՒՄԻՆՍԸ ՔՎԱԶԻՐԵԶՈՆԱՆՍԱՅԻՆ ՄԻԶԱՎԱՅՐՈՒՄ

Գ. Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Մ. Լ. ՏԵՐ-ՄԻԿԱԵԼՅԱՆ, Գ. Ա. ԹՈՐՈՍՅԱՆ

Դիտարկվում է կոնային ճառագայթումը, որը առաջանում է երկու և երեք մակարդակային միջավայրերով գերկարճ իմպուլսների տարածման ընթացքում:

SPACE PHASE SELF-MODULATION IN QUAZIRESONANT MEDIUM

G. G. GRIGORIAN, M. L. TER-MIKHAELIAN, G. A. TOROSIAN

The conical emission appearing on short optical lengths during nearly resonant laser pulse propagation through the atomic vapor is studied both theoretically and experimentally.