СПЕКТРОСКОПИЯ ИОНОВ Er^{3+} В МОНОКРИСТАЛЛАХ
МОЛИБДАТА СВИНЦА

Н. Р. АГАМАЛЯН, С. М. КАРАГЕЗЯН, Р. Б. КОСТАНИАН

Институт физических исследований НАН Армении

(Поступила в редакцию 16 июня 1993 г.)

Исследованы оптические спектры монокристаллов $PbMoO_4:Er^{3+}$ при 77 и 300К, идентифицированы оптические переходы ионов Er^{3+} в кристаллах, получена экспериментальная схема штарковского расщепления нижайших мультиплетов ионов Er^{3+} .

Кристаллы молибдата свинца относятся к известному ряду монокристаллов со структурой шеелита XMO_4 ($X=Pb, Ca, Ba, \dots, M=Mo, W$), вызывающему большой интерес из-за многообразия физических свойств [1—5]. Они используются в акусто-оптических устройствах, как люминофоры в желто-голубой области спектра, а также перспективны в качестве материалов для твердотельных лазеров видимого и ИК-диапазонов.

В настоящей работе проводились спектроскопические исследования примеси Er^{3+} в кристаллах молибдата свинца. Кристаллы со структурой шеелита (пр. гр. $14_1/a-C_{4h}^6$) относятся к тетрагональной сингонии и являются одноосными. В работе использовались монокристаллы, выращенные методом Чохральского, шихтой служил молибдат свинца, синтезированный по керамической технологии. Примесь в расплав вводилась в виде Er_2O_3 с концентрацией от 0,1 до 1,2 ат. % Er . Образцы для исследования ориентировались относительно оптической C -оси. Для регистрации спектров поглощения и люминесценции использовались спектрофотометры СФ-8, Spexord M-40 и монохроматор МДР-4 с приемниками ФЭУ-100 и ФЭУ-62. Для возбуждения люминесценции применялись кварцевые лампы типа КГМ. Анализ штарковского расщепления нижайших мультиплетов ионов Er^{3+} в кристаллах молибдата свинца проводился по спектрам поглощения и излучения, измеренным при температурах 77 и 300 К в спектральной области от 0,350 до 2 мкм. Для регистрации поляризованных спектров пропускания использовалась призма Глана-Томпсона.

На рис. 1 представлены обзорные спектры пропускания кристаллов $PbMoO_4:Er^{3+}$ при 300 К, зарегистрированные в поляризованном свете для двух направлений оптической C -оси кристалла. Пунктирная линия соответствует случаю, когда оптическая C -ось перпендикулярна вектору E световой волны (σ -компонента), сплошная — параллельна E (π -компонента). На рисунке заметно некоторое смещение УФ края поглощения кристаллов молибдата свинца для σ -ком-

полюсы в длинноволновую область по сравнению с π -компонентой. Интенсивность линий оптических переходов ионов Er^{3+} в $PbMoO_4$ зависит от ориентации векторов E световой волны относительно оп-

Рис. 1. Поляризованные спектры пропускания кристаллов $PbMoO_4:Er^{3+}$ при 300 К. Пунктирная линия соответствует π -компоненте, сплошная — σ -компоненте.

тической C -оси кристалла. Эта анизотропия наблюдается как в спектрах поглощения, так и люминесценции.

Для определения штарковской структуры уровней основного $^4I_{15/2}$ и $^4S_{3/2}$ мультиплетов ионов Er^{3+} использовались абсорбционные спектры переходов $^4I_{15/2} \rightarrow ^4S_{3/2}$. На рис. 2 представлены спектры поглощения кристаллов $PbMoO_4:Er^{3+}$ при 77 К для двух ориентаций оптической C -оси относительно направления распространения света и схема энергетических уровней мультиплетов $^4I_{15/2}$ и $^4S_{3/2}$, а также

Рис. 2. Спектры поглощения (переход $^4I_{15/2} \rightarrow ^4S_{3/2}$) света в при прохождении вдоль (а) и поперек (б) оптической C -оси кристалла и энергетическая схема уровней мультиплетов $^4I_{15/2}$ и $^4S_{3/2}$ (в) ионов Er^{3+} в кристаллах $PbMoO_4$ при 77 К.

Положение уровней указано в см⁻¹, переходы между ними — в Å.

переходы между ними. Цифрами на спектрах и энергетической схеме обозначены оптические линии и соответствующие им переходы между штарковскими уровнями двух мультиплетов. Значения четырех верхних штарковских уровней основного мультиплета $^4I_{15/2}$ (на рисунке они заключены в скобки) удалось определить только из измерений проведенных при 300 К с привлечением спектров излучения, соответствующих переходу $^4S_{3/2} \rightarrow ^4I_{15/2}$. Из-за сильного уширения спектральных линий определение их положения затруднено. Поэтому звездочками на схеме показаны уровни, значения которых требуют уточнения. Квадратными скобками на спектрах показаны штарковские расщепления нижних уровней основного мультиплета $^4I_{15/2}$. Сильная ориентационная зависимость интенсивности спектральных линий требует проведения поляризационных измерений.

Штарковская структура энергетических уровней мультиплетов $^4I_{15/2}$ и $^4I_{11/2}$ определялась из абсорбционных спектров переходов $^4I_{15/2} \rightarrow ^4I_{9/2, 11/2}$. На рис. 3 и 4 представлены ориентационные спектры поглощения этих переходов ионов Er^{3+} в кристаллах $PbMoO_4$ при 77 К, а также схемы энергетических уровней мультиплетов $^4I_{9/2}$ и $^4I_{11/2}$. Обозначения такие же, как на рис. 2. Положение нижнего уровня

Рис. 3. Спектры поглощения (переход $^4I_{15/2} \rightarrow ^4I_{9/2}$) при прохождении света вдоль (а) и поперек (б) оптической *C*-оси кристалла и энергетическая схема уровней мультиплетов $^4I_{15/2}$ и $^4I_{9/2}$ (в) ионов Er^{3+} в кристаллах $PbMoO_4$ при 77 К. Обозначения как на рис. 2.

мультиплета $^4I_{9/2}$ из абсорбционных измерений при 77 К определить не удалось. На схеме он показан пунктирной линией.

Отметим, что полученные в настоящей работе результаты спектрального анализа кристаллов $PbMoO_4:Er^{3+}$ находятся в хорошем согласии с аналогичными данными для известных лазерных кристаллов $CaWO_4:Er^{3+}$ [5] и $LiYF_4:Er^{3+}$ [6], имеющих подобную же кристаллическую структуру.

Рис. 4. Спектры поглощения (переход $^4I_{15/2} \rightarrow ^4I_{11/2}$) при прохождении света вдоль (а) и поперек (б) оптической С-оси кристалла и энергетическая схема уровней мультиплетов $^4I_{15/2}$ и $^4I_{11/2}$ (в) ионов Er^{3+} в кристаллах $PbMoO_4$ при 77 К. Обозначения как на рис. 2.

ЛИТЕРАТУРА

1. W. Van Loo. Phys. Stat. Sol. (a) 27, 565 (1975).
2. W. Bollman. Kristall und Technik, 15, 367 (1980).
3. Е. Г. Реут. Известия АН СССР, серия физическая, 49, 2032 (1985).
4. Р. Балтрамеюнас, В. Гаврюшин, Г. Рачукйтис, Г. Пузонас, А. Казлаускас, Ш. Эфендиев, Н. Дарвишов, В. Багиев. ФТТ, 31, 805 (1989).
5. D. E. Wortman. J. Chem. Phys., 54, 314 (1971).
6. М. В. Петров, А. М. Ткачук. Опт. и спектр., 45, 147 (1978).

SPECTROSCOPY OF Er^{3+} IONS IN LEAD MOLYBDATE SINGLE CRYSTALS

N. R. AGAMALYAN, S. M. KARAGEZYAN, R. B. KOSTANYAN

The optical spectra of $PbMoO_4:Er^{3+}$ single crystals at 77 and 300K are investigated, the optical transitions of Er^{3+} ions in the crystals are identified and the experimental scheme of Stark splitting of Er^{3+} ions lowest multiplets are obtained.