УДК 537.531

ЦИКЛИЧЕСКИЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ МОНОЛИТНЫЕ ФОКУСИРУЮЩИЕ МОНОХРОМАТОРЫ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ

А.М. РОСТОМЯН¹, Е. ВЬЮРГЕС², В. ГРАЕФФ², Г. МАТЕРЛИК²

¹ Ереванский государственный университет

² DESY-HASYLAB, Гамбург, Германия

(Поступила в редакцию 7 июля 1999 г.)

Исследованы монокристаллические четырехблочные германиевые рентгеновские циклические фокусирующие монохроматоры с высоким разрешением. Приведены экспериментальные данные, полученные при их апробации с помощью синхротронного рентгеновского излучения.

Монокристаллические четырехблочные германиевые рентгеновские циклические монохроматоры (ЦМХ) с высоким разрешением предназначены для использования в разных задачах рентгеновской когерентной оптики. Эти системы подробно описаны в работах [1-3], где они опробованы с помощью обычной рентгеновской трубки с характеристической линией $\text{CoK}_{\alpha 1}$. Здесь мы вкратце опишем основные принципы работы ЦМХ и приведем экспериментальные данные, полученные при их апробации с помощью синхротронного рентгеновского излучения на выходной линии пучка E2 (RÖEMO1) ускорителя DORIS в DESY/HASYLAB (Гамбург, Германия) [4].

Принцип работы ЦМХ основан на последовательных отражениях определенной длины волны от всех блоков ЦМХ с максимальным коэффициентом отражения от всех блоков, при которых пучок поворачивается на 360° за каждый цикл (рис.1). Здесь возможно получить последовательные циклы, а также изменить направление пучка на обратное. С помощью асимметричных отражений ЦМХ могут быть настроены на разные длины волн и может быть достигнута автофокусировка циркулирующего пучка. Входное и выходные окна ЦМХ прорезаны на противоположных блоках, позволяя выходящему пучку распространяться в направлении падающего [5-6].

Для определения общего параметра асимметричности ЦМХ (параметр фокусировки) $\Gamma = (-1)^{\omega} \prod_{n=1}^{\omega} \gamma_n^{-1}$ был применен метод фотографической регистрации (γ_n является параметром асимметрии n -ого блока; $n = 1, 2, \dots, \omega$). Были измерены ширины Δl выходных пучков и их относительные сдвиги на разных дистанциях.

Рис.1. Общий вид двух асимметричных германиевых монокристаллических 4-блочных циклических монохроматоров (ЦМХ_а и ЦМХ_б) и ход автофокусирующихся в них лучей. Δl_0 — ширина входного пучка, Δl_4 и Δl_8 — ширины выходящих из ЦМХ пучков соответственно после первого и второго циклов.

Полученные экспериментальные (экс.1,2,3) и теоретические (теор.) результаты следующие: а) $\Gamma_a^{\text{экс}} = 0,0082$, где $\Gamma_a^{\text{теор}} = 0,0077$, б) $\Gamma_b^{\text{экс}(1)} = 0,180$; $\Gamma_b^{\text{экс}(2)} = 0,204$; $\Gamma_b^{\text{экс}(3)} = 0,206$, где $\Gamma_b^{\text{теор}} = 0,194$.

Угловые распределения интенсивностей выходящих пучков, соответствующих разным энергиям в интервале от 6929,7 eV до 6930,2 eV, с интервалами 0,05 eV измерены с использованием кристалла-анализатора германия с симметричными (220) отражениями.

Была измерена интегральная интенсивность $I(\lambda) = \int I(\theta, \lambda) d\theta$ вы-

ходящего пучка, соответствующего каждой падающей фиксированной длине волны. Данные для ЦМХ₅ после одного цикла приведены на рис.2. Экспериментально регистрируемая спектральная ширина $\Delta\lambda = (10 \pm 0,5) \cdot 10^{-5} \text{ \AA}$ выходящего пучка с полушириной пика $\Delta\lambda_{1/2} = 4,7 \cdot 10^{-5} \text{ \AA}$ (гауссиан) или $\Delta\lambda_{1/2} = 5,8 \cdot 10^{-5} \text{ \AA}$ (лоренциан), согласуется с теоретически полученными результатами $9,6 \cdot 10^{-5} \text{ \AA}$ и $5,2 \cdot 10^{-5} \text{ \AA}$, соответственно.

Рис.2. Регистрируемая интегральная интенсивность $I(\lambda)$ для разных значений длин волн.

Наши исследования показали, что используя такие рентгеновские циклические монохроматоры, можно получить монохроматизированные пучки с очень узкой спектральной шириной, что в конечном счете может привести к разработке нового типа рентгеновского резонатора [7].

ЛИТЕРАТУРА

1. А.Г.Ростомян, П.А.Безирганян. ДАН СССР, 238, №1, 73 (1978).
2. А.Г.Ростомян, П.А.Безирганян. А.с. 714506 (СССР), БИ, 1980, №5.
3. А.Н.Ростомян, Р.Н.Безирганян, А.М.Ростомян. Phys. Stat. Sol.(a), 116, 483 (1989).
4. А.М.Ростомян, J.Wuerges, W.Graeff, and G.Materlik. Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburger Synchrotronstrahlungslabor HASYLAB, Annual Report Part-I, 995 (1997).
5. А.М.Ростомян, А.Н.Ростомян, Р.Н.Безирганян. Phys. Stat. Sol.(a), 116, 493 (1989).

6. A.H.Rostomyan, A.M.Rostomyan. Phys. Stat. Sol.(a), 126, 29 (1991).
7. A.H.Rostomyan, A.M.Rostomyan. Phys. Stat. Sol.(a), 168, №5, 5 (1998).

ՄԵՐ ԼՈՒՐՈՂ ՈՒԺ ՈՒՆԵՅՈՂ ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ ՄԻԱՉՈՒՅԼ ՑԻԿԼԱՅԻՆ
ՖՈԿՈՒՍԱՑՆՈՂ ՍՈՆՈԲՐՈՍԱՏՈՐՆԵՐ

Ա.Մ.ՌՈՍՏՈՄՅԱՆ, ՅՆ.ՎՅՈՒՐԳԵՍ, Վ.ԳՐԱԵՖ, Գ.ՄԱՏԵՐԼԻԿ

Ուսումնասիրված են մեծ լուծող ուժ ունեցող ռենտգենյան միաձույլ քառաբլոկ գերմանիումե ցիկլային ֆոկուսացնող մոնոքրոմատորներ: Բերված են փորձնական տվյալներ, որոնք ստացվել են ռենտգենյան սինքրոտրոն ճառագայթման օգնությամբ:

CYCLIC X-RAY MONOLITHIC HIGH-RESOLUTION
FOCUSING MONOCHROMATORS

A.M. ROSTOMYAN, J. WUERGES, W. GRAEFF, G. MATERLIK

X-ray high-resolution monolithic four-block germanium cyclic focusing monochromators are studied. Experimental data obtained with the help of synchrotron X-ray radiation are presented.