

Կ Ա Թ Ի Ա Կ Ո Ա Ն Ե Ր

Մանուկներու ակոյայ հանելու շրջանը շատ մը հոգեր կը պատճառէ մայրերուն: Ուշ կ'ելլեն, ծուռ կը բուսնին, անհանդու-տութիւններ կը պատճառեն եայլն: Սովորաբար առողջ և մօր կաթով դիեցուած մանուկներու մօտ ամէն ինչ բնական կ'ընթանայ: Իսկ տկարակազմ և արուեստական դիեցումով մեծցած մանուկները բաւական նեղութիւն կը պատճառեն իրենց ծնողքին:

Բնականոն պայմաններու տակ առաջին ակոյաները — ստորին ծնօտի միջին հատուները—երեւան կուգան 6 — 8-րդ ամիսներուն մէջ: Հետզհետէ կը բուսնին վերին ծնօտի մէջտեղի հատուները (8 — 10-րդ ամիսներուն), ստորին քովնտի հատուները (8 — 10-րդ ամիս.), ստորին և վերին քովնտի փոքր աղօրիքները (12 — 18-րդ ամ.), ստորին և վերին ժանիքները 12 — 20-րդ ամ. և ստորին ու վերին ետևի աղօրիքները 22 — 30-րդ ամիսներուն: Ընդամէնը 20 հատ են և կը կոչուին կաթի կամ ժամամակաւոր ակոյաներ որովհետեւ եօթ տարեկանէն սկսեալ կը թափին, աւելի մեծ, հաստատ և տոկուն ակոյաներու տեղի տալու համար:

Ակոյաները կրնան դժուարութեամբ բուսնիլ: Մանուկին լին-տերը կը գրգռուին ու կը բորբոքին: Եթէ այս վիճակը երկար տեէ, կ'ազդէ մանկան ընդհանուր վիճակին վրայ: Նորածինը, ցաւերու հետեանքով չի քնանար, կուլայ, կը պոռայ, երբեմն ալ ջերմութիւն կ'ունենայ: Երբ ակոյան լինտէն դուրս գայ, ամէն ինչ կարգի կը մտնէ:

Ակոյահանումի ատեն մանուկը խածնելու պէտքը կ'զգայ և ամէն ինչ բերանը կը տանի: Շատ մը մայրեր ալ անոնց լացը կտրելու և իրր թէ ակոյայի բուսնելը դիւրացնելու համար առարկաներ կուտան ծծելու, ինչ որ առնուազն անօգուտ է և երբեմն կրնայ վնասակար ըլլալ:

Կաթի ակոյաները, թէև ժամանակաւոր, սակայն փտումի պա-րագային նոյնքան խնամքի պէտք ունին որքան մնայունները: Ծնողները սխալ կ'ընեն կարևորութիւն չտալով այս կէտին, որով-հետև փտած ակոյաները ոչ միայն կրնան տեղական բարդութիւններ պատճառել այլ նաև մանկան ընդհանուր վիճակին վրայ ազդել:

Փոքր տարիքէն պէտք է մանկան ակոյաները խնամել և անոր սորվեցնել պէտք եղած խնամքը:

ՍԵՂԻՍԿԻ ՈՍԿԵԱՆ

(Ատամնաբայժ)