

А. А. НЕРСЕСЯН

НОВЫЙ ПОДВИД *KOELERIA ALBOVII* DOMIN SUBSP. *LORIENSIS* (POACEAE) ИЗ АРМЕНИИ

Описывается новый для науки подвид *Koeleria albovii* Domin subsp. *loriensis* Nersesjan, являющийся эндемиком Армении.

Երևանի Ա. Ն. *Koeleria albovii* Domin subsp. *loriensis* (Poaceae) նոր ենթատեսակի նշանակումը: Նկարագրվում է գիրություն համար նոր ենթատեսակի ենթատեսակի *Koeleria albovii* Domin subsp. *loriensis* Nersesjan.

Nersesjan A. A. *Koeleria albovii* Domin subsp. *loriensis* (Poaceae), a new subspecies from Armenia. *Koeleria albovii* Domin subsp. *loriensis* Nersesjan is described as an endemic subspecies new to science.

В процессе подготовки обработки рода *Koeleria* для 11 тома «Флоры Армении» среди образцов, относящихся к *K. albovii* Domin, мною был выделен в новый подвид ряд экземпляров из Северной Армении и Зангезура, обладающих комплексом признаков, отличающих их от всех трех подвидов (subsp. *albovii*, subsp. *fominii* (Domin) Tzvelev, subsp. *caucasica* (Domin) Tzvelev), представленных в Армении.

Koeleria albovii Domin subsp. *loriensis* Nersesjan, subsp. nov.

Culmi (50) 60–100 cm alti, basi 2–3.5 mm crassi, vaginis foliorum emortuorum rigidiusculis, integris, 3–7 mm latis induti. Folia caulina extus glabra, rarius ex parte pilis brevibus (ad 0.3 mm longis) inconspicuis tecta, vaginis caulem plerumque laxè amplectentibus, laminis planis, rarius leviter convolutis, 2–4 mm latis, margine rite longe ciliato (ciliis propter exsiccationem saepe corruptis). Panícula (60) 70–120 (140) mm longa, 8–15 mm lata, a basi ad mediam partem vel ultra lobata. Glumae plerumque pubescentes.

Holotypus: Южн. отр. Мокрых гор. Верховья реки Дзорагет, Сарванчай, 2000 м, остепненный луг, 27.07.1952, Ахвердов и Мирзоева, ERE 161172.

Paratypi: Armenia: Калининский район. Лорийская равнина. Племсовхоз, остепненный луг на деградированных черноземах, 1600 м, 17.07.1952, Ахвердов и Мирзоева, ERE 161181; LE, TBI, W; Южн. отроги Чибухлинского хребта. В районе горы Аглаган II, 2100 м, на остепненных субальпийских лугах; 27.07.1952, Ахвердов, В. Г., ERE 161182–161184; Южн. отр. Чибухлинского хребта. Верховья реки Дзорагет. На остепненных субальпийских лугах, 1800 м, 27.07.1952, Ахвердов и Мирзоева, ERE 161185; Южн. отр. Мокрых гор. Верховья р. Дзорагет, на остепненных лугах, 1700 м, 24.07.1952, Ахвердов и Мирзоева, ERE 161368.

Habitatio: In pratis regionis montanae mediae et superioris, 1600–2300 (2600) m supra maris aequor.

Patria: In Armenia endemica.

Affinitas: Ab affini *K. albovii* subsp. *fominii* culmis plerumque altioribus, panucula longiore, a basi ad mediam partem vel ultra lobatis, foliis glabris vel inconspicue puberulis differt.

Стебли (50) 60–100 см выс., в основании 2–3.5 мм толщ., окруженные жестковатыми, цельными, широкими (3–7 мм шир.) влагалищами отмерших листьев. Стеблевые листья снаружи голые, реже частично покрытые очень короткими (до 0.3 мм дл.), мало заметными волосками; большей частью со свободно охватывающими стебель влагалищами; с плоскими, реже слабо свернутыми, 2–4 мм шир., по краю,

как правило, длиннореснитчатыми пластинками (при долгом хранении образцов реснички плохо сохраняются). Метелки (60) 70–120 (140) мм дл., 8–15 мм шир., снизу наполовину или более чем наполовину лопастные. Колосковые чешуи большей частью опушенные (Рис. 1).

Местообитание: В среднем и верхнем горном поясе, на высоте 1600–2300 (2600) м над ур. м. На лугах.

Распространение: Эндемик Армении: В. Ахур., Лори. (Джавахкский хр., Базумский хр., Лорийская равнина), Иджев. (Памбакский хр., у Севанского перевала), Занг. (г. Хуступ).

Родство: Подвид, близкий к *K. albovii* subsp. *fominii*, от которого отличается в целом более высокими стеблями, более длинными, до середины или чуть более чем наполовину лопастными метелками, голыми или с малозаметным опушением стеблевыми листьями.

Выражаю искреннюю благодарность Н. Н. Цвелеву (С.-Петербург) за консультацию и Dr. Prof. W. Greuter (Берлин) за помощь в составлении латинского диагноза.

Институт ботаники НАН РА, 0063, Ереван;
e-mail: anush_nersesjan@yahoo.com

Рис. 1. Голотип *Koeleria albovii* Domin subsp. *loriensis* Nersesjan

