

и поэтому пришлось прибегнуть к вентрикулотомии и иссечению подклапанных структур для создания удовлетворительной экспозиции. Обычно дефекты, сопутствующие аномалии Эбштейна, щелевидные, и их легко удается ушить. Но высокие мембранозные дефекты бывают больших размеров, что требует их пластического закрытия.

Таким образом, сложные формы аномалии Эбштейна, сочетающиеся с ДМЖП, имеют свои характерные особенности. Правильная диагностика в этих случаях возможна лишь при выполнении ангиокардиографии из правого предсердия и желудочка, что позволяет выявить наличие аномалии Эбштейна, а левая вентрикулография устанавливает характер межжелудочкового сообщения. Радикальная хирургическая коррекция сочетания аномалии Эбштейна с ДМЖП должна быть одномоментной.

Институт сердечно-сосудистой хирургии
им. А. Н. Бакулева

Поступила 4/V 1983 г.

Մ. Մ. ՄԱԽՄՈՒԴՈՎ, Ի. Ա. ՅՈՒՐԼՈՎ

ԷԲՇՏԵՅՆԻ ԱՆՈՄԱԼԻԱՆ, ԶՈՒԳԱԿՅՎԱԾ ՄԻՋՓՈՐՈՔԱՅԻՆ ՄԻՋՆԱՊԱՏԻ
ԴԵՖԵԿՏՈՎ ԵՎ ՆՐԱ ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ՇՏԿՈՒՄԸ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ
ՀԵՌԱԿԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՎ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Հոգնածում նկարագրված է միջփորոքային միջնապատի ղեֆեկտով զուգակցված էրշտեյնի անոմալիայի մի դեպք: Կատարված է զույգ արատների շտկում լավագույն հեռակա արդյունքով:

M. M. Makhmudov, I. A. Yurlov

Ebstein Anomaly Combined With the Ventricular Septal Defect and its Radical Operation With Good Remote Results

S u m m a r y

The case of the Ebstein anomaly, combined with the ventricular septal defect as described in the paper, when the correction of both defects has been carried out with positive remote results.

УДК 616.441—006.5—06:617.7—612.13

Ю. В. ЯНКАУСКЕНЕ

КРОВΟΣНАБЖЕНИЕ ГЛАЗ У БОЛЬНЫХ ТИРЕОТОКСИКОЗОМ
С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И БЕЗ НЕЕ

Вопрос о взаимоотношении кровоснабжения глаз и сердечной деятельности изучен недостаточно.

В связи с этим мы поставили перед собой задачу изучить гемодинамику глаз у больных тиреотоксикозом в зависимости от деятельности

сердечно-сосудистой системы. Обследовано 53 больных тиреотоксикозом, которые в течение 1982 г. лечились в эндокринологическом отделении Каунасской клиники при КМИ МЗ Литовской ССР. 17 больных было с легкой тяжестью тиреотоксикоза, 27—средней тяжестью, 9—с тяжелой формой заболевания. Возраст больных 23—59 лет. В зависимости от наличия явлений сердечной недостаточности больные были разделены на 2 группы: I—без явлений сердечной недостаточности (32 больных), II—с явлениями сердечной недостаточности (21 больной). Контрольная группа состояла из 30 здоровых лиц, возраст которых колебался от 19 до 58 лет.

Таблица 1

Сравнительные реоофтальмографические показатели
у больных тиреотоксикозом

Реоофтальмографические показатели	Контрольная группа	I группа	II группа
Анакротическая часть РОГ, сек	$0,22 \pm 0,04$	$0,19 \pm 0,02$	$0,21 \pm 0,04$
Дикротическая часть РОГ, сек	$0,55 \pm 0,09$	$0,50 \pm 0,03$	$0,53 \pm 0,09$
Величина d, %	$28,2 \pm 0,51$	$27,1 \pm 0,49$	$28,4 \pm 0,62$
Амплитуда РОГ, ом	$1,01 \pm 0,12$	$1,68 \pm 0,32$	$0,99 \pm 0,28$
Реографический коэффициент, %	$3,86 \pm 0,43$	$5,74 \pm 0,47$	$3,89 \pm 0,53$

Гемодинамика глаз исследовалась реоофтальмографическим методом по Л. А. Кацнельсону (1967).

При реоофтальмографическом исследовании получили качественные и количественные данные, которые позволяют изучать кровоток, регистрировать объемные изменения сосудов глаз во время сердечного цикла.

У больных I группы реоофтальмограммы (РОГ) были с крутым подъемом, заостренными вершинами. Из табл. 1 видно, что временные показатели укорочены при сравнении с контрольной группой ($P < 0,01$), однако амплитудные показатели увеличены ($P < 0,05$). Это можно расценить как проявление компенсаторно-приспособительных реакций организма, направленных на усиление кровоснабжения тканей. Реоофтальмографические волны у больных II группы были плоскими, со сглаженными деталями. У 11 больных волны были нерегулярными из-за нарушения ритма сердца. Временные реоофтальмографические показатели мало отличались от контрольной группы ($P < 0,05$). Амплитудные показатели—уменьшены ($P < 0,05$). Данные показывают, что, кровенаполнение глаз у больных этой группы резко снизилось. Это обусловлено истощением метаболического резерва сердца в условиях прогрессирующей гемодинамической перегрузки и выключением компенсаторных возможностей.

Каунасский медицинский институт,
МЗ Литовской ССР

Поступила 17/VII 1983 г.

**ԹԻՐԵՆՏՈՔՍԻԿՈԶՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ ԱԶՔԻ ԱՐՑԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ
ՄՐՏԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ
ԴԵՊՔՈՒՄ**

Ա. մ փ ո փ ո լ մ

Սրտային անբավարարությամբ և առանց նրա թրեհոտոքսիկոզով հիվանդների մոտ անց է կացվել ռենոֆթալմոգրամաների քանակական և որակական վերլուծություն: Հաստատված է ռենոֆթալմոգրաֆիկ տվյալների կախվածություն սիրտ-անոթային համակարգի գործունեությունից արդարեւ հիվանդների մոտ:

Yu. V. Yankauskene

**Blood Supply of the Eye in the Patients With Thyrotoxicosis
With Cardiac Insufficiency and Without it
S u m m a r y**

The qualitative and quantitative analysis of rheoophthalmograms of patients with cardiac insufficiency and without it were carried out. The dependence of the rheoophthalmographic data on the activity of the cardiovascular system of such patients was established.

УДК (611.13:611.716.5) 6/—053.31

О. П. ДЕНИСЕНКО

**К ВОПРОСУ КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ ДИСТАЛЬНЫХ
ЭПИФИЗАРНЫХ ХРЯЩЕЙ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ
НОВОРОЖДЕННОГО**

В настоящее время в специальной литературе имеются сведения об артериях (А) эпифизов костей предплечья. Но все результаты получены в основном при изучении материала, взятого от трупов взрослых людей. Нет работ, конкретно посвященных новорожденным (Н), имеются ссылки только на возрастные особенности. Встречаются сведения об источниках кровоснабжения эпифизов костей предплечья. Однако не отмечена степень участия тех или иных А в кровоснабжении каждого эпифиза локтевой и лучевой костей определенной возрастной группы; нет работ, в которых бы давалось целостное представление о внеорганных А эпифизарных хрящей (ЭХ) костей предплечья Н. Вышеизложенное свидетельствует о том, что работы, посвященные кровоснабжению ЭХ костей предплечья Н, являются актуальными.

В настоящем исследовании представлены данные об А дистальных ЭХ локтевой и лучевой костей Н. Изучено 40 ЭХ костей предплечья одиннадцати Н. Анализ данных литературы показал отсутствие спе-