К. С. КАРАМОВ, Ж. А. БАЗИЯН, В. Т. ДЖАФАРОВ, Ф. Д. МУРАДОВ

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОВЕКТОРКАРДИОГРАММЫ
У БОЛЬНЫХ ХОЛЕЦИСТИТОМ

У 90 больных, страдающих острым или хроническим калькулезным холециститом, проведено ЭКГ и ВКГ исследование. Все больные обследовались в динамике, что позволило выявить дополнительные, весьма интересные данные. Путем сопоставлений ЭКГ и ВКГ показателей выделены наиболее информативные ВКГ признаки поражения миокарда. Весьма важным является подход к изучению путей распространения деполяризационных и реполяризационных процессов по миокарду, учитывая особенности формы кривых, что имеет важное клиническое значение. Особенность морфологических изменений волн ЭКГ и петель ВКГ и их обратимость после операции позволили констатировать их связь с патологическими изменениями в желчном пузыре, что было подтверждено клинически. У другой группы больных особенность ВКГ изменений и их стойкий характер или прогрессирование после операции позволили констатировать их обусловленность коронарным атеросклерозом. Комплексное ЭКГ и ВКГ исследование электрической активности сердца у больных холециститом позволяет в большинстве случаев уточнить характер патологических изменений миокарда, дифференцировать рефлекторную стенокардию от ишемических поражений миокарда, обусловленных коронарным атеросклерозом, что важно для решения вопроса о показаниях и противопоказаниях к хирургическому лечению.

НИИ клинической и экспериментальной
хирургии МЗ Азерб. ССР

Поступила 4/IV 1984 г.

Полный текст статьи депонирован во ВНИИМИ

Страниц 5. Библиография: 6 названий.