

Ի. Պ. ՎԱԿԱՅՈՒԿ, Վ. Ա. ԼԵՎՉԵՆԿՈ, Ն. Ն. ՍԵՐԴՅՈՒԿ, Ի. Պ. ԳԵՐԵԼՅՈՒԿ
ՀԱԿԱԱՆԳԻՆԱԼ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԵՄՈԴԻՆԱՄԻԿԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ա Վ Փ Ն Փ Ն Ն

Հայտնաբերված են կալցիումի հակազդիչների օպտիմալ և արդյունավետ դեզալոդերը, որոնք պահանջում են սրտամկանի հեմոդինամիկ ծանրաբեռնվածությունը:

I. P. Vākaiyuk, V. A. Levchenko, N. N. Serdyuk, I. P. Gerelyuk

Hemodynamic Effects of Antianginal Agents

S u m m a r y

The most optimal and effective dosages of calcium antagonists are established, which promotes the sufficient hemodynamic unloading of the myocardium.

УДК 616.12—009.86—08:615.2

В. Г. КУКЕС, С. А. МАЗИЙ, Г. А. ТУРАШВИЛИ,
А. Б. ҚАЗАРЯН, Н. А. НАРОДНИЦКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ТОБАНУМ И ОБСИДАН ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИИ У РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Больные нейродистонией (НЦД) составляют до 30% всех лиц, обращающихся к терапевту за врачебной помощью. Большинство из них—это люди молодого и трудоспособного возраста.

В настоящее время при лечении НЦД по гипертоническому типу используется группа препаратов бета-адреноблокаторов. Широко известно применение пропранолола (анаприлин, обсидан). В Венгерской Народной Республике получен новый неселективный бета-адреноблокатор—хлорпропанол (тобанум).

Цель исследования—изучить клиническую эффективность бета-адреноблокатора тобанум у больных с НЦД по гипертоническому типу в сравнении с широко применяемым бета-адреноблокатором обсиданом в условиях промышленного производства.

Материал и методы. Под наблюдением находилось 64 больных с НЦД по гипертоническому типу (24 мужчины и 40 женщин, возраст которых колебался от 21 года до 50 лет). 28 больным амбулаторно назначался тобанум, 36 больным—обсидан. Первоначальная средняя суточная доза тобанума составляла от 10 до 20 мг и подбиралась индивидуально в зависимости от исходного состояния больных. В процессе лечения (с 3-4-го дня) доза препарата уменьшалась или увеличивалась на 2,5—5 мг в зависимости от клинического состояния больных. Обсидан назначался в дозе 80—160 мг в день в 3—4 приема.

Оценка эффективности действия препаратов проводилась по данным общепринятых клинических (фазикальный осмотр, измерение артериального давления и т. д.), функциональных (анализ данных ЭКГ методов в динамике), определение холестерина и триглицеридов производилось на автоанализаторе «Техникон».

Результаты исследований. В результате проведенного исследования выявлено, что тобанум обладает значительным гипотензивным и отрицательным хронотропным действием, статистически достоверно снижая повышенные цифры артериального давления и числа сердечных сокращений. Клинический эффект отмечался уже на 1-й неделе лечения и сохранялся в течение всего курса лечения. Лечение тобанумом сопровождалось улучшением субъективного состояния больных, начиная с 3—5-го дня терапии. Выявлен достаточно выраженный седативный эффект препарата. При сравнении эффекта действия тобанума с обсиданом отмечен более ранний и значительный эффект тобанума. Клинических признаков кардиотоксического действия препаратов в течение всего периода исследования не отмечалось. Изучение изменений уровня холестерина и триглицеридов у исследуемых больных обеих групп выявило незначительное увеличение уровня триглицеридов ($P < 0,5$). Содержание холестерина оставалось на прежнем уровне.

И ММИ им. И. М. Сеченова

Поступила 5/VIII 1985 г.

Վ. Գ. ԿՈՒԿԵՍ, Ս. Ա. ՄԱԶԻ, Գ. Ա. ՏՈՒՐԱՇՎԻԼԻ, Ա. Բ. ԿԱԶԱՐՅԱՆ,
Ն. Ա. ՆԱՐՈԴՆԻՏԿԱՅԱ

ԲԵՏԱ-ԱԴՐԵՆՈԲԼՈԿԱՏՈՐՆԵՐ ՏԵԲԱՆՈՒՄԻ ԵՎ ՕԲՍԻԴԱՆԻ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ
ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՄՈՏ
ՆՅՅՐԱՅԻՐԿՈՒՅԱՏՈՐ ԴԻՍՏՈՆԻԱՅԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

Ա մ փ ն փ ն լ մ

Հայտնաբերված է, որ տեբանումը ունի արտահայտված հիպոթենզիկ և բացասական խո-
նոտրոպ ազդեցություն, վիճակագրական հաստատված ձևով իջեցնում է զարկերակային ճնշման
բարձրացած քվերը և արտալին կծկումների քանակը: Տեբանումի և օբսիդանի ազդեցությու-
նների համեմատությունը ցույց է տվել առաջինի առավելությունները:

V. G. Kukes, S. A. Mazi, G. A. Turashvili, A. B. Kazarian,
N. A. Narodnitskaya

Clinical Estimation of Beta-Adrenoblockers Tebanum and Obsidan in Treatment of Neurocirculatory Dystonia in Factory Workers

S u m m a r y

It is revealed, that tebanum has a more significant hypotensive and negative
chronotropic effect, statistically reliably decreasing the arterial pressure indices and
the number of cardiac contractions. In comparing the effect of tebanum with that of
obsidan, a faster and more significant of tebanum is observed.

УДК 616.12—009.72:612.13—113+616.839

В. Р. ВЕБЕР, Ю. Г. ГАЕВСКИЙ

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ СДВИГИ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ У БОЛЬНЫХ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ

В проблеме изучения ишемической болезни сердца все больше внимания уделяется
функциональным механизмам регуляции сердца. В задачу настоящей работы входит