

ԽԱՐԱԿԻ ՍՈՐՏԱՅԻՆ ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՄԻ ՔԱՆԻ
ՏԱՐԲԵՐԻ ՌԵՍՈՒՄԱՍԻՐՈՒՓՑՈՒՆԸ ԹԱԼԻՆԻ
ՇՐՋԱՆԻ ՊԵՏԱՆՆԵՐՈՒՄ

Թալինի և Արզնի — Շամիրամի շրանցքների կառուցմամբ ոռոգելի դարձան Թալինի և Հոկտեմբերյանի շրջանների միջև ընկած մի քանի տասնյակ հազար հեկտար դառավոր անմշակ դուբեր, որտեղ հիմնականում տնկվել են խաղողի և պտղատու այգիներ:

Այդ տարածություններում այգիների հիմնադրման համար շատ կարևոր է խաղողի լավագույն, տեղի հողակլիմայական պայմաններին համապատասխան սորտերի ընտրությունը, ագրոմիջոցառումների այնպիսի համակարգի մշակումն ու իրականացումը, որը նպաստի պահանջվող որակի խաղողի բարձր բերքի ստացմանը:

Ելնելով վերոհիշյալից, Թալինի շրջանի Արտենիի պետական տնտեսության պայմաններում ուսումնասիրվել են խաղողի նոր, սելեկցիոն Մուսկատ Սուսանա, Ռիդարտու, Գինու վաղահաս և նորակերտ սորտերի ագրոտեխնիկայի մի քանի տարբեր:

Հետազոտվել է վազերի բեռնվածության և էտի տարբեր երկարությունների ազդեցությունը այդ սորտերի վազերի ամեցողության, բերքի քանակի և որակի վրա:

Այգու տնկման 5-րդ /1974 թ./ տարում բոլոր սորտերի վազերին տրվել է 40-50 աչք, իսկ 6-րդ տարում՝ 51-60 աչք բեռնվածություն: Բերքատու մատերը զարնանը էտվել են երեք տարբերակով՝ կարճ, միջակ և երկար /5-6, 7-8 և 9-10 աչքի վրա/: Ըստ բերքատու մտտի երկարության, որոշվել է տարբեր աչքերի պտղաբերության տոկոսը:

Փորձի բոլոր տարբերակներում հաշվարկվել են աչքերի բացվածության և պտղաբերող շիվերի տոկոսը, պտղակալման և պտղաբերման գործակիցները, մեկ ողկույզի միջին թաշը, մեկ վազի և մեկ հեկտարի բերքը:

Որոշվել է պտղահյութի շաքարայնությունը և թթվությունը, կատարվել են շիվերի ամի և հասունացման վերաբերյալ չափումներ: Դիտարկվել են նաև ֆենոլիկոլների անցման ժամկետները:

Փորձերը դրվել են 2,5 x 1,5 մ խտություն ունեցող այգում, երեք կրկնողությամբ՝ յուրաքանչյուր կրկնողությունում ունենալով 20 վազ:

Ստացված տվյալները ամփոփված են 1-6-րդ աղյուսակներում:

Առաջին երկու աղյուսակների տվյալները ցույց են տալիս, որ վազերի բեռնվածության մեծացումը /40-ից մինչև 60 աչք/ ուսումնասիրվող սորտերի աչքերի բացվածության վրա էական ազդեցություն չի թողել, որովհետև բացված աչքերի քանակը կախում ունի նաև տվյալ տարվա

վլիմայական առանձնահատկությունն է և աչքերի ժմեռելու պայմաններին: Բեռնվածությունը աժի հետ մեկտեղ մեծացել է պտղաբերող շիվերի տոկոսը:

Այսպես, Մուսկատ Սուսաննա և Ռիարտու սորտերինը ավելացել է 4-5 օ/օ-ով, Գինու վաղահասինը՝ 10-16 օ/օ-ով, իսկ Նորակերտ սորտի վրա էական փոփոխություն չի նկատվել: Գրեթե նույն օրինաչափությամբ էլ փոխվել է վազերի պտղաբերման գործակիցը:

Բեռնվածության մեծացման հետ մեկտեղ, պտղաբերող շիվերի դիտվող աժը հեռանք է նաև վազերի աժող հասակի փոփոխության:

Բոլոր սորտերի պտղակալման գործակիցը, վազերի բեռնվածության աժին գուզվեց, նվազել է:

Առաջին և երկրորդ ալյուսակների ավալները վկայում են, որ ուսումնասիրվող բոլոր սորտերի բերքատու մասը երկարացնելիս ինչ-որ չափով մեծանում է աչքերը, բացվածությունը տոկոսը, զգալիորեն ավելանում է պտղաբերող շիվերի տոկոսը և պտղաբերման գործակիցը, սակայն նվազում է պտղակալման գործակիցը:

Փորձի բոլոր տարբերակներում լավ է պտղաբերում Մուսկատ Սուսաննա սորտը, մեծ է նաև վերջինիս պտղակալման գործակիցը: Իրենց պտղաբերությամբ Մուսկատ Սուսաննային քիչ են զիջում Ռիարտու և Գինու վաղահաս սորտերը: Դեռևս թույլ է պտղաբերում Նորակերտ սորտը, որի պտղակալման գործակիցը մեկից չի անցնում:

Ներորդ և չորերորդ ալյուսակների ավալները հավաստում են, որ վազերի բեռնվածությունը 40-ից մինչև 60 աչք մեծացնելիս բոլոր սորտերի բերքը ավելանում է: Մուսկատ Սուսաննա սորտի բերքի հավելումը կազմում է շուրջ 86, Ռիարտուինը՝ 61, Գինու վաղահասինը՝ 120 և Նորակերտինը՝ 40 օ/օ:

Բեռնվածության աժի հետ մեկտեղ ավելանում է մեկ ողկույզի միջին քաշը՝ Մուսկատ Սուսաննա սորտինը շուրջ 40, Ռիարտուինը՝ 25, Գինու վաղահասինը՝ 46 և Նորակերտինը 35 գրամով: Այս հանգամանքը հեռանք է այն բանի, որ վազերը դեռևս երիտասարդ են /5-6 տարեկան/ և, անկաս բեռնվածությունից, նրանց բերքատվության պոտենցիալ հարավորությունները 1975 թվականին ավելի մեծ են եղել, քան 1974 թվականին:

Բեռնվածության փոփոխմամբ պայմանավորվող բերքի աժը, թեև քիչ չափով, ուղեկցվել է պտղաճյուղի շաքարայնության իջեցմամբ և թթվության բարձրացմամբ:

Ներորդ և չորերորդ ալյուսակների ավալները վկայում են նաև այն, որ բոլոր սորտերի բերքատու մասի երկարացումը դրականորեն է ազդում բերքի բարձրացման վրա:

ԷՏԻ ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿԱՐՈՒՓՑՈՒՄՆԵՐԻ ԱՂԳԵՑՈՒՓՑՈՒՄԸ
ՄՈՒՍԿԱՏ ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԵՎ ՌԻՐԱՐՏՈՒ ՍՈՐՏԵՐԻ ԲԵՐ-
ՔԱՏՎՈՒՓՑԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ՎՐԱ

Ս ո ռ տ ը	Մ ու լ կ ա տ		Մ ու լ ա ն ն ա		Ո ի Ր ա Ր		տ ու	
	1 9 7 4 թ.		1 9 7 5 թ.		1 9 7 4 թ.		1 9 7 5 թ.	
Վազի բռնվածուլ. աչք	41 - 50		51 - 60		41 - 50		51 - 60	
Ըտի երկարուլթյունը, աչք	5-6	7-8 9-10	5-6	7-8 9-10	5-6	7-8 9-10	5-6	7-8 9-10
Աչքերի բացվածուլ- թյունը, օ/օ	89,6	92,0 93,2	87,0	90,7 93,5	88,7	85,5 87,8	82,6	85,8 87,5
Պտղաբերող շիվերը, օ/օ	61,8	62,7 64,6	66,3	67,5 67,0	50,4	53,2 55,2	55,8	56,7 57,9
Պտղակալման գոր- ծակիցը	1,23	1,24 1,16	1,14	1,12 1,10	1,10	1,09 1,08	1,06	1,04 1,03
Պտղաբերման գոր- ծակիցը	0,67	0,71 0,74	0,73	0,74 0,76	0,56	0,58 0,59	0,59	0,62 0,61

ԷՏԻ ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԵՅՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԳԻՆՈՒ ՎԱՐԱՀԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱԿԵՐՏ ՍՈՐՏԵՐԻ ԲԵՐՔԱ-
ՏԸՎՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԲԵՐԻ ՎՐԱ

Ս ո ռ տ ը	Գ ի ն ու Վ ա ղ ա ն ա ս						Ն ո ռ ա կ ե ռ տ					
Տ ա ռ ի ն	1 9 7 4 թ.			1 9 7 5 թ.			1 9 7 4 թ.			1 9 7 5 թ.		
Վազի բեռնվածութ. աշը	41 - 50			51 - 60			41 - 50			51 - 60		
Էտի երկարությունը, աշը	5-6	7-8	9-10	5-6	7-8	9-10	5-6	7-8	9-10	5-6	7-8	9-10
Աշքերի բացվածու- թյունը, օ/օ	81,0	83,2	85,2	81,6	85,9	89,7	82,2	84,5	86,2	85,1	86,3	87,2
Պտղաբերող շիվերը, օ/օ	32,5	34,5	35,6	43,0	47,6	51,5	29,5	32,8	34,2	24,0	28,3	30,7
Պտղակալման գոր- ծակիցը	1,09	1,07	1,06	1,05	1,04	1,04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Պտղաբերման գոր- ծակիցը	0,38	0,38	0,40	0,45	0,50	0,52	0,33	0,36	0,38	0,24	0,28	0,38

ՀՏԻ ՏԱՐՔԵՐ ԵՐԱՐՈՒՄՑՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԵՑՈՒՄՑՈՒՆԸ
ՄՈՒՍԱԿԱՏ ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԵՎ ՈՒՐԱՐՏՈՒ ՍՈՐՏԵՐԻ ԲԵՐՔԻ
ՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ՈՐԱԿԻ ՎՐԱ

Ս ո ռ տ ը		Մ ու լ կ ա տ			Մ ու լ ա ն ն ա			Ո ի ը ա ղ ո տ ու					
Տ ա ղ ի ն		1 9 7 4 թ.			1 9 7 5 թ.			1 9 7 4 թ.			1 9 7 5 թ.		
Կազմի բեռնվածությունը		41 - 50			51 - 60			41 - 50			51 - 60		
Հտի երկարությունը, աչք		5-6	7-8	9-10	5-6	7-8	9-10	5-6	7-8	9-10	5-6	7-8	9-10
Բ ե ռ ը ը	Մեկ ողկուլյակի միջին քաշը, գր	99,0	95,5	93,5	140,5	135,5	131,4	94,2	92,5	91,0	124,0	118,3	116,0
	Մեկ վազի միջին բերքը, կգ	2,64	2,79	2,86	4,86	4,97	4,82	1,96	2,05	2,13	3,06	3,14	3,20
	Մեկ հեկտարի բերքը, ց	70,9	74,3	76,3	128,4	132,1	129,7	52,3	54,6	56,7	81,5	83,3	84,8
Պտղաձյուններ	Շ ա ք ա ղ ի օ/օ-ը	22,2	21,9	21,4	21,0	20,9	20,1	23,3	23,1	23,0	23,6	23,2	23,0
	Թթվությունը, գ/լ	6,3	6,5	6,7	6,9	6,9	6,6	7,4	7,4	7,5	7,5	7,4	7,5

ԷՏԻ ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶՈՅՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԳԻՆՈՒ ՎԱՐՆԱՍ ԵՎ ՆՈՐԱԿԵՐՑ ՍՈՐՏԵՐԻ ԲԵՐԲԻ
ՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ՈՐԱՆԻ ՎՐԱ

Ս ո ռ տ ը		Մ ու լ ա կ ա տ ս ու լ ա ն ն ա						Ո ի ր ա ր տ ու					
տ ա ր ի ն		1 9 7 4 թ			1 9 7 5 թ			1 9 7 4 թ			1 9 7 5 թ		
վազի բեռնված. աչք		41 - 50			51 - 60			41 - 50			51 - 60		
Լտի երկարությունը, աչք		5-6	7-8	9-10	5-6	7-8	9-10	5-6	7-8	9-10	5-6	7-8	9-10
Ո թ Վ Գ Վ	Մեկ ողկույզի միջին քաշը, գր.	117,0	114,5	109,0	169,0	159,5	156,5	100,5	100,0	97,0	139,0	133,5	128,5
	Մեկ վազի միջին բերքը, կգ	1,47	1,54	1,64	2,39	3,66	4,50	1,25	1,36	1,46	1,55	1,92	2,04
	Մեկ հեկտարի բերքը, ց:	39,4	40,6	42,9	90,1	97,6	105,9	33,4	36,4	39,1	45,2	51,3	54,4
Ն թ Վ Մ Ս Ս	Շ ա ք ա ռ, օ/օ	22,5	22,3	22,1	21,6	21,4	21,1	21,8	21,6	21,3	21,0	20,8	20,4
	Թթվությունը, գ/լ	7,4	7,5	7,5	7,6	7,7	7,6	7,6	7,7	7,7	7,8	7,9	7,9

Ներկար /9-10 աչք/ետր դեպքում, թեև ինչ-որ շահով նվազել է մեկ ողկուլյի միջին բաշը, սակայն ողկուլյների քանակի ավելացումը նըպաստել է ընդհանուր բերքի բարձրամանը:

Էտի երկարացման ազդեցությունը բերքի վրա, փորձի տարբեր տարիներին և առանձին սորտերի մոտ, միանման չի եղել:

Բերքատու մասի երկարացումը Մուսկատ Սուսաննա և Ուրարտու սորտերի բերքի վրա էական ազդեցություն չի թողել: Դեռ ավելին՝ Մուսկատ Սուսաննա սորտի վազերը 1975 թվականին 7-8 աչք երկարությամբ էտելիս ավելի բարձր բերք են տվել, քան 9-10 աչքի վրա էտելու դեպքում: Այս տեսակետից պտուկերի միանգամայն այլ է Գինու վաղահաս և Նորակերտ սորտերի մոտ: Եթե 1974 թվականին այս սորտերի բերքի վրա երկար էտը էական ազդեցություն չի թողել, ապա 1975 թվականին այդ ազդեցությունը շատ ավելի զգալի է եղել՝ Գինու վաղահաս սորտի բերքի հավելումը, կարճ էտի համեմատությամբ, կազմել է 17, իսկ Նորակերտինը՝ 20 օ/օ:

Բերքի ավելացման համեմատ, երկար էտի տարբերակում, պտղահյուսի մեջ որոշ շահով նվազել է շաքարների տոկոսը և բարձրացել թթվությունը: Փորձի բոլոր տարբերակներում բարձր բերք է ապահովել Մուսկատ Սուսաննա սորտը: Իրենց բերքատվությամբ այս սորտին քիչ են զիջել Ուրարտու և Գինու վաղահաս սորտերը: Առայժմ փոքր բերք է տվել Նորակերտ սորտը, հավանաբար այն դեռևս լրիվ բերքատվության չի անցել: Փորձի բոլոր տարիներին և բոլոր տարբերակներում, պտղի մեջ եղած շաքարների մեծ պարունակությամբ, աչքի է ընկել Ուրարտու սորտը: Համեմատաբար քիչ շաքար է կուտակել Մուսկատ Սուսաննան: Այս տեսակետից միջին տեղ է զուներ Գինու վաղահասը:

Հինգերորդ աղյուսակի տվյալները ցույց են տալիս, որ ուսումնասիրվող սորտերի էտի երկարության փոփոխությունը առաջ է բերում բերքատու մասի հանգուլյների պտղաբերման որոշակի փոփոխություն: Էտի բոլոր երկարություններին դեպքում առաջին երկու հանգուլյների պտղաբերությունը ցածր է, սակայն բերքատու մասի երկարացմանը զուգընթաց այդ հանգուլյների պտղաբերությունը ավելի է նվազում:

Հինգերորդ աղյուսակի տվյալներից պարզ է դառնում, որ էտի բոլոր երկարություններին դեպքում շատ քիչ են պտղաբերում 4-7-րդ հանգուլյները: Նրբ Մուսկատ Սուսաննա և Ուրարտու սորտերի բերքատու մասի երկարությունը հասնում է 9-10 աչքի, ապա վերջին երկու հանգուլյների պտղաբերությունը զգալիորեն նվազում է, իսկ Գինու վաղահաս սորտի երկար էտի դեպքում վերջին հանգուլյները իրենց պտղաբերությամբ զրեմե չեն զիջում միջին հանգուլյներին:

ՄԻ ՔԱՆԿԻ ՍՈՐՏԵՐԻ ԱՉՔԵՐԻ ՊՏՂԱԲԵՐՈՒՓՑԱՆ օ/օ-Ը
ԷՏԻ ՏԱՐՔԵՐ ԵՐԿԱՌՈՒՓՑՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

Մոդուլը	Էտի երկա- րուկ յունը, աշ	ԱՆՔԵՐԻ ԿԱՐԳԱՅԻՆ ԴԱՄԱՐՈՂ ԴԻՄՔԵԳ ԴԱՉՎԱԾ										-----
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Մուսկատ Սուսանա	5-6	18,6	30,1	42,4	54,0	82,1	75,8	-	-	-	-	
	7-8	12,4	26,2	51,8	62,0	58,6	70,9	68,2	36,3	-	-	
	9-10	10,1	26,9	36,4	47,2	54,4	56,1	63,5	40,1	31,4	27,9	
Ուղղաբուր	5-6	16,5	28,3	40,4	52,6	76,4	67,7	-	-	-	--	
	7-8	10,0	21,1	39,4	56,7	49,8	62,2	56,9	27,3	-	-	
	9-10	9,4	22,3	30,4	40,5	43,2	47,4	51,0	36,5	29,3	24,6	
Գինու վառլահա	5-6	13,8	24,5	36,7	47,8	64,5	58,9	-	-	-	-	
	7-8	9,8	19,7	35,3	49,6	41,4	60,0	51,1	42,0	-	Բ	
	9-10	8,8	17,9	28,6	37,2	46,4	45,1	48,6	44,2	40,8	42,6	

ՎԱՋԻ ԲԵՌՆԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԷՏԻ ՆԵՂԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԻՎԵՐԻ ԱՃԵՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Վազի բերնական- թյունը, աշբ	Ետի ներկարդությունը աշբ	Մուսկատ Սուսանա		Ուրարտու		Գինու վաղահաս		Նորակերտ	
		Մ Ե Կ 2 Ի Վ Ի Թ Ը Զ Ի Ն Ը							
		Երկարու- թյունը, սմ	Հասու- նացման օ/օ-ը	Երկարու- թյունը սմ	Հասու- նացման օ/օ-ը	Երկարու- թյունը, սմ	Հասու- նացման օ/օ-ը	Երկարու- թյունը, սմ	Հասու- նացման օ/օ-ը
1974 թ. 41 - 50	5-6	86	85,0	78	84,0	113	78,4	99	78,9
	7-8	82	84,3	73	83,6	99	77,7	96	77,6
	9-10	80	84,2	69	83,1	96	76,2	92	16,2
1975 թ. 51 - 60	5-6	81	84,1	76	85,8	106	19,4	96	80,1
	7-8	78	83,2	72	84,0	101	78,1	92	78,3
	9-10	76	82,6	70	83,8	98	77,0	89	78,0

Հետևապես, Մոսկատ Սուսաննա և Ուրարտու սորոտերի վազերը պետք է էտվեն 6-7 աչք երկարությամբ, իսկ Գինու վաղահասինը՝ 10 աչքի սահմաններում:

Վեցերորդ ալյուսակի տվյալները հավաստում են, որ բեռնվածության ավելացման և բերքատու մառի երկարացմանը զուգընթաց, բուր սորոտերի շիվերի միջին աճը կրճատվել է որոշ չափով և իջել է դրանց հասունացման տոկոսը:

Համեմատաբար ուժեղ են աճել Գինու վաղահաս և Նորակերտ սորոտերի վազերը:

Մեր ուսումնասիրությունների արդյունքները թույլ են տալիս եզրակացնել.

1. Ուսումնասիրվող սորոտերի վազերի բեռնվածությունը 40-ից մինչև 60 աչք մեծացնելիս զգալիորեն ավելանում է բերքը: Այդ հավելումը հետևանք է նաև վազերի հասակային աճի:

2. Բերքատու մառի երկարացումը /5-6 աչքից մինչև 9-10 աչք/ նրպաստում է բուր սորոտերի բերքատվության բարձրացմանը: Նրկար էտի տարբերակում զգալի չափով ավելանում է հատկապես Գինու վաղահաս և Նորակերտ սորոտերի բերքը:

3. Էտի բուր երկարությունների դեպքում բարձր պտղաբերությամբ են օժտված 4-7-րդ հանգույցները: Գինու վաղահաս և Նորակերտ սորոտերի 9-10-րդ հանգույցները իրենց պտղաբերությամբ զրեթե չեն զիջում միջին հանգույցներին:

4. Բեռնվածության ավելացմանը և էտի երկարացմանը զուգընթաց ինչ-որ չափով նվազում է շիվերի միջին աճը և նրանց հասունացման տոկոսը:

5. Բեռնվածության մեծացման և էտի երկարացման հետևանքով ստացվող բերքի հավելումը, թեև վոր չափով, ուղեկցվում է պտղայնություն շաքարների նվազեցմամբ և թթուների բարձրացմամբ:

Հետևապես, Թալինի շրջանի պայմաններում վերոհիշյալ սորոտերի վազերը պետք է բեռնել 60-ական աչքի սահմաններում, Մոսկատ Սուսաննա և Ուրարտու սորոտի վազերը էտել 6-7 աչք, իսկ Գինու վաղահաս և Նորակերտ սորոտերինը՝ 9-10 աչք երկարությամբ:

Х.Е.Сафарян.

Некоторые вопросы агротехники
винограда в условиях Талинского района Арм.ССР
(резюме)

Талинский район один из районов предгорной зоны Армении, где виноград выращивается впервые. Поэтому изучение агро-биологических особенностей сортов винограда, установление величины нагрузки куста и длины обрезки в условиях данного района имеют большое значение.

Исследования проводились на новых селекционных сортах: Мусиат, Сусанна, Урарту, Гину вагаас и Норакерт. Нагрузка кустов у всех сортов составляла: в 1974 году от 41 до 50, а в 1975 году от 51 до 60 глазков на куст. Была изучена также длина обрезки плодовых стрелок в трех вариантах: 5-6, 7-8, 9-10 глазков.

Опыты были заложены в трех повторностях, по 20 учетных кустов в каждой.

В течение опыта проводились: учет процента распустившихся глазков и плодоносящих побегов, определение плодородности почек на разных узлах плодовой стрелки, учет урожайности кустов по вариантам, измерение однолетнего прироста и одревеснение побегов, качества ягод винограда, фенологические наблюдения.

На основании полученных результатов можно прийти к следующим выводам.

1. В условиях Талинского района увеличение нагрузки кустов (от 41 до 60 глазков) повышает урожайность всех испытываемых сортов.

2. При увеличении длины обрезки плодовой стрелки с 5-6 до 9-10 глазков, у всех сортов увеличивается процент распускания глазков и плодоносящих побегов, повышается урожай. При длинной обрезке, урожай у сортов Гину вагаас и Норакерт превышал другие сорта.

3. Плодородность глазков нижних двух узлов у всех сортов была низкая, а с третьего узла она увеличилась и доходила до максимальной на 4-7-х узлах.

4. При увеличении нагрузки куста и длине обрезки несколько снижается рост и одревеснение побегов.

5. С повышением урожая незначительно снижается саха-

ристость и увеличивается кислотность ягод.

Исходя из полученных данных в условиях Талинского района целесообразно установление нагрузки кустов в пределах 60 глазков, обрезку плодовых стрелок рекомендовать по сортам Мускат Сусанна и Урарту на 6-8 глазков, а по Гину вагас и Норакерт на 8-10 глазков.