

А. А. Ахвердов и Н. В. Мирзоева

Новый вид тюльпана из южной Армении

Tulipa Sosnowskyi A. Akhv. et N. Mirz. sp. nova. Sect. *Leiostemones*
Boiss. Fl. Or. I (1884) 191

Bulbus ovatus ad 2,5 cm latus, tunicis pallide brunneis subcoriaceis, intus tota superficie sat dense adpresse pilosis. Caules 23—30 cm alti, ut pedunculi glabri, a bulbi basi lateraliter enascentes. Folia 3—5 glabra glauca margine undulata, anguste marginata, versus apicem valde attenuata acutata, flores non superantia. Folium inferior sessile basi late cuneatum amplexicaule, late ellipticum vel late ovatum versus apicem $\pm$ angustatum, 20 cm longum, 6—8, 5 cm latum, sequens (si adest) elliptico-oblongum apice longe attenuatum. Alabastra erecta. Flores in apice caulis solitarii, cupulati, 10 cm in diam. Perigonii phylla laete-rubra basi nigro maculata, elliptica, basi angustata, apice sensim acutata, 8—9 cm longa, 3, 5—4 cm lata, externa attenuato acutata longitudinis a quarta parte reflexa; interna oblongo-obovata, valde apera non reflexa, nervo crasso instructa. Stamina perigonio triplo breviora, filamentis glabris, nigris, apice angustatis, antheris aequilongis vel sublongioribus. Ovarium antheras equans v. subbrevis, viridescens, fere album, stigmatе sessili. Capsula 3—7 cm longa, 2—3 cm lata, maturitate marginibus valvaurum dehiscentibus subreflexis.

Typus: SSR Armeniae. Distr. Megri. In viciniis u rb. Megri. In declivitate meridionali m-tis Berdakar 1500 m supra mare. In apertis inter querceta mixta 30. V. 1945.

In sectione Florae Armeniacae vivae in Horto Botanico Erivanensi lecta 8 V. 1948. Led. A. Akhverdov et N. Mirzojeva.

Specimina authentic ain herb. Inst. Bot. nom. V. L. Komarovii Akad. Sc. Arm. SSR in Erevan conservantur.

Affinitas: *Tulipae* *Florenskyi* magis proxima, sed folii interioris forma late elliptica vel late ovata, perigonio magno calyciformi basi phyllis macula nigra sine margine lutea instructis, perigonii phyllis externis attenuato acutatis reflexis differt. Nomen speciei in honorem cl. prof. D. Sosnowskyi datum.

Тюльпан Сосновского. Луковица яйцевидная до 2,5 см ширины, со светло-бурыми, слабо кожистыми, с внутренней стороны по всей поверхности довольно густо прижато-волосистыми чешуями. Стебли

от 23 до 30 см высоты, вместе с цветоножкой голые, выходящие сбоку от основания луковицы. Листья в числе 3—5 голые, сизые, по краю волнистые, узко белоокаймленные, кверху сильно оттянутые, заостренные, не превышающие цветки. Нижний лист сидячий, при основании широко-клиновидный, стеблеобъемлющий, широко эллиптический или широко-яйцевидный, к верхушке б. м. суженный, 20 см длины, от 6 до 8,5 см ширины; следующий за ним лист (если он имеется) эллиптически продолговатый, на верхушке длинно вытянутый. Бутоны прямостоячие. Цветки одиночные, чашевидные, в диаметре 10 см. Листочки околоцветника ярко-красные с черным пятном при основании, эллиптические, при основании суженные, на верхушке постепенно заостренные 8—9 см длины, 3,5—4 см ширины, наружные оттянуто-заостренные, кнаружи от 1/4 длины отогнутые. Внутренние—продолговато-обратно-яйцевидные, сильно раскрытые, но не отогнутые, с толстой жилкой. Тычинки в три раза короче околоцветника, нити их голые, черные, кверху суженные, равны или немного длиннее пыльников. Завязь равна тычинкам или несколько короче, слегка зеленоватая, почти белая, с сидячим рыльцем. Коробочка от 3 см до 7 см длины и от 2 см до 3 см ширины, при созревании с расклеивающимися, назад отвороченными краями створок.

Армения. Мегринский район. Окрестности гор. Мегри. Южный макросклон г. Бердакар 1500 м н. у. м. На прогалинах среди смешанного лиственного редколесья с преобладанием дуба. 30. V. 1945 г. Собр. А. Ахвердов и Н. Мирзоева.

Описан по живому экземпляру, культивируемому в отделе Флоры и растительности Армении Ботанического сада Академии Наук Арм. ССР. 30. V. 1945 г. А. Ахвердов и Н. Мирзоева.

Цветет с конца апреля.

Представляет чрезвычайно большой интерес для декоративного цветоводства.

Ближе всего к *Tulipa Florenskyi* G. Wor., но отличается широко-эллиптической или широко-яйцевидной формой самого нижнего листа; крупным, чашевидным околоцветником при основании с черным пятном без желтого окаймления и оттянуто заостренными кнаружи отогнутыми наружными лепестками.

Данное растение мы называем в честь известного знатока флоры Кавказа проф. Д. И. Сосновского.

ՀԱՆՎԵՐԴՅԱՆ Ա. Ա. ԵՎ ՄԻՐԶՈՑԵՎԱ Ն. Վ.

ՎԱՐԴԿԱԿԱԶԻ ՆՈՐ ՏԵՍԱԿԸ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ

Ա մ փ ո փ ու մ

Հեղինակները նկարագրում են վարդկակաչի Tulipa Sosnovskyi A. Akhv. et N. Mirz. sp. nova նոր տեսակը, որը կուլտուրականացվում է Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Բուսաբանական այգու Հայաստանի ֆլորայի և բուսականության բաժնում:

Բնական պայմաններում աճում է Մեղրու շրջանի Բերդակեր լեռան վրա, ծովի մակերևույթից 1500 մ բարձր, կաղնու գերակշռումով խառն լայնատերև նոսր անտառների բացույթներում:

Դեկտրատիվ ծաղկաբուծության համար չափազանց մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում:

