

УДК 532.3

ПРОНИКАНИЕ ТОНКОГО КОНУСА В ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩУЮ ЖИДКОСТЬ

АВАГЯН С. Г.

В работе [1] решается задача движения конуса в сжимаемой электропроводящей жидкости и указано, как следует решить задачу проникания. Основным результатом состоит в получении формулы для давления в главном порядке $\sim \ln r$, что ограничивает значимость результата. Данная работа содержит полное решение задачи проникания в электропроводящую несжимаемую жидкость. В работе [2] рассматриваются задачи обтекания клина сверхзвуковым потоком. В работе [3] рассматриваются течения идеального газа с бесконечной проводимостью в магнитном поле, параллельном скорости набегающего потока.

В настоящей работе рассматривается задача о проникании тонкого твердого конуса в электропроводящую несжимаемую жидкость, находящуюся в магнитном поле. Жидкость находится в начальном H_0 магнитном поле, которое направлено по оси тела x . Для общности, сначала рассматривается проникание тонкого осесимметричного идеально-проводящего тела в бесконечно электропроводящую несжимаемую жидкость. Уравнение магнитной гидродинамики в случае баротропной невесомой несжимаемой идеальной жидкости в векторной форме имеет вид [4]

$$\operatorname{div} \vec{V} = 0 \quad (1)$$

$$\rho \frac{d\vec{V}}{dt} = -\operatorname{grad} P + \frac{1}{4\pi} \operatorname{rot} \vec{H} \times \vec{H}_0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial \vec{H}}{\partial t} = \operatorname{rot}(\vec{V} \times \vec{H}_0), \quad \operatorname{div} \vec{H} = 0 \quad (3)$$

где $\vec{V}$ —скорость частиц жидкости, ρ —плотность, P —давление, $\vec{H}$ —напряженность магнитного поля, $\vec{H}_0$ —начальное магнитное поле. Уравнение (1), (2), (3) можно записать в виде

$$\frac{\partial V_x}{\partial t} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial V_x}{\partial t} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial r} - \frac{H_0}{4\pi\rho} \left(\frac{\partial H_z}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial r} \right) = 0 \quad (4)$$

$$\frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_r}{\partial r} + \frac{V_r}{r} = 0, \quad \frac{\partial H_x}{\partial t} = -H_0 \left(\frac{\partial V_r}{\partial r} + \frac{V_r}{r} \right), \quad \frac{\partial H_r}{\partial t} = H_0 \frac{\partial V_r}{\partial x} \quad (5)$$

$$\frac{\partial H_r}{\partial x} + \frac{\partial H_r}{\partial r} + \frac{H_r}{r} = 0$$

Граничные условия на теле и на поверхности жидкости имеют вид [5, 6]

$$r=r_k, \quad V_r = -f'(t) \frac{dr_k}{dx} \quad (6)$$

$$x=0, \quad P = \frac{H_0}{4\pi} h_x = -\frac{H_0}{4\pi} h'_x, \quad H_x = H_0 + h_x$$

где h_x есть возмущенное поле вне жидкости. Первое условие соответствует условию равенства нормальной компоненты скорости жидкой частицы скорости тела по нормали, а второе—равенству нормальных компонент полного тензора напряжения. Кроме этого, на границе $x=0$ для идеально проводящей жидкости [6] имеется непрерывность нормальной компоненты напряженности поля, $h_x = h'_x$ и можно записать $x=0, P=0$. При этом (6) совпадают с граничными условиями в отсутствие поля.

Задачу можно было бы решать, следуя методу [1], вводя источники по оси тела и переходя к записи преобразования Лапласа от потенциала источника через интегралы от бесселевой функции, зависящей от r и экспоненты, зависящей от $x-x_1$, где x_1 —координата источника. Однако, проще ввести в (4), (5) потенциалы скорости и поля

$$\vec{V} = \text{grad} \varphi, \quad \vec{H} = \text{grad} \psi \quad (7)$$

При этом уравнения удовлетворяются и получаются уравнения Лапласа

$$\nabla^2 \varphi = 0, \quad \nabla^2 \psi = 0, \quad \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial^2}{\partial x^2} \quad (8)$$

и соотношения

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{1}{\rho} P = 0, \quad \frac{\partial \psi}{\partial t} = H_0 \frac{\partial \varphi}{\partial x} \quad (9)$$

где на бесконечности положено, что все функции равны нулю. Уравнение (8) для φ вместе с (6) на теле и свободной поверхности совпадают с уравнениями и граничными условиями задачи проникания такого тела в жидкость в отсутствие поля, решение которой имеет вид [5]

$$P = -\rho \frac{\partial \varphi_1}{\partial t} + \rho \frac{\partial \varphi_2}{\partial t}, \quad \varphi_{1,2} = \frac{1}{2} \int_0^{r_k} \frac{f'(t) r_k}{V(x^2 - x_1^2)^2 + r^2} dx_1 \quad (10)$$

Таким образом, давление в жидкости при проникании в нее тонкого тела по направлению нормали к поверхности, совпадающей с начальным магнитным полем H_0 , не зависит от поля. В силу свойств идеально проводящей жидкости, вполне приемлемо допущение, что токи концентрируются около границ жидкости, а именно: тела и свободной поверхности. Поэтому принято везде, кроме указанных мест,

$\text{rot} \vec{H} = 0$. Отличие полученного в статье решение от [5] состоит в учете поверхностных токов, так же, как и в плоской задаче [6]. По найденному магнитному полю в идеальной жидкости и используя уравнение Лапласа в диэлектрике, можно найти гам компоненты $h_{\pm}, H_{\pm}$. Однако, поскольку $\text{rot} \vec{H} = 0$ в области отрицательных x , то сила Лоренца равна нулю. Поэтому, область $x < 0$ не рассматривается. С другой стороны, поскольку жидкость идеально проводящая, на границе с телом должен быть токовый слой и скачок давления который, как и в случае обтекания клина [6], имеет вид

$$P_{\pm} - P_{\mp} = - \frac{1}{8\pi} (H_{x\pm}^2 - H_{x\mp}^2) \quad \text{или} \quad P_{\pm} = P_{\mp} + \frac{H_0}{4\pi} (h_{\pm} - h_{\mp})$$

где знак "+" характеризует жидкость, а знак "-" — границу тела, внутри которого можно считать $h_{\pm} = 0$, то есть магнитное поле не входит в тело, поскольку жидкость идеально проводящая [1, 6]. Тогда на теле

$$P_{-} = P_{+} + \frac{H_0}{4\pi} h_{+} \quad (11)$$

где $P, h_{\pm}$ — давление и компонента магнитного поля около тела. Из (9) следует

$$\frac{\partial h_{+}}{\partial t} = H_0 \frac{\partial V_x}{\partial x} \quad (12)$$

Из (4) следует $\frac{\partial V_x}{\partial t} = - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x}$, откуда получится с учетом (10)

$$V_x = \frac{\partial v_1}{\partial x} - \frac{\partial v_2}{\partial x} \quad (13)$$

Тогда

$$\frac{\partial h_{+}}{\partial t} = H_0 \left(\frac{\partial^2 v_1}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 v_2}{\partial x^2} \right)$$

Исходя из обозначений $v_{1,2}$ (10), после соответствующих выкладок, для конуса получим $(r_k = (f-x))$, где α — угол раствора конуса)

$$\frac{\partial h_{+}}{\partial t} = H_0 \frac{f'}{2} \alpha^2 \left| \frac{1}{\sqrt{(x+f)^2 + r^2}} - \frac{1}{\sqrt{(x-f)^2 + r^2}} \right|$$

Отсюда

$$h_{+} = H_0 \frac{\alpha^2}{2} \int_0^f \left| \frac{1}{\sqrt{(x+f)^2 + r^2}} - \frac{1}{\sqrt{(x-f)^2 + r^2}} \right| df =$$

$$= \frac{H_0^2}{2} [\ln r - 2 \ln(x + \sqrt{x^2 + r^2}) + \ln(2f + \sqrt{4f^2 + r^2})]$$

С учетом (11) для давления P (вместо P_z) на теле $r=r_k$ получим

$$\begin{aligned} P = -\rho \frac{\partial v_z}{\partial t} + \rho \frac{\partial v_x}{\partial t} + \frac{H_0^2}{8\pi} [\ln r - 2 \ln(x + \sqrt{x^2 + r^2}) + \\ + \ln(2f + \sqrt{4f^2 + r^2})] = \frac{i^2 \rho f''}{2} \left[2x - 2(f-x) \ln i + \right. \\ \left. + x \ln \frac{f^2 - x^2}{4f^2} + f \ln \frac{f+x}{f-x} + f \ln \frac{i^2 f^2 + 4x^2}{f^2} \right] + \\ + \frac{i^2 \rho f'^2}{2} \left(\ln \frac{i^2 f^2 + 4x^2}{i^2 f^2} + \ln \frac{f+x}{f-x} - 2 \frac{x}{f} + \frac{2f^2}{i^2 f^2 + 4x^2} \right) + \\ + \frac{H_0^2}{8\pi} [\ln i + \ln 4f(f-x) - 2 \ln(x + \sqrt{x^2 + i^2(f-x)^2})] \end{aligned} \quad (14)$$

где f'' — ускорение проникания конуса.

Компоненты магнитного поля получаются в виде

$$\begin{aligned} H_x = \frac{H_0^2 f^2}{4} \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{1}{\sqrt{x^2 + r^2}} + \frac{1}{\sqrt{(x-f)^2 + r^2}} \right] \\ H_z = H_0^2 f^2 \frac{\partial}{\partial r} \frac{1}{\sqrt{(x-f)^2 + r^2}} \end{aligned}$$

Перейдем к определению силы сопротивления жидкости, которая через давления определяется по формуле

$$Q = - \int_0^{f(t)} 2\pi P r_k \frac{\partial r_k}{\partial x_1} dx$$

Для конуса, имея в виду (14), получим

$$\begin{aligned} Q = 2\pi i^2 \int_0^f (f-x) \left\{ \frac{1}{2} i^2 \rho f'' \left[2x - 2(f-x) \ln i + \right. \right. \\ \left. \left. + x \ln \frac{f^2 - x^2}{4f^2} + f \ln \frac{f+x}{f-x} + f \ln \frac{i^2 f^2 + 4x^2}{f^2} \right] + \right. \\ \left. + \frac{1}{2} i^2 \rho f'^2 \left(\ln \frac{i^2 f^2 + 4x^2}{i^2 f^2} + \ln \frac{f+x}{f-x} - 2 \frac{x}{f} + \frac{2f^2}{i^2 f^2 + 4x^2} \right) + \right. \\ \left. + \frac{H_0^2}{8\pi} [\ln i + \ln 4f(f-x) - 2 \ln(x + \sqrt{x^2 + i^2(f-x)^2})] \right\} dx \end{aligned}$$

После интегрирования будем иметь

$$Q = -\pi \rho f^3 \left[P^2 f^2 \ln 2 + P^2 f \left(\frac{2}{3} \ln 2 + \frac{1}{3} \right) \right] +$$

$$+ \frac{H_0^2 f^2}{8} \left(\ln \lambda + \frac{5}{2} \right)$$

Как и следует, магнитное поле уменьшает силу сопротивления. Для простоты рассмотрим проникание с постоянной скоростью $f = V_0$. Тогда получим

$$Q = -\pi \mu_0^2 V_0^2 \ln 2\lambda + \frac{H_0^2 V_0^2 f^2}{8} \left(\ln \lambda + \frac{5}{2} \right)$$

Отсюда

$$\frac{Q}{\pi \mu_0^2 V_0^2 f^2} = \ln \frac{1}{2\lambda} + x \left(\ln \lambda + \frac{5}{2} \right) \quad (15)$$

где $x = H_0^2 / 8\pi \mu_0^2 V_0^2$

Как следует из (15), сила сопротивления обращается в нуль при

$$x = \frac{\ln \frac{1}{2\lambda}}{\ln \frac{1}{\lambda} - \frac{5}{2}}, \quad x > 0 \quad \text{для} \quad \lambda < e^{\frac{5}{2}}.$$

Автор выражает глубокую благодарность А. Г. Багдасву за полезное обсуждение работы.

THE THIN CONE PENETRATION INTO ELECTROCONDUCTIVE LIQUID

S. G. AVAGIAN

ԲԱՐԱԿ ԿՈՆԻ ԹԱՓԱՆՑՈՒՄԸ ԷԼԵԿՏՐԱԶԱՎՈՐՅՈՒՉ ՀՆՂՈՒԿԻ ՄԵՉ

Ս. Գ. ԱՎԱԳԻԱՆ

Ա Մ Փ Ո Փ Ո Ւ Մ

Հաժված է էլեկտրահաղորդիչ հեղուկի մեջ բարակ պինդ կոնի թափանցման խնդիրը, մագնիսական դաշտի առկայության դեպքում:

Ստացված են հեղուկի մեջ ու մարմնի վրա քնկած ճնշումը և հեղուկի դիմադրության ուժը ճույց է տրված, որ հեղուկի մեջ մագնիսական դաշտը ճնշման վրա չի ազդում: Սակայն մակերևութային հոսանքների առկայությանը փոխում է ճնշումը մարմնի երկայնությամբ:

Ստացված են հեղուկի մեջ մագնիսական դաշտի բաղադրիչների արժեքները:

ЛИТЕРАТУРА

1. Авалян С. Г., Бабооев А. Г. Проникание тонкого конуса в магнитогазодинамическую жидкость. Изв. АН Арм. ССР, Механика, 1984, т. 37, № 4, с. 3—12.
2. Куликовский А. Г. и Любимов Г. А. Магнитная гидродинамика. М.: Гостехиздат, 1962.
3. Косан М. И. Магнитодинамика плоских и осесимметричных течений газа с бесконечной электрической проводимостью. ЦММ, т. XXIII, № 1, 1959, с. 70—80.
4. Седов Л. И. Механика сплошной среды, т. I, М.: Наука, 1983, 528 с.
5. Сагомонян А. Я. Проникание. Изд-во МГУ, 1974, 299 с.
6. Калихман Л. В. Элементы магнитной гидродинамики. М.: Атомиздат, 1964, 423 с.

Ленинakanский филиал Ереванского
политехнического института им.
К. Маркса

Поступила в редакцию
15.IV.1988