С. А. Вартанян и А. О. Тосунян

Химия винилацетилена

Сообщение V. Синтез и превращения 1,3-дихлор-5-алкоксипентенов-2.

Изучая реакцию гидрохлорирования винилацетилена Карозерс [1] установил, что хлористый водород присоединяется к винилацетилену в положение-1,4.

Кроме основного продукта реакции—2-хлорбутадиена-1,3 при этой реакции, путем присоединения второй молекулы хлористого водорода, образуется 1,3-дихлорбутен-2.

В течение последних 20 лет 1,3-дихлорбутен-2 послужил доступным исходным соединением для самых разнообразных синтезов [2]. Поэтому интересно было синтезировать ряд соединений типа 1,3-дихлорбутена-2 и исследовать дальнейшие их превращения. С этой целью мы попробовали синтезировать новый ряд дихлоридов, в частности 1,3-дихлор-5-алкоксипентены-2. Для этого мы решили присоединить к винилацетилену сначала хлористый водород, а затем, вместо второй молекулы хлористого водорода, хлорметилловые эфиры. Оказалось, что эти соединения хорошо получаются при прибавлении хлорметилловых эфиров к эфирному раствору 2-хлорбутадиена-1,3 в присутствии небольшого количества свежеплавленного порошкообразного хлористого цинка.

Структура этого дихлорида доказана окислением с помощью марганцевокислого калия. При этом получают хлоруксусная и β-метоксипропионовая кислоты:

При нагревании 1,3-дихлор-5-метоксипентена-2 со спиртами и фенолом в присутствии порошкообразного едкого кали в реакцию вступает только первичный атом хлора с образованием соответствующих эфиров.

Структура этих эфиров доказана окислением. При окислении 1-фенокси-3-хлор-5-метоксипентена-2 получены феноксиуксусная [3] и β-метоксипропионовая кислоты [4].

При нагревании 1,5-диметокси-3-хлорпентена-2 в спиртовом растворе в присутствии порошкообразного едкого кали отщепляется одна молекула хлористого водорода и образуется 1,5-диметоксипентин-2, строение которого доказано гидрированием. При гидрировании 1,5-диметоксипентина-2 в растворе спиртов, в присутствии платинового катализатора, поглощаются две молекулы водорода и образуется ранее известный 1,5-диметоксипентан

Первичный хлор в 1,3-дихлор-5-метоксипентене-2 в растворе уксусной кислоты вступает в реакцию с ацетатом натрия

При взаимодействии водных растворов аминов с 1,3-дихлор-5-метоксипентеном-2 вступает в реакцию только один атом хлора. Получаются с хорошим выходом соответствующие амины:

При отщеплении хлористого водорода от 1-диметиламино-3-хлор-5-метоксипентена-2 получен 1-диметиламино-5-метоксипентин-2.

При нагревании 1,3-дихлор-5-метоксипентена-2 с 15% водным раствором углекислого калия-натрия омыляется только первичный атом хлора и образуется 1-гидрокси-3-хлор-5-метоксипентен-2.

При отщеплении хлористого водорода от 1-гидрокси-3-хлор-5-метоксипентена-2 получен 1-гидрокси-5-метоксипентин-2.

При нагревании 1,3-дихлор-5-метоксипентена-2 с бензолом в присутствии небольшого количества безводного хлористого алюминия алкилируется бензол с образованием 1-фенил-3-хлор-5-метоксипентена-2.

О дальнейших превращениях описанных выше соединений мы сообщим в ближайшее время.

Экспериментальная часть

Получение 1,3-дихлор-5-метоксипентена-2. К смеси 75 мл сухого эфира, 88,5 г 2-хлорбутадиена-1,3 и 3 г свежеплавленного порошкообразного хлористого цинка, при перемешивании в течение 3 часов, при комнатной температуре, по каплям прибавлено 80,5 г хлорметилового эфира. Затем реакционная масса перемешивалась еще 5 часов. Продукт реакции промыт водой, высушен хлористым кальцием. После отгонки эфира остаток разогнан в вакууме. Получено 126 г 1,3-дихлор-5-метоксипентена-2 (выход 74,5%); т. кип. 93—94° при 20 мм; n_D^{20} 1,4760; d_4^{20} 1,1608; MR_D найдено 41,06; вычислено 40,82.

Найдено %: Cl 41,81

$C_6H_{10}Cl_2O$. Вычислено %: Cl 42,01.

Получение 1,3-дихлор-5-бутоксипентена-2. Из 110,6 г 2-хлорбутадиена-1,3 и 153 г бутилхлорметилового эфира вышеописанным способом получено 160 г 1,3-дихлор-5-бутоксипентена-2 (выход 60,83%); т. кип. 127—128° при 19 мм; n_D^{20} 1,4678; d_4^{20} 1,0749; MR_D найдено 54,57; вычислено 54,67.

Найдено %: Cl 33,59

$C_8H_{16}Cl_2O$. Вычислено %: Cl 33,63.

Окисление 1,3-дихлор-5-метоксипентена-2. 15 г 1,3-дихлор-5-метоксипентена-2 были смешаны с 150 мл воды и при непрерывном перемешивании в течение 3-х часов маленькими порциями было добавлено 37,39 г мелкорастертого перманганата калия. При окислении температура смеси поддерживалась в пределах 5—8°. На следующий день перекись марганца отфильтрована и многократно промыта горячей

водой. Водный раствор солей выпарен досуха на водяной бане, остаток подкислен концентрированной соляной кислотой (20 мл), кислоты тщательно экстрагированы эфиром, высушены сульфатом магния. После отгонки эфира получены:

I фр. т. кип. 185—190° при 680 мм;

II фр. т. кип. 205—211° при 680 мм.

Первая фракция представляет собой хлоруксусную кислоту, т. пл. 62—63°. Проба смешения с известным образцом депрессию не дала.

Вторая фракция при вторичной перегонке имела т. кип. 207—210°; n_D^{20} 1,4218, и является β -метоксипропионовой кислотой [4].

Получение 1,5-диметокси-3-хлорпентена-2. К смеси 13 г порошкообразного едкого кали и 25 мл метилового спирта при перемешивании при комнатной температуре прибавлено по каплям 33,8 г 1,3-дихлор-5-метоксипентена-2. В течение 30 минут наблюдалось сильное разогревание смеси. Затем реакционная смесь кипятилась на водяной бане в течение 3-х часов. Смесь экстрагирована эфиром и высушена сульфатом магния. Получено 27 г 1,5-диметокси-3-хлорпентена-2 (выход 82,19%); т. кип. 91—92° при 20 мм; n_D^{20} 1,4510; d_4^{20} 1,0517; MR_D найдено 42,07; вычислено 42,21.

Найдено %: Cl 22,00

$C_7H_{13}ClO_2$. Вычислено %: Cl 21,58.

Получение 1-фенокси-3-хлор-5-метоксипентена-2. Смесь 19 г фенола, 28 г поташа, 33,8 г 1,3-дихлор-5-метоксипентена-2 и 200 мл ацетона кипятилась с обратным холодильником на водяной бане в течение 48 часов. После отгонки ацетона продукт реакции экстрагирован 200 мл эфира, затем промыт 10% водным раствором едкого натра (100 мл), эфирный раствор высушен сульфатом магния. После отгонки эфира остаток разогнан в вакууме. Получено 30 г 1-фенокси-3-хлор-5-метоксипентена-2 (выход 66,2%); т. кип. 129—131° при 2 мм; n_D^{20} 1,5251; d_4^{20} 1,1256; MR_D найдено 61,57; вычислено 61,70.

Найдено %: Cl 15,85

$C_{11}H_{11}ClO_2$. Вычислено %: Cl 15,67.

Окисление 1-фенокси-3-хлор-5-метоксипентена-2. 13 г 1-фенокси-3-хлор-5-метоксипентена-2 были смешаны с 100 мл воды и при непрерывном перемешивании в течение 3-х часов порциями было прибавлено 24,2 г мелко растертого перманганата калия. Температура смеси поддерживалась в пределах 5—8°. На следующий день перекись марганца отфильтрована, многократно промыта горячей водой. Водный раствор солей выпарен досуха на водяной бане и остаток подкислен концентрированной соляной кислотой (18 мл). Кислоты тщательно экстрагированы эфиром, высушены сульфатом магния. После отгонки эфира выпали кристаллы фенокснуксусной кислоты, т. пл. 97—98° (из воды); проба смешения с известным образцом [3] депрессии

не дала. Остаток имел т. кип. 205—211°, n_D^{20} 1,4209, и являлся β -метоксипропионовой кислотой [4].

Отщепление хлористого водорода от 1,5-диметокси-3-хлорпентена-2. К смеси 50 мл абсолютного спирта и 24 г едкого кали при интенсивном перемешивании в течение 30 минут было прибавлено 35 г 1,5-диметокси-3-хлорпентена-2; при этом происходило разогревание. Затем реакционная смесь кипятилась на водяной бане в течение 5 часов. Продукт реакции экстрагирован эфиром, высушен сульфатом магния и разогнан в вакууме. Получено 19 г 1,5-диметоксипентина-2 (выход 69,85%); т. кип. 69—70° при 13 мм; n_D^{20} 1,4425; d_4^{20} 0,9360; MR_D найдено 34,93; вычислено 35,81.

Найдено %: С 65,92; 65,78; Н 9,65; 9,57

$C_7H_{12}O_2$. Вычислено %: С 65,62; Н 9,37.

Гидрирование 1,5-диметоксипентина-2. 6 г 1,5-диметоксипентина-2 в 30 мл абсолютного спирта гидрировались в присутствии платинового катализатора. Поглотилось 2,35 л водорода вместо 2,25 л, требуемых по теории. Получено 3,9 г 1,5-диметоксипентана с т. кип. 140—142° при 680 мм; n_D^{15} 1,4114; d_4^{15} 0,8676.

По литературным данным 1,5-диметоксипентан имеет т. кип. 156—157° при 760 мм; n_D^{15} 1,4094; d_4^{20} 0,8616 [5].

Получение 1-ацетокси-3-хлор-5-метоксипентена-2. Из 40 г 1,3-дихлор-5-метоксипентена-2, 20 г ацетата натрия и 25 мл уксусной кислоты обычным способом было получено 23 г 1-ацетокси-3-хлор-5-метоксипентена-2 (выход 50,53%); т. кип. 121—122° при 18 мм; n_D^{20} 1,4585; d_4^{20} 1,1244; MR_D найдено 46,91; вычислено 46,84.

Найдено %: Cl 18,24

$C_8H_{13}ClO_3$. Вычислено %: Cl 18,44.

Получение 1-диметиламино-3-хлор-5-метоксипентена-2. В смесь 30 г 1,3-дихлор-5-метоксипентена-2 и 150 мл сухого эфира был пропущен газообразный диметиламин (16 г). Продукт промыт водой, эфирный раствор высушен сульфатом магния и разогнан в вакууме. Получено 26 г 1-диметиламино-3-хлор-5-метоксипентена-2 (выход 82,48%); т. кип. 87—88° при 15 мм; n_D^{20} 1,4570; d_4^{20} 0,9909; MR_D найдено 48,72; вычислено 49,13.

Найдено %: N 7,70; 8,01

$C_8H_{14}ClON$. Вычислено %: N 7,88.

Пикрат плавился при 94—95° (из спирта).

Получение 1-фениламино-3-хлор-5-метоксипентена-2. Смесь 30 г 1,3-дихлор-5-метоксипентена-2, 33 г анилина и 12 г воды кипятилась в колбе с обратным холодильником на кипящей водяной бане в течение 12 часов. Продукт реакции экстрагирован эфиром и высушен сульфатом магния. Получено 30 г 1-фениламино-3-хлор-5-метоксипен-

тена-2 (выход 75,65%); т. кип. 156—158° при 2 мм; n_D^{20} 1,5565; d_4^{20} 1,1254; MR_D найдено 64,32; вычислено 63,99.

Найдено %: N 6,25; 6,41
 $C_{12}H_{16}ClON$. Вычислено %: N 6,21.

Отщепление хлористого водорода от 1-диметиламино-3-хлор-5-метоксипентена-2. К 25 мл абсолютного спирта прибавлено 12 г едкого кали, при интенсивном перемешивании в течение 30 минут было добавлено по каплям 15 г 1-диметиламино-3-хлор-5-метоксипентена-2. Реакционная смесь кипятилась на водяной бане в течение 5 часов. Продукт реакции экстрагирован эфиром, высушен сульфатом магния и разогнан. Получено 8,5 г 1-диметиламино-5-метоксипентина-2 (выход 71,40%); т. кип. 66—67° при 7 мм; n_D^{20} 1,4501; d_4^{20} 0,8886; MR_D найдено 42,53; вычислено 42,73.

Найдено %: N 10,11; 9,97
 $C_8H_{16}ON$. Вычислено %: N 9,92.

Получение 1-гидрокси-3-хлор-5-метоксипентена-2. Смесь 40 г 1,3-дихлор-5-метоксипентена-2 и 400 г 15% водного раствора карбоната натрия-калия кипятилась в колбе с обратным холодильником в течение 30 часов. После охлаждения продукт экстрагирован эфиром, высушен сульфатом магния и разогнан в вакууме. Получено 25 г 1-гидрокси-3-хлор-5-метоксипентена-2 (выход 70,18%); т. кип. 112—113° при 10 мм. n_D^{20} 1,4718; d_4^{20} 1,1304; MR_D найдено 38,21; вычислено 37,48.

Найдено %: Cl 23,68
 $C_8H_{11}ClO_2$. Вычислено %: Cl 23,58.

Отщепление хлористого водорода от 1-гидрокси-3-хлор-5-метоксипентена-2. В смесь 25 мл абсолютного спирта и 15 г едкого кали при интенсивном перемешивании в течение 30 минут было прибавлено по каплям 19 г 1-гидрокси-3-хлор-5-метоксипентена-2. Реакционная смесь кипятилась на водяной бане в течение 5 часов. Продукт реакции экстрагирован эфиром, высушен сульфатом магния и разогнан. Получено 11 г 1-гидрокси-5-метоксипентина-2 (выход 76,9%); т. кип. 105—106° при 15 мм; n_D^{20} 1,4679; d_4^{20} 1,0119; MR_D найдено 31,31; вычислено 31,07.

Найдено %: C 63,54; 63,06; H 8,60; 8,75
 $C_8H_{10}O_2$. Вычислено %: C 63,15; H 8,77

Получение 1-фенил-3-хлор-5-метоксипентена-2. Смесь 50 мл бензола, 10 г 1,3-дихлор-5-метоксипентена-2 и 2 г безводного хлористого алюминия кипятилась в колбе с обратным холодильником на водяной бане в течение 4 часов; наблюдалось выделение газообразного хлористого водорода. Продукт промыт водой и разбавленной соляной кислотой, нейтрализован содой и высушен хлористым кальцием.

Получено 8,5 г 1-фенил-3-хлор-5-метоксипентена-2 (выход 68,19%); т. кип. 135—136° при 8 мм; n_D^{20} 1,5230; d_4^{20} 1,0820; MR_D найдено 59,41; вычислено 60,06.

Найдено %: Cl 16,68
 $C_{12}H_{15}ClO$. Вычислено %: Cl 16,86.

Выводы

1. Показано, что хлорметилловые эфиры гладко присоединяются к 2-хлорбутADIену-1,3 только в положение 1,4. При этом образуются соответствующие алкокси-1,3-дихлориды.

2. 1,3-Дихлор-5-метоксипентен-2 вступает в реакцию со спиртами и фенолом и дает соответствующие эфиры.

3. 1,3-Дихлор-5-метоксипентен-2 вступает в реакцию с солями кислот и образует сложные эфиры.

4. Вторичные амины с 1,3-дихлор-5-метокси-пентеном-2 дают третичные амины.

5. При омылении первичного атома хлора 1,3-дихлор-5-метоксипентен-2 дает 1-гидрокси-3-хлор-5-метоксипентен-2.

6. Алкилированием бензола с помощью 1,3-дихлор-5-метоксипентена-2 получен с хорошим выходом 1-фенил-3-хлор-5-метоксипентен-2.

Химический институт
 Академии наук АрмССР

Поступило 29 III 1957

Ս. Հ. Վարդանյան և Հ. Հ. Թոսուկյան

ՎԻՆԻԼԱՑԵՏԻԼԵՆԻ ՔԻՄԻԱՆ

Հաղորդում V. 1,3-դիքլոր-5-ալիօքսի-2-պենտենների սինթեզը և փոխարկումները

Ա Մ Փ Ո Փ Ո Ւ Մ

Գարողերսը վինիլացետիլենի հիդրոքլորման ռեակցիան ուսումնասիրելով ցույց է տվել, որ քլորաջրածինը վինիլացետիլենին միանում է 1,4 դիրքում: Այս ռեակցիայի ժամանակ բացի հիմնական պրոդուկտ 2-քլորբուտադիեն-1,3-ից, քլորաջրածնի երկրորդ մոլեկուլը միանալով 2-քլորբուտադիեն-1,3-ին, գոյացնում է 1,3-դիքլորբուտեն-2:

1,3-Դիքլորբուտեն-2-ը վերջին 20 տարիների ընթացքում մատչելի ելանյութ է հանդիսացել զանազան սինթեզների համար: Հետաքրքիր էր սինթեզել 1,3-դիքլորբուտեն-2-ի նման միացություններ և ուսումնասիրել նրանց հետագա փոխարկումները: Այս նպատակով մենք փորձեցինք սինթեզել 1,3-դիքլոր-5-ալիօքսի-2-պենտեններ: Այս նոր շարքի միացություններն ստանալու համար որոշեցինք նախ վինիլացետիլենին միացնել քլորաջրածին, իսկ քլորաջրածնի մյուս մոլեկուլի փոխարեն միացնել քլորմեթիլ-եթերներ: Գարզվեց, որ այս միացությունները հաջողությամբ

ստացվում են այն դեպքում, երբ 2-քլորրուտադին-1,3-ի եթերային լուծույթի վրա քիչ քանակությամբ թարմ հալեցրած ցինկի քլորիդի փոշուներկայությամբ ազդում ենք քլորմեթիլեթերները:

Այս միացությունների կառուցվածքը հաստատված է օքսիդացմամբ, որի ժամանակ ստացված են քլորքաղսաթթու և β -մեթօքսիպրոպիոնաթթու:

1,3-Դիքլոր-5-մեթօքսիպենտեն-2-ը սպիրտների և ֆենոլի հետ կծու կալիումի ներկայությամբ ռեակցիայի մեջ է մտնում միայն առաջնային քլորով, գոյացնելով համապատասխան եթերները: Այս եթերների կառուցվածքը հաստատված է 1-ֆենօքսի-3-քլորպենտեն-2-ի օքսիդացմամբ: Ստացված են ֆենօքսիքաղսաթթու և β -մեթօքսիպրոպիոնաթթու:

1,5-Դիմեթօքսի-3-քլորպենտեն-2-ը սպիրտային լուծույթում կծու կալիումի ներկայությամբ անջատում է քլորաջրածնի մեկ մոլեկուլ: գոյացնում է 1,5-դիմեթօքսիպենտին-2, որի կառուցվածքը հաստատված է Pt -ի կատալիզատորի ներկայությամբ հիդրելով, ըստ որում ստացվել է արդեն հայտնի 1,5-դիմեթօքսիպենտանը:

1,3-Դիքլոր-5-մեթօքսիպենտեն-2-ի առաջնային քլորը ռեակցիայի մեջ է մտնում նատրիումի ացետատի հետ քաղսաթթվի միջավայրում, տալով էթեր:

1,3-Դիքլոր-5-մեթօքսիպենտեն-2-ի վրա ամինների ջրային լուծույթով ազդելիս ռեակցիայի մեջ է մտնում միայն առաջնային քլորը, բարձր ելքերով գոյացնելով համապատասխան ամինները: Այս ամիններից քլորաջրածին պակելով ստացվել են ացետիլենային շարքի համապատասխան ամինները: Նատրիում-կալիում կարբոնատի 150°C -ոց լուծույթում 1,3-դիքլոր-5-մեթօքսիպենտեն-2-ը եռացնելիս հիդրոլիզվում է առաջնային քլորը, տալով համապատասխան սպիրտը, որից քլորաջրածնի մեկ մոլեկուլ պակելով ստացվում է ացետիլենային շարքի համապատասխան սպիրտը:

1,3-Դիքլոր-5-մեթօքսիպենտեն-2-ն անջուր ալյումինիումի քլորիդի ներկայությամբ բենզոլում տաքացնելիս ենթարկվելով ալկիլման, գոյացրնում է 1-ֆենիլ-3-քլոր-5-մեթօքսիպենտեն-2:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. W. H. Carothers, W. Collins, Kirby, J. Am. Chem. Soc., 53, 4203 (1931); W. H. Carothers, B. Collins, J. Am. Chem. Soc., 54, 4066 (1932).
2. В. И. Исагулянц, Г. Т. Татвосян, Г. Т. Есаян, Усп. Химии, 19, 744 (1950).
3. F. J. Koelsch, J. Am. Chem. Soc., 53, 304 (1931).
4. M. N. Palomaa, C., II, 596 (1912).
5. Словарь органических соединений, III, 348, ИЛ, Москва, 1953.