А. Л. Миджоян и М. А. Калдрикян

Исследования в области производных бензофурана

Сообщение III. Синтез некоторых моно- и ди-N-замещенных амидов бензофуран-2-карбоновой кислоты и их восстановление алюмогидридом лития

Работами ряда исследователей в области производных 2-аминометил-2,3-дигидробензофуранов с общей формулой:

было установлено, что эти соединения представляют определенный биологический интерес [1].

Сведения же о производных бензофурана весьма ограничены [2]. Это, по-видимому, объясняется малодоступностью этих соединений, поэтому изучение путей синтеза производных бензофуранового ряда, в частности интересующих нас 2-аминометилбензофуранов,

представляло двойкий интерес.

Одним из методов получения указанных аминов может служить восстановление алюмогидридом лития соответствующих N-замещенных амидов бензофуран-2-карбоновой кислоты. Следует отметить, что, несмотря на широкое применение этого восстановителя для получения труднодоступных соединений, в ряду бензофуран-2-карбоновой кислоты он почти не изучен. Известна только одна работа Гэртнера [3] по получению бензофурфурилового спирта восстановлением бензофуран-2-карбоновой кислоты алюмогидридом лития.

Нами получены некоторые моно- и ди-N-замещенные амиды бензофуран-2-карбоновой кислоты и изучено их восстановление в соответствующие амины алюмогидридом лития

Восстановление полученных моно- и ди-N-замещенных амидов бензофуран-2-карбоновой кислоты проведено, в основном, действием

на растворы амидов эфирных растворов алюмогидрида лития. По уравнению реакции при восстановлении монозамещенных амидов на один моль амида требуется 0,75 моля алюмогидрида, в случае же дизамещенных амидов—0,5 моля. Хотя данные Миковича и Михайловича [4] свидетельствуют о том, что большие избытки алюмогидрида лития не оказывают благоприятного влияния на выход аминов и что реакция при нормальных условиях, т. е. с незначительным избытком алюмогидрида (в пределах 25—30%), идет количественно, однако наши наблюдения показали, что в случае применения незначительных избытков алюмогидрида лития амины получаются с низкими выходами. Поэтому для восстановления одного моля монозамещенных амидов бралось два моля алюмогидрида, а для дизамещенных амидов—1,2 моля. Установлено, что монозамещенные амиды даже в присутствии больших избытков алюмогидрида лития восстанавливаются труднее дизамещенных; при этом часть не восстановленных амидов извлекается обратно.

В литературе есть указание, что нагревание реакционной смеси обеспечивает максимальный выход. Так, восстановление ацетанилида алюмогидридом лития, взятым с 200% избытком, приводит к образованию N-этиланилина, в случае нагревания реакционной смеси в течение 1 часа—с выходом 72% и при удлинении продолжительности нагревания до 5 часов—с выходом до 93% [4].

Восстановление N-циклогексилацетанилида при нагревании в течение одного часа обеспечивает выход амина в 39%, при 24-часовом нагревании в 82% и 36-часовом нагревании—88% теории.

Такая же закономерность наблюдалась и у нас при восстановлении моно- и ди-N-замещенных амидов бензофуран-2-карбоновой кислоты. Если восстановление проводилось без нагревания, то почти больше половины амида извлекалось обратно и выход амина составлял 38—40% от теории. При нагревании реакционной смеси в течение 8 часов выход увеличивался до 50—52,5%; дальнейшее удлинение времени нагревания (18—20 часов) повышало выход до 69,5—80,5%.

Полученные нами моно-N-замещенные бензофурфуриламины были использованы в качестве исходных продуктов для получения несимметричных этилендиаминов и уретанов с целью изучения их фармакологических свойств. Из литературных данных известно, что бистретичные производные этилендиамина с разными алкил-, арил-, аралкил- и гетероциклическими остатками, а также их соли обладают сильным антигистаминным действием.

Синтез несимметричных этилендиаминов осуществлен взаимодействием N-алкил-2-бензофурфуриламинов с хлоргидратом хлорида диалкиламиноэтанола по следующей схеме:

Для получения уретанов N-алкил-2-бензофурфуриламины были введены в реакцию с метиловым эфиром хлоругольной кислоты в присутствии едкого натра:

В экспериментальной части описан общий для всех несимметричных этилендиаминов способ синтеза.

Некоторые физико-химические константы полученных N-алкил-2-бензофурфуриламинов и несимметричных этилендиаминов приведены в таблицах 1 и 2.

С целью изучения биологических свойств получены хлоргидраты, йодметилаты и йодэтилаты N-замещенных бензофурфуриламинов и несимметричных этилендиаминов, причем хлоргидраты и йодметилаты кристаллические, а йодэтилаты в основном гигроскопичны.

Экспериментальная часть

Метиламид бензофуран-2-карбоновой кислоты. В смесь 90 г (0,5 моля) хлорангидрида бензофуран-2-карбоновой кислоты и 400 мл абсолютного бензола при охлаждении пропускают ток сухого метиламина до привеса в 45 г, затем нагревают на водяной бане в течение 4—5 часов, отфильтровывают образовавшийся хлоргидрат метиламина, несколько раз промывают абсолютным бензолом. После отгонки растворителя остаток сливают в стакан; закристаллизовавшийся метиламид бензофуран-2-карбоновой кислоты отфильтровывают и промывают абсолютным эфиром. Выход 71,7 г (82,3%); т. пл. 104—105°.

Найдено %: С 68,25; Н 5,06; N 7,78

$\text{C}_{10}\text{H}_9\text{NO}_2$. Вычислено %: С 68,55; Н 5,17; N 7,99.

Этиламид бензофуран-2-карбоновой кислоты получен аналогично метиламиду. Выход 90,6%; т. кип. 155—158°/1 мм; т. пл. 67°.

Найдено %: С 70,12; Н 5,93; N 7,31

$\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{NO}_2$. Вычислено %: С 69,84; Н 5,87; N 7,40.

Диметил-, диэтиламиды бензофуран-2-карбоновой кислоты получены описанным в литературе методом [5].

Пиперидид бензофуран-2-карбоновой кислоты. К смеси 27 г (0,15 моля) хлорангидрида бензофуран-2-карбоновой кислоты и 50 мл абсолютного бензола при охлаждении льдом прибавляют 25,5 г (0,3 моля) пиперидина в 50 мл абсолютного бензола). Реакционную

смесь нагревают на водяной бане 4 часа, отфильтровывают хлоргидрат пиперидина, промывают абсолютным бензолом. После отгонки растворителя остаток перегоняют в вакууме.

Выход пиперидида бензофуран-2-карбоновой кислоты 29,3 г (85,4 %); т. кип. 192—194°/2 мм. При стоянии вещество кристаллизуется, т. пл. 65°.

Найдено %: С 73,25; Н 6,60; N 5,92
 $C_{14}H_{13}NO_2$. Вычислено %: С 73,34; Н 6,59; N 6,10.

Морфолид бензофуран-2-карбоновой кислоты получен так же, как и пиперидиламид. Выход 88,4%; т. кип. 212—215°/5 мм; т. пл. 94—95°.

Найдено %: С 67,42; Н 5,37; N 5,87
 $C_{13}H_{13}NO_2$. Вычислено %: С 67,51; Н 5,66; N 6,05.

N-Метил-2-бензофурфуриламин. В трехгорлую колбу, снабженную мешалкой, холодильником с хлоркальциевой трубкой, помещают 11,4 г (0,3 моля) алюмогидрида лития в 300 мл абсолютного эфира. При перемешивании маленькими порциями в течение 4 часов прибавляют 26,2 г (0,15 моля) метиламида бензофуран-2-карбоновой кислоты. После прибавления всего амида смесь нагревают на водяной бане 18—20 часов. Затем, при охлаждении колбы водой и перемешивании, по каплям прибавляют 30 мл воды. Осадок отфильтровывают, промывают эфиром. Соединенные фильтраты высушивают над безводным сернокислым натрием, отгоняют растворитель и остаток перегоняют в вакууме.

Выход N-метил-2-бензофурфуриламина 16,2 г (65,8 %); т. кип. 106—108°/3 мм; обратно получается 4,2 г невосстановленного амида.

N-Этил-, диметил- и диэтил-2-бензофурфуриламины, а также N-(2-бензофурфурил)-пиперидин и -морфолин получены аналогично N-метил-2-бензофурфуриламину, с той разницей, что бензольные растворы амидов добавляют к эфирному раствору алюмогидрида лития.

N'-Алкил - N' - 2-бензофурфурил - N, N-диалкилэтилендиамины. Смесь 0,1 моля хлоргидрата диалкиламиноэтилхлорида и 0,2 моля N-алкил-2-бензофурфуриламина нагревают на сплаве Вуда при температуре 145—150° в течение 6—8 часов, затем, после обработки 10 %-ным раствором едкого натра, продукт реакции экстрагируют эфиром и высушивают над безводным сернокислым натрием. После отгонки растворителя остаток перегоняют в вакууме. Температуры кипения полученных соединений приведены в таблице 2.

Метиловый эфир N-метил-2-бензофурфурилкарбаминовой кислоты. При механическом перемешивании к эфирному раствору N-метил-2-бензофурфуриламина (0,1 моля в 100 мл) одновременно прибавляют 0,1 моля метилового эфира хлоругольной кислоты в 50 мл абсолютного эфира и через холодильник 25—30 %-ный раствор (0,1—0,15 моля) едкого натра. Смесь перемешивают при комнатной температуре до исчезновения кристаллического хлоргидрата амина. Эфир-

R	Выход в %	Т. кип. в °С	Давление в мм	d ₄ ²⁰	n _D ²⁰	M _{RD}		Анализ в %				Т. пл. соед в °С		
						вычислено	найдено	С	Н	Cl	N	хлор-гидратов	водне-гидратов	полэти-латов

NHCH ₃	65,8	106—108	3	1,0877	1,5675	47,35	48,44	74,50	74,45	6,87	6,99	8,68	8,43	170—171	120—122	—
NHC ₂ H ₅	68,8	127—130	5	1,0859	1,5575	51,97	52,95	75,39	75,16	7,12	7,47	8,02	8,38	173—174	105	110—112
N(CH ₃) ₂	90,5	112—113	5	1,0388	1,5455	53,83	53,37	75,39	75,33	7,42	7,70	8,02	8,31	170—171	190	153
N(C ₂ H ₅) ₂	85,6	127—128	3	1,0167	1,5360	61,54	62,32	76,84	76,57	8,37	8,12	6,89	6,59	157—158	130—131	—
	78,6	142—143	2	1,0648	1,5585	63,96	65,21	78,10	78,35	7,95	7,95	6,51	6,25	—	174	—
	79,8	152—154	1	—	—	—	—	71,86	71,59	6,96	6,92	6,44	6,30	233	177—179	—

Таблица 2

R=CH ₃	21	150—152	2	1,0432	1,5467	70,11	70,58	72,38	72,65	8,67	8,65	12,05	12,29	—	176—177	—
R=CH ₃	32	150—152	1	1,0385	1,5416	74,52	74,72	73,13	73,16	9,00	8,88	11,45	11,36	—	180—181	—
R=C ₂ H ₅	67,9	149—150	1	1,0029	1,5270	79,34	79,80	73,80	73,89	9,29	9,41	10,75	10,54	—	153—154	165—166
R=C ₂ H ₅	55,7	150—151	1	1,0030	1,5140	81,12	82,36	74,40	74,55	9,55	9,40	10,20	10,44	—	143—144	174

ный слой отделяют, водный дважды экстрагируют эфиром. Эфирные экстракты высушивают над безводным сернокислым натрием, отгоняют растворитель и остаток перегоняют в вакууме.

Выход метилового эфира N-метил-2-бензофурфурилкарбаминовой кислоты 13,7 г (62,5 %); т. кип. 153—154°/2 мм; d_4^{20} 1,1677; n_D^{20} 1,5480.

Найдено %: С 65,90; Н 5,61; N 6,38
 $C_{13}H_{13}NO_3$. Вычислено %: С 65,74; Н 5,97; N 6,38.

Метилловый эфир N-этил-2-бензофурфурилкарбаминовой кислоты получен аналогично N-метильному производному. Выход его составляет 85,8 %; т. кип. 160—161°/3 мм; d_4^{20} 1,1470; n_D^{20} 1,5408.

Найдено %: С 65,75; Н 6,39; N 6,14
 $C_{13}H_{15}NO_3$. Вычислено %: С 66,93; Н 6,48; N 6,00.

В ы в о д ы

1. Синтезирован ряд моно- и ди-N-замещенных амидов бензофуран-2-карбоновой кислоты. Изучено их восстановление в соответствующие амины алюмогидридом лития.

2. Получено 6 N-замещенных бензофурфуриламинов, 4 несимметричных этилендиамина и 2 уретана, не описанных в литературе.

Институт тонкой органической химии
 АН Арм ССР

Поступило 15 I 1960

Ս. Լ. ՄԵՋՈՅԱՆ, Մ. Լ. ԿԱԼԴՐԻԿՅԱՆ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՅՑՈՒՆՆԵՐ ԲԵՆԶՈՖՈՒՐԱՆԻ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

Հաղորդում III. Բենզոֆուրան-2-կարբոնաթթվի մի քանի մեկ- և երկ-N-տեղակալված ամիդների սինթեզը և նրանց վերականգնումը լիթումի ալյումահիդրիդով

Ա մ փ ո փ ու մ

Հայտնի է, որ 2-ամինամեթիլ-2,3-դիհիդրոբենզոֆուրանի ածանցյալները բիոլոգիական տեսակետից ներկայացնում են որոշակի հետաքրքրություն: Ինչ վերաբերում է չվերականգնված ֆուրանի օղակով 2-ամինամեթիլ-բենզոֆուրանի ածանցյալներին, սպա նրանք համարյա չեն ուսումնասիրված, որը բացատրվում է այդ միացուկների ստացման դժվարություններով:

Հետաքրքիր էր զբաղվել 2-ամինամեթիլ-բենզոֆուրանների սինթեզի մեթոդների մշակմամբ, որոնցից մեկը կարող էր հանդիսանալ բենզոֆուրան-2-կարբոնաթթվի N-տեղակալված ամիդների վերականգնումը լիթումի ալյումահիդրիդով: Այդ նպատակով ստացված են բենզոֆուրան-2-կարբոնաթթվի մի շարք մեկ- և երկ-N-տեղակալված ամիդներ և ուսումնասիրված է նրանց վերականգնումը, լիթումի ալյումահիդրիդով մինչև համապատասխան

ամինները: Մեկտեղակալված ամիդների վերականգնման համար 1 մոլ ամիդին վերցված է 2 մոլ LiAlH_4 , իսկ երկտեղակալվածների դեպքում—1,2 մոլ: Ցույց է տրված, որ մեկտեղակալված ամիդները նույնիսկ LiAlH_4 -ի այդպիսի մեծ ավելցուկի դեպքում վերականգնվում են ավելի դժվարությամբ, քան երկտեղակալվածները: Մյուս կողմից, եթե վերականգնումը կատարվում է առանց տաքացնելու, ապա ամինի ելքը կազմում է 38—40%, Ռեակցիոն խառնուրդը 8 ժամ տաքացնելիս ելքը մեծանում է մինչև 50—52,5%, իսկ հետագա տաքացմամբ (18—20 ժամ)՝ մինչև 69,5—80,5%: Սինթեզված մեկ-N-տեղակալված-բենզոֆուրֆուրիլ ամիններն օգտագործված են որպես հլանյութեր ոչ սիմետրիկ էթրինդիամիններ և ուրեթաններ ստանալու համար: N-Տեղակալված-բենզոֆուրֆուրիլամինների և ոչ սիմետրիկ էթրինդիամինների բիոլոգիական հատկություններն ուսումնասիրելու նպատակով ստացված են ջրում լուծելի նրանց աղերը՝ քլորհիդրատները, լողմեթիլատները և լողէթիլատները (աղ. 1, 2):

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Iomer, J. Pharm. chim. 20, 337 (1934); D. Bovet, A. Simon, C. r. soc. biol. 117, 958 (1934); 116, 842 (1934); Arch. Intern. pharmacodyn. 52, 413 (1936); E. Fournsau, D. Bovet, P. Maderni, C. r. soc. biol. 115, 1215 (1934); J. Jacob, Arch. Intern. pharmacodyn. 101, 446 (1955).
2. M. Polonovski, C. r. 240, 319 (1955); H. Schmitt, C. r. 240, 2456 (1955).
3. R. Gaertner, J. Am. Chem. Soc. 73, 4400 (1951).
4. V. M. Micovic, M. Michailovic, J. Org. Chem. 18, 1190 (1953).
5. С. Г. Аветикян. Кандидатская диссертация, Ереван, 1948.