А. Л. Миджоян, С. Г. Агбалян

Синтезы на основе гармина и тетрагидрогармина

Сообщение III. Цианэтилирование тетрагидрогармина и гармина

Вскоре после установления структуры эффективного гипотензивного алкалоида резерпина повсюду были начаты работы по синтезу его простых аналогов [1]. Целью этих исследований было выяснить, действительно ли активность резерпина зависит от строения всей молекулы или обуславливается наличием в ней отдельных групп.

В настоящей работе приводятся данные о синтезе продуктов цианэтилирования тетрагидрогармина и гармина, которые интересовали нас, поскольку нитрильная группа представляет широкие возможности для дальнейшего синтеза простых аналогов резерпина, содержащих β -карболиновый фрагмент структуры алкалоида.

Необходимо отметить, что до сих пор решены далеко не все вопросы, связанные с цианэтилированием азотосодержащих соединений. Для конденсированных систем типа α - и β -карболинов, которые подобно тетрагидрогармину

содержат в молекуле два атома азота различного характера, в литературе не имелось никаких указаний. В то же время цианэтилирование пиперидина и индола, из которых образована циклическая система тетрагидрогармина, хорошо изучены. Известно, что пиперидин и его аналоги цианэтилируются чрезвычайно легко [2]. Соединения типа индола и карбазола цианэтилируются в присутствии щелочных катализаторов [3].

Вероятнее всего было предполагать, что тетрагидрогармин должен цианэтилироваться по азоту пиперидинового ядра. Однако первые опыты, поставленные нами с эквимолекулярными количествами акрилонитрила и тетрагидрогармина в бензоле и толуоле в присутствии едкого кали, были безуспешными: в этих условиях тетрагидрогармин не реагировал с акрилонитрилом. Изменение условий реакции, а именно взаимодействие тетрагидрогармина с избытком акрилонитрила в присутствии едкого кали без применения растворителей, привело к получению продукта моноцианэтилирования. Довольно легко тетрагидро-

гармин цианэтилировался в избытке акрилонитрила и без катализатора, причем полученный продукт оказался идентичным веществу, полученному в присутствии едкого кали. В их инфракрасных спектрах имеется частота, характерная для нитрильной группы (2270 см^{-1}). Таким образом, можно было заключить, что цианэтилировался азот пиперидинового ядра, хотя бы потому, что цианэтилирование по индольному азоту невозможно без применения щелочных катализаторов:

Тем не менее, для подтверждения этого предположения нам казалось необходимым проверить реакционную способность индольного азота в β -карболиновой системе по отношению к акрилонитрилу. Удобным объектом для этой цели является гармин. Наши опыты показали, что гармин цианэтилируется довольно трудно: он не реагирует с акрилонитрилом в присутствии сухого едкого кали в избытке акрилонитрила при температуре кипения последнего, а также при нагревании в запаянной трубке до 150° , приводящем к полимеризации акрилонитрила. Реакция не идет и в присутствии 40%-ного водного раствора едкого кали. Лишь при применении в качестве катализатора гидроокиси триметилбензиламмония (Тритон В) был получен с почти количественным выходом продукт цианэтилирования гармина Ind-N-(β -цианэтил)гармин (нитрильной группе отвечает характерная частота 2275 см^{-1}):

Эти данные являются веским доказательством того, что цианэтилирование тетрагидрогармина, идущее без катализаторов, а также в присутствии едкого кали, происходит исключительно по азоту пиперидинового ядра с образованием Ru-N-(β -цианэтил) тетрагидрогармина.

Ru-N-(β -цианэтил)тетрагидрогармин и Ind-N-(β -цианэтил)гармин были омылены до соответствующих кислот: Ru-N-(β -карбоксиэтил)-тетрагидрогармина и Ind-N-(β -карбоксиэтил)гармина.

При щелочном гидролизе Ind-N-(β -цианэтил)гармина был получен и выделен в виде хлоргидрата Ind-N-(β -карбоксиэтил)гармин

(1750 см^{-1}). В аналогичных условиях не удалось омылить $\text{Ru-N-(}\beta\text{-цианэтил)тетрагидрогармин}$. Неожиданно продуктом гидролиза оказался не $\text{Ru-N-(}\beta\text{-карбоксиил)тетрагидрогармин}$, а тетрагидрогармин. Подобное же явление наблюдали Рапорт, Смит и Ньюман [4] при попытке осуществить щелочной гидролиз алкилмеркаптопропионитрилов:

Децианэтирование $\text{N-цианэтилированных } \alpha\text{-аминокислот}$ изучали Буцкус и Денис [5].

При кислотном же гидролизе не происходит отщепления акрилонитрила. Исходя из имеющихся данных, мы провели гидролиз продуктов цианэтилирования в смеси уксусной и серной кислот, хотя приходилось опасаться деметилирования гармина и тетрагидрогармина. Результаты опытов показали, что кислотный гидролиз приводит к образованию $\text{Ru-N-(}\beta\text{-карбоксиил)тетрагидрогармина}$ (1700, 1718, 1740 см^{-1})*, выделенного нами в виде хлоргидрата и $\text{Ind-N-(}\beta\text{-карбоксиил)гармина}$ (1750 см^{-1}), выделенного в виде сернокислой соли. Таким образом, при этих условиях гидролиза деметилирования не произошло:

Идентичность продуктов омыления с веществами, полученными встречным синтезом, совершенно бесспорно доказала бы строение продуктов цианэтилирования гармина и тетрагидрогармина.

* Карбоксильной группе в $\text{Ru-N-(}\beta\text{-карбоксиил)тетрагидрогармине}$ отвечает 3 интенсивные частоты.

Взаимодействием тетрагидрогармина с β -хлорпропионовой кислотой был получен Ру-N-(β -карбоксиил) тетрагидрогармин (1700, 1718, 1740 см^{-1}):

Ind-N-(β -карбоксиил)гармин (1750 см^{-1}) был получен взаимодействием гармин-калия с β -хлорпропионовой кислотой:

Идентичность продуктов гидролиза с кислотами, полученными прямым синтезом, подтверждена элементарным анализом, определением температур плавления и данными инфракрасной спектроскопии.

Рис. 1. Инфракрасный спектр Ру-N (β -цианэтил) тетрагидрогармина.

Рис. 2. Инфракрасный спектр Ind-N (β -цианэтил)гармина.

Рис. 3. Инфракрасный спектр хлоргидрата Ру-N (β -карбоксиитил) тетрагидрогармина.

Рис. 4. Инфракрасный спектр хлоргидрата Ind-N (β -карбоксиитил) гармина.

Экспериментальная часть

Ру-N-(β -цианэтил) тетрагидрогармин. А. В круглодонной колбе с обратным холодильником нагревали на водяной бане 2,16 г (0,01 моля) тетрагидрогармина, 4 мл акрилонитрила, 60 мг едкого кали. Через 8 часов смесь, ставшую прозрачной густой массой желтого цвета, растворили в 40%-ном горячем этиловом спирте. При медленном охлаждении осели светло-кремовые пластинки с т. пл. 81°. Выход 2,3 г. Вещество содержит одну молекулу кристаллизационной воды. При расплавлении она удаляется, но на воздухе вещество снова образует кристаллогидрат Ру-N-(β -цианэтил)тетрагидрогармина:

Найдено %: С 66,49; Н 7,68; N 14,91
 $C_{16}H_{19}ON_3 \cdot H_2O$. Вычислено %: С 66,87; Н 7,63; N 14,63.

Б. В круглодонной колбе нагревали те же количества тетрагидрогармина и акрилонитрила. Выход Ру-N-(β -цианэтил)тетрагидрогармина 2,4 г, т. пл. 81°.

Хлоргидрат получили действием эфирного раствора хлористого водорода на спиртовый раствор Ру-N-(β -цианэтил)тетрагидрогармина. Выпавший белый осадок плавится при 105° (с разложением), содержит молекулу кристаллизационной воды.

Найдено %: Cl 11,12; С 60,04; Н 7,01; N 12,75
 $C_{16}H_{18}O \cdot N_3Cl \cdot H_2O$. Вычислено %: Cl 10,99; С 59,53; Н 7,18; N 13,01.

Пикрат, полученный взаимодействием спиртовых растворов Ру-N-(β -цианэтил)тетрагидрогармина^а и пикриновой кислоты, представляет собою красные кристаллы; содержит 1 молекулу кристаллизационной воды, т. пл. 178—179° (разлож.).

Найдено %: С 51,42; Н 4,85; N 16,29
 $C_{22}H_{22}O_3N_6 \cdot H_2O$. Вычислено %: С 51,21; Н 4,69; N 16,28.

Ind-N-(β-цианэтил)гармин. В колбе с обратным холодильником нагревали 2,12 г гармина, 4 мл акрилонитрила и 4 мл 7%-ного раствора гидроокиси триметилбензиламмония. При нагревании на водяной бане гармин полностью растворился, затем выпал объемистый белый осадок. Через 2 часа колбу охладили, добавили 100 мл воды и отфильтровали белые чешуйчатые кристаллы. Выход 2,5 г. После перекристаллизации из 95%-ного этилового спирта получили 2,35 г *Ind-N-(β-цианэтил)гармина* с т. пл. 202—203°.

Найдено %: С 72,30; Н 5,69; N 15,30
 $C_{16}H_{10}ON_3$. Вычислено %: С 72,27; Н 5,65; N 15,16.

Хлоргидрат. Белые кристаллы после переосаждения из метанола эфиром. Содержит молекулу кристаллизационной воды, т. пл. 270° (с разлож.).

Найдено %: С 51,05; Н 6,69; Cl 11,67; N 13,71
 $C_{16}H_{16}O_2N_3Cl \cdot H_2O$. Вычислено %: С 51,57; Н 6,62; Cl 11,66; N 13,80.

Пикрат—желтые кристаллы с т. пл. 219—220°. Содержит 1 молекулу кристаллизационной воды.

Найдено %: С 51,87; Н 4,27; N 16,66
 $C_{22}H_{18}O_3N_6 \cdot H_2O$. Вычислено %: С 51,60; Н 3,95; N 17,00.

Щелочной гидролиз Ру-N-(β-цианэтил)тетрагидрогармина. В колбе нагревали смесь 2,87 г (0,01 моля) *Ру-N-(β-цианэтил)тетрагидрогармина* и 10 мл 10%-ного раствора едкого кали. Через 2 часа маслянистый слой исчез, образовались нерастворимые в воде кристаллы. Их отфильтровали, промыли водой, т. пл. 199°. Смешанная проба не дает депрессии с тетрагидрогармином.

Кислотный гидролиз Ру-N-(β-цианэтил)тетрагидрогармина. В круглодонной колбе нагревали 2,87 г тетрагидрогармина со смесью 1,8 мл концентрированной серной кислоты, 4 мл ледяной уксусной кислоты и 3,5 мл воды. После десятичасового кипячения нейтрализовали образовавшийся раствор гидроокисью аммония и выпарили досуха. Для очистки от неорганических солей остаток обработали сухим метанолом, отфильтровали от нерастворившихся солей и выпарили метанол; эту операцию повторили дважды. Метанольный раствор подкислили эфирным раствором хлористого водорода и осадили образовавшийся хлоргидрат абсолютным эфиром. После трехкратного переосаждения метанольного раствора эфиром образовались зелено-черные кристаллы, плавящиеся с разложением в пределах 235—245°. Выход 1,65 г.

Найдено %: С 57,52; Н 6,87; N 8,76; Cl 10,82
 $C_{16}H_{23}O_3N_2Cl$. Вычислено %: С 57,14; Н 6,81; N 8,61; Cl 10,86.

Щелочной гидролиз Ind-N-(β-цианэтил)гармина. В круглодонную колбу поместили 1,35 г (0,005 моля) *Ind-N-(β-цианэтил)гармина*

и избыток 10%-ного раствора едкого кали (10 мл). Смесь кипятили 4 часа, после охлаждения подкислили соляной кислотой до кислой реакции на конго, прозрачный раствор выпарили в фарфоровой чашке на водяной бане. Из остатка абсолютным этанолом извлекли хлоргидрат и дважды переосадили его из спирта эфиром. Получено 0,65 г вещества с т. пл. 273°.

Найдено %: С 60,38; Н 5,72; N 8,55; Cl 11,10
 $C_{16}H_{18}O_3N_2Cl$. Вычислено %: С 59,77; Н 5,64; N 8,98; Cl 11,04.

Кислотный гидролиз Ind-N-(β-цианэтил)гармина. В круглодонной колбе нагревали 2,65 г (0,01 моля) Ind-N-(цианэтил)гармина и смесь 1,8 мл концентрированной серной кислоты, 4 мл уксусной кислоты и 3,5 мл воды. После восьмичасового кипячения отфильтровывали кристаллический продукт розового цвета с т. пл. 225°. Выход 2,45 г.

Найдено %: С 49,78; Н 4,85; N 7,21; Cl 8,34
 $C_{16}H_{18}O_7N_2S$. Вычислено %: С 50,16; Н 5,00; N 7,31; Cl 8,36.

Хлоргидрат Ind-N-(β-карбоксиил) гармина. 2,12 г (0,01 моля) гармина кипятили 6 часов с 0,16 г (0,15 моля) едкого кали в 35 мл сухого ксилола. Затем к образовавшемуся гармин-калию прибавили 2,7 г (0,025 моля) β-хлорпропионовой кислоты и кипятили еще 6 часов. Образовавшийся кристаллический продукт отфильтровали, промыли водой, высушили и растворили в метаноле. Действием эфирного раствора хлористого водорода получили белые кристаллы хлоргидрата Ind-N-(β-карбоксиил)гармина с т. пл. 273°, выход 2,1 г.

Найдено %: С 59,59; Н 5,81; N 9,29; Cl 11,10
 $C_{10}H_{18}O_3N_2Cl$. Вычислено %: С 59,77; Н 5,64; N 8,98; Cl 11,03.

Хлоргидрат Ру-N-(β-карбоксиил) тетрагидрогармина. 4,32 г (0,02 моля) тетрагидрогармина кипятили 12 часов с 1,08 г (0,01 моля) β-хлорпропионовой кислоты в сухом ксилоле. По охлаждении отфильтровывали хлоргидрат тетрагидрогармина. Ксилол испарили до объема в 5 мл, разбавили сухим эфиром и отфильтровывали еще некоторое количество хлоргидрата тетрагидрогармина. Хлоргидрат Ру-N-(β-карбоксиил)тетрагидрогармина получили из фильтрата действием эфирного раствора хлористого водорода. Хлоргидрат после двукратного переосаждения из сухого метанола абсолютным эфиром выпадает в виде зеленого порошка. Выход 1,7 г. Плавится с разложением в пределах 235—245°.

Найдено %: С 56,88; Н 6,87; N 8,72; Cl 10,87
 $C_{16}H_{22}O_3N_2Cl$. Вычислено %: С 57,14; Н 6,81; N 8,61; Cl 10,81.

В ы в о д ы

1. Проведено цианэтирование гармина в присутствии гидрооксидтриметилбензиламмония; получен Ind-N-(β-цианэтил)гармин и омылен в Ind-N-(β-карбоксиил)гармин.

2. Доказано, что тетрагидрогармин цианэтилируется по азоту пиперидинового ядра с образованием $\text{Py-N-(}\beta\text{-цианэтил)тетрагидрогармина}$, который далее был омылен в $\text{Py-N-(}\beta\text{-карбоксиил)тетрагидрогармин}$.

3. Строение синтезированных кислот доказано встречным синтезом.

Институт тонкой органической химии
АН АрмССР

Поступило 22 V 1960

Ս. Լ. ՄՆՋՅՈՅԱՆ, Ս. Գ. ԱԳԲԱԿՅԱՆ

ՍԻՆԹԵԶՆԵՐ ՀԱՐՄԻՆԻ ԵՎ ՏԵՏՐԱԶԻԴՐՈՀԱՐՄԻՆԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ

Հաղորդում III. Հարմինի և տետրահիդրոհարմինի ցիանէթիլումը

Ա մ փ ո փ ու մ

Ներկա աշխատանքում բերվում են տվյալներ հարմինի և տետրահիդրոհարմինի ցիանէթիլման ռեակցիայի մասին:

Հարմինի և տետրահիդրոհարմինի ցիանէթիլված ածանցյալները մեզ հետաքրքրում էին այն կապակցությամբ, որ նիտրիլային խումբը մեծ հնարավորություններ է տալիս հետագայում սինթեզելու β -կարբոլինային հատված պարունակող ռեզերպինի պարզ անալոգներ:

Հարկավոր է նշել, որ α և β -կարբոլինների տիպի կոնդենսված սիստեմների համար, որոնք տետրահիդրոհարմինի նման մոլեկուլի մեջ պարունակում են ազոտի երկու տարբեր բնույթի ատոմներ, ցիանէթիլման վերաբերյալ գրականություն մեջ ցուցումներ չկան:

Փորձերը ցույց տվեցին, որ տետրահիդրոհարմինը ցիանէթիլվում է միայն պիպերիդինային ազոտի հաշվին, կատալիզատորի բացակայությամբ, գոյացնելով $\text{Py-N-(}\beta\text{-ցիանէթիլ)տետրահիդրոհարմին}$:

Հարմինը ցիանէթիլվում է միայն տրիմեթիլբենզիլամոնիումի հիդրօքսիդի (տրիտոն В) ներկայությամբ, գոյացնելով $\text{Ind-N-(}\beta\text{-ցիանէթիլ)հարմին}$:

Ցիանէթիլման պրոդոկտները սապոնացված են մինչև համապատասխան թթուները $\text{Py-N-(}\beta\text{-կարբօքսիէթիլ)տետրահիդրոհարմին}$ և $\text{Ind-N-(}\beta\text{-կարբօքսիէթիլ)հարմին}$:

Ստացված թթուների կառուցվածքն ապացուցված է վերջիններիս սինթեզով—տետրահիդրոհարմինից ու β -քլորպրոպիլոնաթթվից և, համապատասխանաբար՝ հարմին, կալիումից և β -քլորպրոպիլոնաթթվից:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. M. Protiva, Z. J. Vejslek, Coll. 8, 3978 (1959); пат. США 2,850, 501 [С. А. 53, 12309g (1959)]; пат. США 2,759,000 [С. А. 51, 3669 (1957)]; М. В. Рубцов, Л. Н. Яхотков, Д. М. Краснокутская, ЖОХ 29, 3269 (1959); Н. И. Корвцакая, А. В. Данилова, М. М. Уткин, ЖОХ 27, 542 (1957).
2. А. П. Терентьев, Е. Терентьева, ЖОХ 12, 415 (1942).
3. А. П. Терентьев, А. Н. Кост, Реакции и методы исследования органических соединений 2. Госхимиздат, Москва, 1952, 84.
4. L. Rapoport, A. Smith, M. S. Newman, J. Am. Chem. Soc. 69, 693 (1947).
5. Г. Ф. Буцкус, Г. И. Денис, ЖОХ 30, 1317 (1960).