В. Д. Азатян, Г. Т. Есаян и Г. А. Галоян

Исследования в области эфиров сульфокислот

Сообщение VIII. Синтез *n*-хлорфениловых эфиров некоторых алифатических и циклоалифатических сульфокислот

Ранее нами были синтезированы для испытания на акарцидно-инсектицидную активность *n*-хлорфениловые эфиры некоторых алифатических, а также γ -хлоркротил- и бензилсульфокислот [1]:

n -RSO₂C₆H₄Cl, где

R=C₂H₅, *n*-C₃H₇, *n*-C₄H₉, изо-C₄H₉, CH₂CCl=CHCH₂ и C₆H₅CH₂.

Поскольку некоторые из этих эфиров, по предварительным данным, оказались обладающими высокой акарцидной активностью, то мы сочли интересным просинтезировать для биологического испытания также некоторые другие члены гомологического ряда *n*-хлорфениловых эфиров алифатических сульфокислот с содержанием большего числа атомов углерода в сульфокислотном радикале: *n*-пентан-, изо-пентан-, *n*-гексан- и *n*-октансульфокислот.

Нам показалось также интересным просинтезировать *n*-хлорфениловые эфиры циклопентан- и циклогексансульфокислот для сравнения их активности с активностью соответствующих эфиров алкансульфокислот с одинаковым содержанием атомов углерода в сульфокислотном радикале и *n*-хлорфениловой эфир циклогексилметансульфокислоты—для сравнения его активности с таковой соответствующего эфира с ароматическим кольцом—бензилсульфокислоты.

Исходным материалом для синтеза нужных нам эфиров служили, как и ранее, фенол и хлорангидриды соответствующих сульфокислот. Фениловые эфиры алкан- и циклогексилметансульфокислот получены нами с выходами от 56,5 до 78%, эфиры циклансульфокислот—36—48%-ными выходами теоретического количества. Некоторые их константы и данные элементарного анализа представлены в таблице 1.

Эти эфиры затем хлорировались с образованием *n*-хлорпроизводных с выходом 61—84% от теории. Некоторые их константы и данные элементарного анализа представлены в таблице 2.

Таким образом, метод получения *n*-хлорфенилового эфира метансульфокислоты [2], ранее примененный нами для получения *n*-хлорфениловых эфиров алкансульфокислот путем хлорирования фениловых эфиров этих кислот при 100°, теперь нами распространен и на фениловые эфиры циклопентан-, циклогексан- и циклогексилметансульфокислот. На примере последних он оказался простым и удобным

Таблица 1

	Выход в %	Т. пл. в °С	Т. кип. в °С	Давление в мм	n_D^{20}	d_4^{20}	MRD		Анализ на S в %	
							найдено	вычислено	найдено	вычислено
$n-C_5H_{11}$	61	—	164—165	12	1,50100	1,13049	59,472	59,097	13,82	14,36
изо- C_5H_{11}	58,6	—	165—166	10	1,50187	1,12967	59,596	59,097	14,17	14,36
$n-C_6H_{13}$	78,3	—	168—170	4	1,49770	1,12290	63,228	63,715	13,10	13,23
$n-C_6H_{17}$	56,5	—	194—195	9,5	1,49490	1,07340	73,448	72,951	12,52	11,86
36,2	—	165—167	6	1,52680	1,22540	56,681	55,797	14,65	14,15
48	—	197—201	10	1,53320	1,19010	52,687	61,575	12,93	13,30
-CH ₂	60	74	—	—	—	—	—	—	13,01	12,50

также для получения с хорошими выходами *п*-хлорфениловых эфиров сульфокислот ряда цикланов и циклоалкилалканов.

Строение полученных *п*-хлорфениловых эфиров доказано на примере *п*-хлорфенилового эфира этансульфокислоты его омылением и получением при этом *п*-хлорфенола, температуры кипения и плавления которого совпали с приведенными в литературе [3].

Образцы синтезированных *п*-хлорфениловых эфиров переданы для испытания в Институт земледелия МСХ АрмССР. О результатах испытаний будет сообщено отдельно.

Экспериментальная часть

Исходные хлорангидриды сульфокислот были получены хлорированием в водной среде [4] соответствующих алкантиоцианатов, хлористоводородных солей циклоалканизоциомочевин и бромистоводородной соли циклогексанизоциомочевин, полученных нами по прописи для циклогексанизоциомочевин [5].

Для образования первых двух из названных солей

где

в отличие от хлористоводородных солей γ -хлоркритил- и бензил-изоциомочевин потребовалось 60-и часовое, а для бромистоводородной

R	Выход в %	Т. пл. в °С	Т. кип. в °С	Давл. в мм
$n\text{-C}_9\text{H}_{19}$	70	—	167—170	3
изо- C_9H_{19}	72,6	—	173—177	7
$n\text{-C}_{10}\text{H}_{22}$	61,3	—	192—195	4,5
$n\text{-C}_{11}\text{H}_{24}$	62	—	203—208	5
84,2	74—75	174	7—6
63	—	199—201	6
55	54—55	199—201	9

$\text{RSO}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{Cl-n}$

Таблица 2

n_D^{20}	d_4^{20}	MRD		Анализ в %			
		найдено	вычислено	Cl		S	
				найдено	вычислено	найдено	вычислено
1,5143	1,2338	64,123	63,964	—	—	12,15	12,21
1,5162	1,2290	64,574	63,964	12,84	13,07	12,28	12,21
1,5102	1,2149	68,1864	68,582	—	—	11,64	11,58
1,5079	1,1668	77,869	77,818	—	—	10,63	10,52
—	—	—	—	14,00	13,60	13,05	12,28
1,5497	1,3273	66,028	66,382	12,62	12,83	11,35	11,05
1,5370	1,2896	70,014	71	12,60	12,30	11,83	11,08

соли циклогексилметанизотиомочевины (выход 95%)—3—4-часовое кипячение с обратным холодильником.

Хлористоводородная соль циклопентанизотиомочевины и бромистоводородная соль циклогексилметанизотиомочевины не описаны в литературе. Это белые кристаллические вещества. Температура плавления первой соли 109—110°, второй соли 149—150°.

Не описаны в литературе также циклопентан- и циклогексилметансульфохлориды. Константы циклопентансульфохлорида: т. кип. 97—99°/6 мм; n_D^{20} 1,4850; d_4^{20} 1,3253. M_{R_D} найдено 36,567, вычислено 36, 50.

Циклогексилметансульфохлорид—бесцветные кристаллы, т. пл. 114—115°.

Циклопентанол был приготовлен нами гидрированием циклопентанона по Мейервейн-Понндорфу в условиях, указанных Слободиным и сотрудниками [6].

Циклогексилметанол получен из циклогексанола через циклогексилхлорид по реакции Гриньяра [7]. Действием PBr_3 из него был получен бромистый циклогексилметан [8].

Фениловые и п-хлорфениловые эфиры были получены методом, описанным нами ранее [1].

Омыление п-хлорфенилового эфира этансульфокислоты. 4 г эфира нагревались с 2,8 г КОН в 70%-ном водном растворе диоксана на водяной бане в течение 3-х часов. К полученной гомогенной реакционной жидкости было прибавлено 10 мл соляной кислоты. Выделившееся тяжелое масло, просушенное над безводным сульфатом магния, перегналось при 216°. Закристаллизовавшиеся при охлаждении льдом кристаллы плавилась при 40°.

По литературным данным, т. кип. п-хлорфенола 216°, т. пл. 41° [9].

В ы в о д ы

1. Синтезированы фениловые эфиры н-пентан-, изо-пентан-, н-гексан-, н-октан-, циклопентан-, циклогексан- и циклогексилметансульфокислот с выходом 36—78% теоретического количества.

2. Хлорированием полученных фениловых эфиров алкан- и циклоалкансульфокислот при 100° в присутствии следов йода получены соответствующие п-хлорзамещенные эфиры с выходами 61—84% от теории.

Строение полученных п-хлорфениловых эфиров доказано на примере эфира этансульфокислоты его омылением и получением п-хлорфенола.

3. На примере фениловых эфиров циклопентан-, циклогексан- и циклогексилметансульфокислот установлено, что примененный метод получения п-хлорфениловых эфиров алкансульфокислот вполне пригоден также для получения с хорошими выходами п-хлорфениловых эфиров циклансульфокислот.

4. Все упомянутые фениловые и п-хлорфениловые эфиры, хлористоводородная соль циклопентан- и бромистоводородная соль циклогексилметанизотиомочевины, а также циклопентан- и циклогексилметансульфохлориды нами описываются впервые.

Институт органической химии
АН АрмССР

Поступило 29 XI 1960

Վ. Դ. Ազաթյան, Հ. Զ. Եսայան, Գ. Ս. Գալոյան

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍՈՒԼՖՈՅԹՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՐՈՒՄ

Հաղորդում VIII: Մի քանի ակիֆատիկ և ցիկլոպլիֆատիկ սուլֆոթթուցների պ-բրոմֆենիլային էսթերների սինթեզ

Ա մ փ ո փ ու լ մ

Նախկինում մենք սինթեզել և փորձարկման էինք հանձնել մի քանի արկանսուլֆոթթուցների պ-բրոմֆենիլային էսթերներ, որոնցից մի քանիսը, ըստ նախնական փորձարկման տվյալների, ցույց են տվել ակարիցիդային բարձր ակտիվություն:

Մենք հետաքրքիր համարեցինք սինթեզել և փորձարկման հանձնել սուլֆոթթուցային ռադիկալում պեղի մեծ թվով ածխածնային ատոմներ (C₅—C₆) պարունակող նույն շարքի էսթերների նաև մի քանի այլ ներկայացուցիչներ, ինչպես և ցիկլոպլենտան- և ցիկլոհեքսան սուլֆոթթուցների պ-բրոմֆենիլային էսթերները՝ նրանց ակտիվությունը նույն քանակով ածխածնային ատոմներ պարունակող համապատասխան արկանսուլֆոթթուցների պ-բրոմֆենիլային էսթերների ակտիվության հետ համեմատելու նպատակով, և ցիկլոհեքսիլմեթանսուլֆոթթուցի պ-բրոմֆենիլային էսթերը՝ նրա ակտիվությունը բենզիլսուլֆոթթուցի համապատասխան էսթերի ակտիվության հետ համեմատելու նպատակով:

Արկան- և ցիկլոհեքսիլմեթանսուլֆոթթուցների ֆենիլային էսթերներն ստացել ենք տեսականի 56,5—78⁰/₀, ցիկլանսուլֆոթթուցներինը՝ 36—48⁰/₀, իսկ պ-բրոմֆենիլային էսթերներինը՝ 61—84⁰/₀ ելքերով: Բոլոր միացություններն մի քանի ֆիզիկաքիմական հաստատունները բերված են 1 և 2 աղյուսակներում:

Ներկա աշխատանքով արկանսուլֆոթթուցների պ-բրոմֆենիլային էսթերներ սինթեզելու համար առաջներում մեր կիրառված մեթանսուլֆոթթուցի պ-բրոմֆենիլային էսթերների ստացման մեթոդը մենք տարածել ենք նաև ցիկլոպլենտան-, ցիկլոհեքսան- և ցիկլոհեքսիլմեթան սուլֆոթթուցների ֆենիլային էսթերների վրա և նրանց օրինակի վրա ցույց տվել, որ այդ մեթոդը պարզ և հարմար դուրս էկալ լավ ելքերով նաև ցիկլանների և ցիկլոպլիլկլանների սուլֆոթթուցների պ-բրոմֆենիլային էսթերներ ստանալու համար:

Ստացված պ-բրոմֆենիլային էսթերներին կառուցվածքն ապացուցել ենք էթանսուլֆոթթուցի պ-բրոմֆենիլային էսթերի սինթեզի վրա՝ նրա օճառացմամբ և պ-բրոմֆենոլի ստացմամբ, որի հալման և եռման ջերմաստիճանները համընկնում են գրականության մեջ նշված տվյալներին:

Ստացված բոլոր միացությունները նկարագրվում են առաջին անգամ:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. В. Д. Азатян, Г. Т. Есаян, Изв. АН АрмССР, ХН 11, 369 (1958).
2. Л. Г. Вольфсон С. Д. Володкович, Н. Н. Мельников, И.М. Рублева, ЖОХ 26, 2579 (1956).
3. Словарь орг. соед. 1. ИЛ, Москва, 1959, 518.
4. Т. В. Johnson, J. B. Douglass, J. Am. Chem. Soc. 61, 2548 (1939); Т. В. Johnson, J. M. Sprague, J. Am. Chem. Soc. 58, 1348 (1936); J. M. Sprague, Т. В. Johnson, J. Am. Chem. 59, 1837, 2439 (1937); С. Ziegler, J. M. Sprague, J. Org. Chem. 18, 621 (1951); Science 83, 528 (1938).
5. J. M. Sprague, Т. В. Johnson, J. Am. Chem. Soc. 59, 1837 (1937).
6. Я. М. Слободин, М. Л. Блинова, Н. И. Девятова, ЖОХ 24, 1639 (1954).
7. Синтезы орг. препаратов 1. ИЛ, Москва, 515, 1949.
8. D. Perlman, D. Davidson, M. T. Bogert, J. Org. Chem. 1, 288 (1936).
9. Dubois, Jahresber. über d. Fortschr. d. Chemie 1888, 283.