С. Г. Агбалян

Изучение реакции децианэтилирования в ряду 1,2,3,4-тетрагидро- β -карболинов

Ранее нами было показано, что при попытке получения Ру-N-(β -карбокситил)-тетрагидрогармина щелочным гидролизом Ру-N-(β -цианэтил)-тетрагидрогармина был неожиданно получен тетрагидрогармин, т. е. произошла реакция децианэтилирования [1]:

В тех же условиях щелочного гидролиза Ind-N-(β -цианэтил)-гармин не подвергался децианэтилированию. В условиях кислотного гидролиза оба вещества гладко превращались в соответствующие кислоты, т. е. не претерпевали децианэтилирования.

Реакция децианэтилирования сравнительно мало изучена, но она характерна не только для веществ, цианэтилированных по азоту. В настоящее время имеются данные о децианэтилировании по сере, кислороду и углероду.

Децианэтилирование может быть осуществлено различными средствами: пиролизом, восстановлением, действием воды, едких щелочей, органических соединений на продукты цианэтилирования.

Известно несколько случаев децианэтилирования гетероциклических аминов, например, N-(β -цианэтил)-морфолина при каталитическом восстановлении [2]; N,N'-бис-(β -цианэтил)-дикетопиперазина—при кипячении с щелочными агентами [3].

Наши опыты показали, что Ру-N-(β -цианэтил)-тетрагидрогармин подвергается децианэтилированию также при кипячении в воде с анилином [4].

Попытка децианэтилирования Ind-N-(β -цианэтил)-гармина в тех же условиях не увенчалась успехом.

Хорошо известно, что в условиях щелочного гидролиза N-(β -цианэтил)-пиперидин легко превращается в N-(β -карбокситил)-пиперидин [5].

В то же время Ру-N-(β -цианэтил)-тетрагидрогармин, в основе которого лежит циклическая система пиперидиндола (тетрагидропиперидиндола), подвергается реакции децианэтилирования.

Казалось вероятным, что подобная разница может быть вызвана лабилизирующим влиянием электронодонорной α -метильной группы пиперидинового ядра тетрагидрогармина.

Для проверки этого предположения цианэтилированию был подвергнут тетрагидроноргармин, полученный нами из норгарминкарбоновой кислоты по следующей схеме:

При щелочном гидролизе $\text{Pu-N-(}\beta\text{-цианэтил)-тетрагидроноргармина}$ была получена кислота — $\text{Pu-N-(}\beta\text{-карбоксиил)-тетрагидроноргармин}$, образование которой подтверждается данными инфракрасной спектроскопии (полоса поглощения карбонильной группы при $\lambda = 1690 \text{ см}^{-1}$, а гидроксильной — $\lambda = 2700 \text{ см}^{-1}$).

Полученные данные дают право сделать вывод о том, что, действительно, α -метильная группа в тетрагидрогармине способствует реакции децианэтилирования.

По-видимому, механизм децианэтилирования $\text{Pu-N-(}\beta\text{-цианэтил)-тетрагидрогармина}$ сводится к разрыву N-C -связи под влиянием комбинированного эффекта электроноакцепторной нитрильной группы, вызывающей протонизацию водорода у α -углерода, а также скопления избыточного отрицательного заряда у азота пиперидинового ядра, обусловленного электронодонорным эффектом α -метильной группы.

Тэйлор и др. [6] полагают, что вода должна оказывать каталитический эффект при децианэтилировании, так как она служит переносчиком протона согласно следующему уравнению:

Смешанная проба с тетрагидрогармином не дала депрессии температуры плавления. Выход 0,7 г (62,5%).

В водном фильтрате пробой с бромной водой и розовым раствором перманганата определили наличие акрилонитрила.

Децианэтилирование Р_у-N-(β-цианэтил)-тетрагидрогармина в присутствии анилина. В колбе, снабженной механической мешалкой и холодильником, кипятили 2,89 г Р_у-N-(β-цианэтил)-тетрагидрогармина с 9,3 г анилина и 150 мл воды. После двадцатичасового кипячения отфильтровали образовавшиеся кристаллы с т. пл. 197°. Выход 0,6 г (26%). После перекристаллизации из спирта т. пл. 198—199° (лит. 199°—для тетрагидрогармина). Смешанная проба с тетрагидрогармином не дала депрессии (т. пл. 199°).

Норгармин получен из норгарминкарбоновой кислоты [7]. Последняя получена нами по Перкину и Робинзону [7] и имеет указанную ими т. пл. 258°. Корецкая, Данилов и Уткин нашли для нее т. пл. 234° [8].

Тетрагидроноргармин. 2,02 г норгармина с т. пл. 218° растворили в 300 мл абсолютного этилового спирта и восстановили при кипении 20 г металлического натрия. Добавили 200 мл воды, отогнали спирт почти нацело. Осевший тетрагидроноргармин отфильтровали, отмыли тщательно от щелочи, высушили и перекристаллизовали из спирта. Т. пл. 198°, выход 1,5 г (72,8%).

Найдено %: С 71,75; Н 6,40; N 13,95
 $C_{12}H_{14}ON_2$. Вычислено %: С 71,95; Н 6,98; N 13,86.

Пикрат—оранжевые легкие игольчатые кристаллы с т. пл. 232 (с разл.).

Найдено %: N 16,41
 $C_{18}H_{17}O_8N_3$. Вычислено %: N 16,26.

Р_у-N-(β-цианэтил)-тетрагидроноргармин. Взяли в реакцию 1,01 г тетрагидроноргармина и 5 мл акрилонитрила. После 4-часового кипячения и отгонки акрилонитрила в вакууме прибавили эфир, образовавшиеся кристаллы отфильтровали и промыли эфиром. После перекристаллизации из спирта получили 0,7 г вещества с т. пл. 192°.

Найдено %: С 70,27; Н 6,49; N 16,52
 $C_{15}H_{17}ON_2$. Вычислено %: С 70,61; Н 6,72; N 16,48.

Пикрат—кристаллы ярко-желтого цвета с т. пл. 276° (с разл.).

Найдено %: N 14,12
 $C_{21}H_{20}O_8N_6$. Вычислено %: N 14,47.

Хлоргидрат Р_у-N-(β-карбоксиэтил)-тетрагидроноргармина. 0,3 г Р_у-N-(β-цианэтил)-тетрагидроноргармина и 10 мл 10%-ного едкого кали кипятили 8—10 часов. Образовавшуюся однородную реакционную массу охладили, разбавили 100 мл воды и подкислили соляной кислотой до кислой реакции на конго.

При стоянии осели желтые кристаллы гидрата хлоргидрата Ру-N-(β-карбоксиэтил)-тетрагидроноргармина—0,21 г, т. пл. 249°.

Найдено %: С 54,50; Н 6,32; N 8,25; Cl 10,8
 $C_{15}H_{19}O_3N_2Cl \cdot H_2O$. Вычислено %: С 55,00; Н 6,40; N 8,52; Cl 10,80.

В ы в о д ы

1. С целью выяснения влияния α-метильной группы на прочность N—С-связи в Ру-N-(β-цианэтил)-тетрагидрогармине синтезирован Ру-N-(β-цианэтил)-тетрагидроноргармин и осуществлен его щелочной гидролиз.

2. Показано, что α-метильная группа делает связь N—С более лабильной к гидролитическому расщеплению.

Институт органической химии
 АН АрмССР

Поступило 25 IV 1961

Ս. Գ. Աղբալյան

**ԴԵՑԻԱՆԷԹԻԼՄԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՅԻ ՌԻՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
 1,2,3,4-ՏԵՏՐԱԶԻԴՐՈՒ-Բ-ԿԱՐԲՈԼԻՆՆԵՐԻ ՇԱՐՔՈՒՄ**

Ա մ ֆ ո ֆ ու լ մ

Ցույց է արված, որ հիմնալին հիդրոլիզի պայմաններում Ру-N-(β-ցիան-էթիլ)տետրահիդրոհարմինը, որի հիմքում ընկած է տետրահիդրոպիրիդին-դոլի ցիկլիկ սիստեմը, վեր է ածվում տետրահիդրոհարմինի, ալինքն տեղի է ունենում դեցիանէթիլման ռեակցիա:

Հալտնի է, որ նույն պայմաններում N-(β-ցիանէթիլ)պիրոլիդինը սապոնանում է մինչև թթու:

Թվում էր, թե այդ տարբերությունը կարող է կախված լինել տետրահիդրոհարմինի էլեկտրադոնոր α-մեթիլ խմբի ազդեցությունից:

Այդ ենթադրությունը ստուգելու համար մենք ցիանէթիլցիցինք տետրահիդրոհարմինը:

Հիմնալին հիդրոլիզի պայմաններում Ру-N-(β-ցիանէթիլ) տետրահիդրոնորհարմինից զույգացավ Ру-N-(β-կարբոքսիէթիլ) տետրահիդրոնորհարմին: Ստացված տվյալները մեզ իրավունք են տալիս եզրակացնելու, որ իրոք տետրահիդրոհարմինի α-մեթիլ խումբը նպաստում է դեցիանէթիլմանը:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. А. Л. Миджоян, С. Г. Агбалаян, Изв. АН АрмССР, ХН 13, 297 (1960).
 2. O. Bayer, Angew. Chem. 61, 229 (1949).
 3. П. Ф. Буцкус, ЖОХ 30, 1814 (1960).
 4. П. Ф. Буцкус, ЖОХ 30, 1321 (1960).
 Известия XIV, 3—7

5. А. П. Терентьев, А. Н. Кост, Реакции и методы исследования органических соединений 2. Госхимиздат, Москва, 1952, 47.
6. K. M. Taylor, W. H. Selzer, P. D. Montgomery, R. A. Hughes, J. Am. Chem. Soc. **81**, 5333 (1959).
7. W. H. Perkin, R. Robinson, J. Chem. Soc. **1912**, 1775.
8. Н. И. Корецкая, А. В. Данилов, Л. М. Уткин, ЖОХ **27**, 542 (1957).