О. Л. Миндзян и Н. М. Морозова

Исследования в области синтеза производных простых аминоэфиров

Сообщение IV. Диалкиламиноэтиловые эфиры некоторых
о-,*м*-алкоксибензгидролов

В предыдущем сообщении [1] описаны некоторые аминоэфиры *п*-алкоксибензгидролов. Фармакологические исследования хлоргидратов этих аминоэфиров показали, что с удлинением алкильного

радикала (R) алкоксильной группы, как уже было отмечено, происходит постепенное снижение антигистаминной активности. Однако эта закономерность нарушается при переходе от диметиламиноэтиловых ($R' = \text{CH}_3$) к диэтиламиноэтиловым эфирам ($R' = \text{C}_2\text{H}_5$); в этом ряду активность постепенно увеличивается с удлинением и разветвлением алкильного радикала (R), достигая максимума в случае диэтиламиноэтилового эфира *п*-изобутоксibenзгидрола. С увеличением алкильного радикала алкоксильной группы отмечается слабое увеличение мускаринолитической и резкое повышение анестетической активности как диметил-, так и диэтиламиноэтиловых эфиров.

Таким образом, создается возможность регулировать спазмолитическую или анестетическую активность с помощью изменения алкоксильной группы, сохраняя при этом все остальные части молекулы. Однако нужно отметить, что в водных растворах хлоргидраты этих аминоэфиров гидролизуются с образованием соответствующих *п*-алкоксибензгидролов, причем с удлинением и разветвлением алкильного радикала скорость гидролиза увеличивается:

С целью более подробного исследования возможности получения избирательно-действующих препаратов в зависимости от местонахождения алкоксильной группы в бензольном кольце были получены диметиламиноэтиловые эфиры *o*-, *m*-алкоксибензгидролов:

Синтез этих соединений осуществлен двумя способами: 1) перегруппировкой четвертичных аммониевых солей, полученных взаимодействием *o*-, *m*-алкоксибензгидрилхлоридов с диметиламиноэтанолом в среде толуола:

2) взаимодействием *o*-, *m*-алкоксибензгидролов с диметиламиноэтилхлоридом в присутствии металлического натрия:

Все полученные таким образом аминоэфиры представляют масляобразные жидкости, легко образующие хлоргидраты и четвертичные аммониевые соли. При этом установлено, что выходы аминоэфиров гораздо ниже, чем в случае производных *m*-алкоксибензгидролов. Некоторые физико-химические константы полученных аминоэфиров и промежуточных *o*-, *m*-алкоксибензгидролов приведены в таблицах 1 и 2. Элементарные анализы полученных соединений проведены Тонакян и Мегроян. Данные фармакологических исследований будут опубликованы отдельно.

Таблица 1

R	Выход в %	Т. кип. в °С/мм	Т. пл. в °С	А н а л и з в %			
				С		Н	
				вычис-лено	найдепо	вычис-лено	найдепо
CH ₃	79,6	176—8/8		78,50	78,38	6,54	6,43
C ₂ H ₅	70	—	77—79	78,94	79,26	7,02	7,11
C ₃ H ₇	86,5	—	69—71	79,34	79,19	7,44	7,62
изо-C ₃ H ₇	78	—	55	79,34	79,60	7,44	7,16
C ₄ H ₉	71,1	—	56—7	79,69	79,39	7,81	7,80
изо-C ₄ H ₉	86,5	172—3/1		79,69	79,48	7,81	7,69
C ₅ H ₁₁	73	170—1/1		80,00	80,20	8,15	8,33
изо-C ₅ H ₁₁	9,6	164—5/1		80,00	80,27	8,15	8,21

CH ₃	70	170—1/1		78,50	78,68	6,54	6,37
C ₄ H ₉	60	182—4/1		79,69	79,85	7,81	7,69

Экспериментальная часть

o-Алкоксибензальдегиды получены взаимодействием салицилового альдегида и алкилгалогенидов в присутствии едкого натра в водной среде [2].

o-Алкоксибензгидролы получены взаимодействием *o*-алкоксибензальдегидов с фенилмагнибромидом.

К реактиву Гриньяра из стружек магния и бромбензола в абсолютном эфире добавлялся раствор эквимолекулярного количества *o*-алкоксибензальдегида в абсолютном эфире с такой скоростью, чтобы смесь непрерывно слабо кипела. Далее реакционная смесь нагревалась в течение получаса для завершения реакции, и затем при охлаждении производилось разложение комплекса насыщенным раствором хлористого аммония. Отделенный эфирный слой промывался водой, высуши-

Таблица 2

R	Выход в %	Т. кип. в °С/мм	А н а л и з в %						Т. пл. хлоридных солей в °С
			С		Н		N		
			вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	
CH ₃	15	164—6/1	75,78	75,89	8,07	8,19	4,91	4,95	142—3
C ₂ H ₅	24,4	174—6/2	76,22	76,39	8,36	8,24	4,59	4,62	132—5
C ₃ H ₇	25,6	181—3/1	76,67	76,75	8,62	8,83	4,47	4,43	68—70
изо-C ₃ H ₇	14	182—4/3	76,67	76,58	8,62	8,49	4,47	4,61	122—5
C ₄ H ₉	70,2	199—202/2	77,30	77,56	8,87	8,56	4,28	3,93	82—4
изо-C ₄ H ₉	17,3	195—7/4	77,30	76,97	8,87	8,64	4,28	4,34	78—80
C ₅ H ₁₁	51,4	189—191/0,5	77,42	—	9,09	4,11	4,11	—	105—6
изо-C ₅ H ₁₁	20,5	197—9/2	77,42	77,16	9,09	8,92	4,11	4,10	107—9

CH ₃	29,4	178—80/1	75,78	75,97	8,07	8,36	4,91	3,16	147—8
C ₄ H ₉	31,2	190—97/1	77,30	76,95	8,87	8,62	4,28	4,26	

вался над сульфатом натрия, и после отгонки растворителя остаток перегонялся в вакууме.

m-Алкоксибензгидролы получались таким же способом.

Диалкиламиноэтиловые эфиры *o*-алкоксибензгидролов. 1. Смешивались эквимолекулярные количества *o*-алкоксибензгидрилхлоридов и диалкиламиноэтанола в абсолютном толуоле. Образовавшаяся четвертичная соль нагревалась в течение 3—4 часов на масляной бане при 150—160°. Остаток после отгонки толуола обрабатывался насыщенным раствором поташа, экстрагировался эфиром, эфирный раствор промывался водой и высушивался сульфатом натрия. После отгонки эфира аминоэфир перегонялся в вакууме.

2. В среде абсолютного толуола кипячением в течение 12—15 часов из расплавленного металлического натрия и *o*-алкоксибензгидрола получался алкоголят. К нему же добавлялся свежеперегнанный диал-

киламиноэтилхлорид с 20%-ным избытком. Для завершения реакции кипячение продолжалось в течение 15—20 часов. После обычной обработки вещества перегонялись в вакууме.

В ы в о д

Осуществлен синтез 10 новых β-диалкиламиноэтиловых эфиров о-,м-алкоксибензгидролов.

Институт тонкой органической химии
АН АрмССР

Поступило 9 III 1963

Հ. Լ. Մեջոյան և Ն. Ս. Մորոզովա

ՇԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՊԱՐՁ ԱՄԻՆԱԵԹԵՐՆԵՐԻ ԱԾԱՆՅՅԱԼՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՍՈՒՄ

Հաղորդում IV: Մի քանի օ-,մ-ալկօքսիբենզհիդրոլների դիալկիլամինաթերերը

Ա մ փ ո փ ու մ

Ի նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ ալ-ալկօքսիբենզհիդրոլների դիալկիլամինոէթիլ եթերների ալկօքսի խմբի ալկիլալին շղթալի երկարացման ու ճյուղավորման հետ զուգընթաց տեղի է ունենում ֆարմակոլոգիական ազդեցության փոփոխություն, և նպատակ ունենալով այս հարցի ավելի մանրամասն ուսումնասիրությունը, կախված բենզոլի օդակում ալկօքսի խմբերի դանազան տեղադասավորումից, սինթեզվել են մի քանի օ-,մ-ալկօքսիբենզհիդրոլների դիալկիլամինոէթիլեթերները:

Վերոհիշյալ ամինաեթերների քլորհիդրատների և չորրորդական ամոնիումական աղերի ֆարմակոլոգիական ուսումնասիրությունների տվյալները կհաղորդվեն առանձին:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Օ. Լ. Մեջոյան, Ն. Ս. Մորոզովա, Изв. АН АрмССР, ХН 15, 553 (1962).
2. Օ. Լ. Մեջոյան, Գ. Մ. Погосян, Изв. АН АрмССР, ХН 13, 357 (1960).