В. М. Тараян и Ж. М. Арстамян

Соосаждение селена и теллура с гидроокисью железа

III. Совместное соосаждение и осаждение селена и теллура

Ранее нами был исследован процесс соосаждения селена (IV) и теллура (IV) с гидроокисью железа (III)* в зависимости от основных факторов: рН раствора, количества макрокомпонента, концентрации микрокомпонента, температуры и т. д. [1]. При этом было показано, что селен количественно соосаждается с указанным коллектором при рН 6,4—8,1, а теллур при рН 9,4—9,7. Процесс соосаждения с гидроокисью железа как для селена, так и для теллура носит адсорбционный характер. При совместном присутствии селена и теллура интервал значений рН, при котором имеет место количественное их соосаждение, значительно расширяется (6,4—9,7), т. е. селен и теллур количественно соосаждаются в интервале значений рН 8,1—9,4, в то время как в отдельности ни один из них в указанной области значений концентрации водородных ионов количественно не соосаждается.

Несмотря на широкое практическое применение процесса совместного соосаждения селена и теллура с гидроокисью железа [2, 3] исследований, посвященных природе и механизму этого процесса, в литературе нет. Поэтому данная работа имеет целью изучить природу совместного соосаждения селена и теллура с гидроокисью железа.

Экспериментальная часть

Опыты проводились с количествами селена и теллура от 0,1 до 75 мг в 100 мл раствора. Методика соосаждения селена и теллура с гидроокисью железа описана ранее [1]. Конечное определение селена и теллура проводилось колориметрическим (при количествах селена и теллура до 0,6 мг) и объемным (фодометрическим) (при количествах свыше 0,6 мг) методами.

Измерения рН проводились стеклянным электродом с использованием потенциометра ЛП—58.

На рисунке 1 показано влияние рН на соосаждение микроколичеств селена и теллура с гидроокисью железа. В отличие от кривых 1 и 2, кривая 3 говорит о том, что процесс соосаждения при совместном присутствии селена и теллура в интервале рН 6—10 не зависит от величины рН. Прямолинейный характер этой кривой свидетель-

* Далее в тексте указание о валентности селена и теллура опускается. При упоминании гидроокиси железа имеется в виду гидроокись железа (III).

ствует о том, что механизм соосаждения селена и теллура при совместном их присутствии становится иным.

Рис. 1. Влияние pH на соосаждение селена и теллура с гидроокисью железа; 1 — SeO_3^{2-} , 2 — TeO_3^{2-} , 3 — ($SeO_3^{2-} + TeO_3^{2-}$).

Зависимость соосаждения селена и теллура от их концентрации в растворе показана на рисунке 2 (кривые 1—3).

Рис. 2. Зависимость соосаждения селена или теллура от их концентрации; 1 — SeO_3^{2-} , 2 — TeO_3^{2-} , 3 — ($SeO_3^{2-} + TeO_3^{2-}$).
pH 6—9,7; Fe = 300 мг.

Исследовались концентрации от 0,1 мг/100 мл и до 3,6 мг/100 мл раствора. Кривая 1 отражает процесс соосаждения селена с гидро-

окисью железа. Практически количественное соосаждение селена имеет место в интервале концентраций от 0,1 до 0,4 мг селена в 100 мл раствора. Затем количество соосаждающегося селена снижается до 80% (при содержании 0,6 мг в указанном объеме). С дальнейшим повышением концентрации селена количество соосаждающегося селена постепенно повышается и достигает практически полного осаждения при концентрации 3,2 мг/100 мл. В области низких концентраций (0,1—0,5 мг/100 мл) аналогично достигается полнота соосаждения теллура с гидроокисью железа. Затем количество соосаждающегося теллура, снижаясь, достигает минимума при 0,7—0,8 мг/100 мл. Дальнейшее повышение концентраций теллура приводит к практически полному его осаждению (1,6 мг/100 мл и выше). Кривая 3, соответствующая совместному соосаждению селена и теллура, заметно разнится от кривых 1 и 2 именно тем, что подтверждает возможность количественного совместного соосаждения селена и теллура во всем исследуемом интервале концентраций (0,1—3,6 мг/100 мл). Таким образом, полнота соосаждения или, быть может, просто осаждения зависит от концентрации селена и теллура только в том случае, если они исследуются в отдельности друг от друга. Поскольку в последнем случае природа исследуемых явлений зависит от концентрации селена и теллура, следовало данное исследование провести: 1) с растворами, содержащими микро- или, правильнее, полумикроколичества этих элементов, где доминирующим по существу представляется обычный процесс сопряженного осаждения и 2) с растворами, содержащими макроколичества указанных элементов, вследствие чего может иметь место образование соответствующих труднорастворимых солей железа (III) с селенистой или теллуристой кислотой.

Соосаждение микро- или полумикроколичеств селена и теллура с гидроокисью железа. Приведенные выше данные о влиянии рН и концентрации исследуемого раствора на процесс совместного осаждения селена и теллура (рис. 1 и 2), несомненно, отрицают возможность адсорбционного соосаждения. В этой связи необходимо было исследовать влияние и других факторов на процесс совместного соосаждения селена и теллура*.

Известно, что в зависимости от скорости добавления и концентрации осадителя получается осадок с различно развитой поверхностью, следовательно с различной адсорбирующей способностью. Опыты показали, что этот фактор не влияет на совместное соосаждение: во всех случаях селен и теллур полностью выделяются из раствора.

Изучено также влияние порядка сливания растворов на соосаждение суммы селена и теллура. Соосаждение проводилось заранее полученной гидроокисью железа, с постепенным осаждением коллек-

* Исследования проводились с количествами селена и теллура, соответствующими области их максимальной растворимости (при осаждении каждого из них в отдельности в присутствии железа (рис. 2, кр. 1 и 2).

тора или же с добавлением последнего к раствору, содержащему селен, теллур и осадитель. Оказалось, что во всех случаях соосаждение количественное.

Рис. 3. Зависимость соосаждения селена или теллура от скорости добавления и концентрации NH_4OH ; $\times$ — конц. сразу, $\circ$ — разб. по каплям, $\bullet$ — разб. сразу, $\odot$ — конц. по каплям.

Рис. 4. Зависимость соосаждения селена или теллура от порядка сливания растворов; $\times$ — $[\text{Fe}^{3+} + \text{NH}_4\text{OH}] + [\text{SeO}_3^{2-} + \text{TeO}_3^{2-}]$, $\circ$ — $[\text{SeO}_3^{2-} + \text{TeO}_3^{2-} + \text{NH}_4\text{OH}] + \text{Fe}^{3+}$, $\bullet$ — $[\text{SeO}_3^{2-} + \text{TeO}_3^{2-} + \text{Fe}^{3+}] + \text{NH}_4\text{OH}$.

Из других факторов, сильно влияющих на соосаждение, изучалось влияние температуры (рис. 5) и времени соприкосновения раствора с осадком. Соосаждение проводилось при $30\text{--}80^\circ$. Опыты показали, что изменение температуры, а также времени соприкосновения раствора с осадком (от 10 минут до 4 дней) не влияет на процесс совместного соосаждения селена и теллура.

Рис. 5. Зависимость соосаждения селена или теллура от температуры; $\times$ — 30° , $\circ$ — 40° , $\bullet$ — 60° , $\odot$ — 80° .

Рис. 6. Зависимость соосаждения селена или теллура от концентрации NH_4Cl ; $\times$ — SeO_3^{2-} , $\circ$ — TeO_3^{2-} .

Известно, что увеличение концентрации NH_4^+ [4,5], а также природа аниона коагулянта уменьшают соосаждение иона с коллекто-

ром. Поэтому исследовалась зависимость соосаждения селена и теллура от концентрации хлористого аммония (от 0,5 и до 4 н. по объему), однако изменений в характере соосаждения отметить не удалось (рис. 6).

Как видно из приведенных данных, совместное соосаждение селена и теллура не зависит от вышеперечисленных факторов, следовательно нет оснований причислять его к процессам адсорбционного характера. По-видимому, совместное соосаждение селена и теллура следует объяснить процессом изоморфного соосаждения. Последнее не исключено и в случае аморфных осадков [6]*.

Осаждение макроколичеств селена и теллура с гидроокисью железа. В нижеописываемых опытах концентрация селена и теллура доводилась до 75 мг/100 мл. Соотношения селена и теллура широко изменялись. Для полноты исследования изучалось также поведение селена и теллура в отдельности при осаждении их аммиаком в присутствии железа; при этом рН испытуемого раствора поддерживался в интервале 6—10. Содержание железа, как и в предыдущих опытах, было равно 300 мг/100 мл. Полученные данные (рис. 7) подтверждают возможность количественного осаждения в указанных выше условиях довольно больших количеств селена (18—75 мг/100 мл) и, аналогично, теллура.

Далее были поставлены опыты с переменными количествами железа (рис. 8). При этом оказалось, что количественное осаждение теллура имеет место уже при сравнительно низких количествах железа (рис. 8, кр. 1), в то время как количественное осаждение селена достигает полноты лишь при значительно больших количествах железа (рис. 8, кр. 2). Эти предварительные данные говорят о различном поведении селена и теллура в описываемом процессе осаждения. По-видимому, селен и теллур в условиях данного эксперимента образуют с трехвалентным железом соответствующие труднорастворимые соли, т. е. селенит и теллуриг железа (III), заметно отличающиеся друг от друга растворимостью. Для подтверждения этого предположения производилось осаждение теллура в присутствии селена стехиометрическими количествами железа.

Приведенные в таблице 1 данные говорят о том, что теллур полностью осаждается при соотношении $Te : Fe = 1,5 : 1$ или, что то же,

Рис. 7. Зависимость осаждения селена от его количества; Fe—300 мг, рН 6—9,7.

* Рентгеноструктурное исследование осадка гидроокиси железа, содержащего селен и теллур, выявило его слабо выраженную кристаллическую структуру.

3:2 (опыты 2—5). Полнота осаждения достигается и при соотношении $Te:Fe = 1:1$, где также обеспечивается указанное соотношение, но

Рис. 8. Зависимость осаждения селена или теллура от количества железа; Se — 18,93 мг, Te — 20,34 мг, pH 6—9,7.

1 — SeO_3^{2-} , 2 — TeO_3^{2-} .

одновременно имеется некоторый избыток железа (опыт 1). Это дает основание выразить состав получаемого осадка формулой $Fe_2(TeO_3)_3$. В этих же условиях селен осаждается лишь частично (не более 30%).

Таблица 1

Влияние количества железа на полноту осаждения селена и теллура

№ п/п	Взято				Te:Fe	Взято		Найдено в осадке				pH
	Te в мг	Te в ммольях	Fe в мг	Fe в ммольях		Se в мг	Se в ммольях	Te в мг	Te в %	Se в мг	Se в %	
1	18,80	0,1473	8,12	0,1450	1:1	7,57	0,0960	18,80	100,0	2,16	30,20	7
2	18,80	0,1473	5,08	0,0906	1,5:1	7,57	0,0960	18,79	99,8	1,98	28,00	9,4
3	18,80	0,1473	6,09	0,1088	3:2	7,57	0,0960	18,80	100,0	1,44	16,30	9,1
4	18,80	0,1473	6,09	0,1088	3:2	7,57	0,0960	18,80	100,0	1,55	16,50	8,8
5	22,76	0,1784	6,09	0,1088	1,5:1	7,57	0,0960	22,76	100,0	1,97	26,00	6,5
6	22,76	0,2084	5,58	0,1042	2:1	7,57	0,0960	20,01	88,00	1,08	14,00	8,6
7	45,52	0,4168	11,16	0,2041	2:1	7,57	0,0960	38,69	85,00	1,10	15,00	9,5
8	45,52	0,3568	6,09	0,1088	3:1	7,57	0,0960	30,35	66,6	1,05	13,90	7,5
9	45,52	0,3568	6,09	0,1088	3:1	7,57	0,0960	32,45	70,0	1,10	15,00	9,2
10	37,60	0,2946	4,06	0,0724	4:1	7,57	0,0960	23,50	62,50	1,07	14,5	8,9
11	30,50	0,2391	100,00	1,8130	—	18,93	0,2400	30,65	100,4	18,93	100,00	7,8
12	15,26	0,1195	100,00	1,8130	—	18,93	0,2400	15,2	99,90	18,90	99,90	9,0
13	10,17	0,0796	100,00	1,8130	—	18,93	0,2400	10,17	100,00	18,93	100,00	7,5
14	8,14	0,0637	100,00	1,8130	—	18,93	0,2400	8,13	99,80	18,49	97,70	6,8

Полнота одновременного осаждения селена и теллура достигается только при наличии большого избытка железа. Таким образом, в растворах, содержащих макроколичества селена и теллура, в результате химического взаимодействия с трехвалентным железом образуются соответствующие малорастворимые селениты и теллуриды. В литера-

туре имеются данные Чухланцева и Томашевского [7] по растворимости селенита железа в растворах серной и азотной кислот с рН 2—3 при комнатной температуре.

Изучена также растворимость селенита и теллурита трехвалентного железа при 19, 40 и 70° в растворах соляной кислоты с рН 1,0; 1,5; 2,0 и 2,5, а также в солянокислых растворах, содержащих 10% NH_4Cl с рН 1,0 и 2,5 при 19° [8]. Однако указанная растворимость определена авторами для суммы селена и теллура. Вследствие этого возникает необходимость в данных о растворимости селенитов и теллуритов в отдельности и при значениях рН, представляющих интерес для практики химического анализа, т. е. примерно в интервале 6—10. Этому вопросу будет посвящено одно из наших последующих сообщений.

В практике химического анализа совместное осаждение селена и теллура с гидроокисью железа при их определении в рудах с низким содержанием этих элементов в большинстве случаев применяется в целях отделения селена и теллура от одновременно присутствующей меди и азотной кислоты. Вышеизложенные данные говорят о возможности применения этого метода предварительного отделения и при наличии макроколичеств селена и теллура. Оптимальные условия для подобного осаждения: интервал рН 6—10 и большой избыток железа. (250—300 мг),

В ы в о д ы

Изучение влияния рН, количества микрокомпонента, продолжительности соприкосновения осадка с раствором, порядка сливания реактивов позволяет заключить, что совместное соосаждение микро- и полумикроколичеств селена и теллура с гидроокисью железа, по-видимому, представляет собой случай изоморфного соосаждения. При осаждении макроколичеств селена и теллура аммиаком в присутствии солей трехвалентного железа совместное осаждение имеет место в присутствии большого избытка железа. Как селен, так и теллур в указанных условиях (рН 6—10) в присутствии иона трехвалентного железа образуют с последним труднорастворимые соли, т. е. селенит и теллурит железа (III), заметно отличающиеся растворимостью. Так, при ограничении количества добавляемого железа теллур всегда полностью переходит в осадок. Полнота осаждения макроколичеств селена в присутствии таких же количеств теллура находится в явной зависимости от количества железа. Метод может быть применен в практике химического анализа для предварительного отделения макроколичеств селена и теллура от сопутствующих мешающих элементов.

Ереванский государственный университет
Кафедра аналитической химии

Поступило 3 IX 1963

Վ. Մ. Թառայան և Ժ. Մ. Առստամյան

ՍԵԼԵՆԻ ԵՎ ԹԵԼՈՒՐԻ ՀԱՐԱԿԻՑ ՆՍՏԵՑՈՒՄԸ
ԵՐԿԱԹԻ ՀԻԴՐՕՔՍԻԴԻ ՀԵՏ

III: Սելենի և րելուրի համատեղ հարակից նստեցումը

Ա մ փ ո փ ու մ

ՐН-ի, միկրոկոմպոնենտի քանակի, նստվածքի լուծույթի հետ շփման ժամանակի, ռեակտիվների ավելացման հերթականություն և այլն ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ սելենի և թելուրի միկրո- և կիսամիկրոքանակների համատեղ հարակից նստեցումը երկաթի հիդրօքսիդի հետ, ըստ երևույթին, իրենից ներկայացնում է իզոմորֆ հարակից նստեցում: Սելենի և թելուրի մակրոքանակները եռարժեք երկաթի աղերի ներկայությամբ ամիակով նստեցնելիս, սելենի և թելուրի համատեղ նստեցումը տեղի է ունենում երկաթի մեծ ավելցուկի ներկայությամբ:

Ինչպես սելենը, այնպես էլ թելուրը նշված պայմաններում (рН 6—10) եռարժեք երկաթի ներկայությամբ վերջինիս հետ առաջացնում են համապատասխան դժվարալուծ աղեր այսինքն՝ երկաթի (III) սելենիտ և թելուրիտ, որոնք մեկը մյուսից տարբերվում են լուծելիությամբ: Այսպես, ավելացվող երկաթի քանակը սահմանափակելիս, թելուրը միշտ լրիվ անցնում է նրստվածք: Սելենի մակրոքանակների նստեցման լրիվությունը նույն քանակով թելուրի դեպքում կախման մեջ է գտնվում երկաթի քանակից:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. В. М. Тараян, Ж. М. Арстамян, Г. Н. Шалошникова, Изв. АН АрмССР, ХН 14, 551 (1961); В. М. Тараян, Ж. М. Арстамян, там же 15, 329 (1962).
2. В. Ф. Гиллебранд, Г. Э. Лендель, Г. А. Брайт, Д. И. Гофман, Пра тн теское ру ководство по неорганическому анализу. ГНТИ, Москва, 1957, 257, 355.
3. М. Ф. Прошкович, П. В. Флгеев, Обогащение руд 2, 21 (1957).
4. А. И. Новиков, Изв. высш. уч. завед. СССР, Химия и хим. технология 2, 238 (1960).
5. В. И. Плотников, ЖНХ 3, 176 (1958); 4, 2775 (1959).
6. А. К. Лаврухина, ЖАХ 12, 41 (1957).
7. В. Г. Чухланцев, Г. П. Томашевский, ЖАХ 12, 296 (1957).
8. С. М. Анисимов, С. Л. Савальский, А. П. Осипов, Изв. высш. уч. завед. СССР, Цветная металлургия 1, 101 (1961).