В. В. Довлатян, З. З. Джереджян

Синтез гербицидов

Х. Синтез этиловых эфиров α -этил-(хлорметил)- α -ацилосиметоксиметилацетоуксусных кислот

По литературным данным, некоторые представители кетокислот и их производные проявляют выраженную физиологическую активность по отношению к растениям. Так, например, согласно одному патенту [1], дециловый эфир ацетоуксусной кислоты является исключительно эффективным и селективно действующим гербицидом: в 0,2—1%-ной концентрации он уничтожает ряд сорняков, не повреждая культурных растений. В качестве стимуляторов роста растений запатентованы также оксимы, фенилгидразоны, семикарбазоны, кетали и бисульфитные соединения левулиновой кислоты, ее эфиров и солей [2].

Естественным продолжением работ по изысканию новых физиологически активных веществ из этой группы соединений можно было считать синтез таких производных кетокислот, которые содержали бы в своем составе остатки гербицидов типа ароксиуксусных кислот.

В связи с этим в качестве возможных гербицидов нами получены этиловые эфиры α -этил-(хлорметил)- α -ароксиацетилоксиметоксиметил-ацетоуксусных кислот следующей общей формулы:

Полученные соединения являются также сложными эфирами ароксиуксусных кислот и, как таковые, в спиртовой части содержат несколько функций: кетонную, эфирную и сложноэфирную группы, наличие которых может повысить липофильность данных соединений и тем самым облегчить их проникновение через кутикулу растения, чем, до некоторой степени, обусловлена сила гербицидного действия препаратов.

С этой точки зрения, указанные эфиры являются аналогами ранее синтезированных нами высокоактивных гербицидов—алкиловых эфиров O -ароксиацетилгликолевых кислот, которые также содержат в спиртовой части липоидотропную карбалкоксильную группу [3].

Для синтеза намеченных соединений были применены хлориды, полученные действием хлорметилирующей смеси на ацетоуксусный эфир и его α -этилпроизводное. Как было показано ранее, в условиях реакции хлорметилирования этиловый эфир α -этилацетоуксусной кислоты

R'SOOSCH₂OCH₂SR(SOOSCH₂)₂SOOSCH₂N₂

Таблица

R'	R	Выход в %	Т. пл. в °С	Т. кип. в °С/мм	n _D ²⁰	d ₄ ²⁰	M _R D		А н а л и з в %					
							найдено	вычислено	Cl		S		H	
CH ₃	C ₂ H ₅	70		134-136/1	1,4430	1,0974	62,809	62,578	—	—	55,21	55,96	7,48	7,69
CH ₃	ClCH ₂	72		142-144/1	1,4532	1,2101	62,677	62,827	12,21	12,65	47,14	47,06	6,29	6,06
ClCH ₂	C ₂ H ₅	50		196-199/4	1,4595	1,2100	66,612	67,445	11,75	12,05		48,96		6,45
ClCH ₂	ClCH ₂	50		165-167/1	1,4540	1,2504	67,219	67,694	22,13	22,54		41,90		5,08
C ₄ H ₉ OCH ₂	C ₂ H ₅	51		166-169/1	1,4940	1,1782	87,00	88,328			60,87	61,36	6,55	6,82
C ₄ H ₉ OCH ₂	Cl ₂ H ₂	50		202-204/2	1,4800	1,2110	87,383	88,577	9,79	9,53		54,76		5,14
4-ClC ₂ H ₄ OCH ₂	C ₂ H ₅	60		226-228/0,5	1,5008	1,2305	92,509	93,195	9,42	9,18		55,89		5,95
4-ClC ₂ H ₄ OCH ₂	ClCH ₂	60		220-225/0,5	1,4961	1,2735	93,161	93,444	17,84	17,44		50,12		4,91
2-CH ₃ -4-ClC ₂ H ₄ OCH ₂	C ₂ H ₅	86		215-220/0,2	1,5064	1,2202	97,578	97,913	8,48	8,86		56,93		6,24
2-CH ₃ -4-ClC ₂ H ₄ OCH ₂	ClCH ₂	81		235-238/0,5	1,4930	1,2570	97,332	98,062	16,52	16,87		51,31		5,22
2,4-Cl ₂ C ₂ H ₄ OCH ₂	C ₂ H ₅	85	56-57						17,11	16,87	51,50	51,31	5,48	5,22
2,4-Cl ₂ C ₂ H ₄ OCH ₂	Cl ₂ H ₂	70	53-54						24,41	24,12	46,54	46,20	4,61	4,30

α-этил-(хлорметил)-2-галоидароксиацетилоксиметоксиацетоуксусных кислот, между тем как ацетил- и хлорацетилпроизводные этих же эфиров оказались практически неактивными.

Любопытно отметить, что при одинаковой норме расхода этиловый эфир *α*-этил-*α*-2,4-дихлорфеноксиацетилоксиметоксиацетоуксусной кислоты и бутиловый эфир 2,4-Д показали почти одинаковую активность, в то время как кислотный эквивалент последнего в 1,5 раза больше, чем первого.

Экспериментальная часть

Необходимые хлориды были получены по описанной методике [4]. Константы этилового эфира *α*-этил-*α*-хлорметоксимилацетоуксусной кислоты: т. кип. 120—122°/1 мм, n_D^{20} 1,4530, d_4^{20} 1,1328; этилового эфира *α*-хлорметил-*α*-хлорметоксимилацетоуксусной кислоты—т. кип. 131—132°/1 мм, n_D^{20} 1,4654, d_4^{20} 1,2465.

Натриевые соли карбоновых кислот были получены действием спиртового едкого натра на кислоту, растворенную в абсолютном спирте. Полученная таким образом безводная соль отфильтровывается и тщательно высушивается; применение кристаллогидратов солей вызывает побочную реакцию гидролитического расщепления хлоридов, что заметно снижает выходы эфиров.

Этиловые эфиры α-этил-(хлорметил)-α-ацилоксиметоксимилацетоуксусных кислот. К 0,1 моля хлорида, растворенного в 30—40 мл абсолютного бензола, прибавляют 1 г сухого пиридина и после десятиминутного перемешивания добавляют 0,1 моля безводной натриевой соли кислоты. Смесь при перемешивании нагревают на водяной бане в течение 3—4 часов, затем приливают 50 мл воды и столько же бензола. Бензольный слой отделяют от водного, несколько раз промывают раствором бикарбоната натрия, затем водой и высушивают над прокаленным хлористым кальцием. После удаления растворителя этиловые эфиры *α*-этил-(хлорметил)-*α*-2,4-дихлорфеноксиацетилоксиметоксимилацетоуксусных кислот при стоянии закристаллизовывались. Очистка их производилась перекристаллизацией из эфира. Остальные эфиры были выделены перегонкой в вакууме.

Омыление этилового эфира α-этил-α-феноксиацетилоксиметоксиацетоуксусной кислоты. К 6,5 г этилового эфира *α*-этил-*α*-феноксиацетилоксиметоксиацетоуксусной кислоты, растворенного в 15 мл абсолютного спирта, при охлаждении смесью поваренной соли и льда и перемешивании медленно, по каплям, приливают 1,1 г едкого кали, растворенного в 10 мл абсолютного спирта. По окончании прибавления перемешивание смеси продолжают при комнатной температуре в течение 1 часа, затем отфильтровывают выпавший осадок, растворяют в воде, подкисляют и выделяют 1,45 г кристаллической массы с т. пл. 98°. Выход 51% теории. Для феноксиуксусной кислоты в литературе указана т. пл. 98—99° [5].

Из фильтрата спирт удаляют в слабом вакууме, к остатку прибавляют 10—15 мл воды и столько же эфира, эфирный слой высушивают и после удаления растворителя получают этиловый эфир α -этил- α -оксиметилацетоуксусной кислоты. Оксим, приготовленный описанным ранее способом, имел т. пл. 170° [6]. Из этого же фильтрата при его нагревании выделялся формальдегид, который был собран в воде и идентифицирован в виде 2,4-динитрофенилгидразона, т. пл. 165°.

В ы в о д ы

1. Взаимодействием натриевых солей карбоновых кислот с этиловыми эфирами α -этил-(хлорметил)- α -хлорметоксиметилацетоуксусных кислот получены не описанные в литературе этиловые эфиры некоторых α -этил-(хлорметил)- α -ацилоксиметоксиметилацетоуксусных кислот.

2. Показано, что под действием спиртового едкого кали полученные эфиры расщепляются по месту центральной сложноэфирной группы.

3. Некоторые из синтезированных соединений, несмотря на низкий кислотный эквивалент, обладают высокой гербицидной активностью.

Армянский сельскохозяйственный институт
Кафедра общей химии

Поступило 4 VI 1963.

Վ. Վ. Դովլաթյան և Զ. Զ. Զեհեջյան

ՀԵՐԲԻՑԻԴՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶԸ

X: α -էթիլ-(քլորմեթիլ)- α -ացիլօքսիմեթիլօքսիմեթիլացետօքսացալաքսուրօնի էթիլալից էսթերների սինթեզը

Ա մ փ ո փ ու մ

Կարրոնական թթուների աղերի և առաջներում մեր ստացած α -էթիլ-(քլորմեթիլ)- α -քլորմեթօքսիմեթիլացետօքսացալաքսուրօնի էթիլալից էսթերների փոխազդեցությամբ սինթեզված են գրականության մեջ չնկարագրված մի շարք α -էթիլ-(քլորմեթիլ)- α -ացիլօքսիմեթօքսիմեթիլացետօքսացալաքսուրօնի էթիլալից էսթերներ, որպես հնարավոր հերբիցիդներ:

Ցուլց է տրված, որ ստացված էսթերները սպիրտալին կծու կալիումի ազդեցությամբ օճաուսնում են կենտրոնական էսթերալին խմբի տեղում:

Չնայած թթվալին ցածր էկվիվալենտին, սինթեզված միացություններից α -էթիլ-(քլորմեթիլ)- α -հալոգենարօքսիացետիլօքսիմեթօքսիմեթիլացետօքսացալաքսուրօնի էթիլալից էսթերները ցուցաբերում են հերբիցիդալին բարձր ակտիվություն:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Патент США 2,533,015 [С. А. 45, 1289 (1951)].
2. Патент США 2,416,198 [С. А. 41, 3251 (1947)].
3. В. В. Довлатян, Т. О. Чакрян, Изв. АН АрмССР, ХН 10, 475 (1963).
4. В. В. Довлатян, Изв. АН АрмССР, ХН 10, 47 (1957); 15, 77 (1962).
5. Словарь орг. соединений Э. ИЛ, Москв., 1949, 373.
6. В. В. Довлатян, Т. О. Чакрян, Изв. АН АрмССР, ХН 14, 357 (1961).