Л. В. Гюльбудагян, В. А. Григорян и А. А. Погосян

Новые производные 2,4-хинолиндиола

I. Синтез некоторых 3-(γ-хлоркритил)-2,4-хинолиндиолов

Ранее одним из нас был синтезирован ряд новых производных 4-хинальдинола [1], в которых введение нового радикала осуществлялось в β-положении пиридинового кольца молекулы хинолина. Затем атомы водорода бензольного кольца были замещены различными атомами и радикалами. Эти соединения были получены из эфиров однозамещенных ацетоуксусных кислот и соответствующих ароматических аминов [1].

В данной работе мы поставили целью синтезировать новые производные 2,4-диоксихинолина, т. е. в ранее синтезированных 4-хинальдинолах заменить метильную группу во втором положении оксигруппой и таким образом перейти к новым производным карбостирила.

Эти соединения синтезированы из однозамещенных малоновых эфиров и первичных ароматических аминов, у которых одно из *o*-положений является свободным [2]. При нагревании ароматического амина с малоновым эфиром вначале образуется *N*-ариламидоэфир малоновой кислоты, который при дальнейшем нагревании, подвергаясь циклизации, превращается в 2,4-диоксихинолин:

При использовании однозамещенных малоновых эфиров получают 3-замещенные 2,4-диоксихинолины [3]. Нами взят γ-хлоркритилмалоновый эфир (I), а в качестве ароматического амина анилин, *p*- и *o*-толуидины и -анизидины:

Y = H, 6-CH₃, 8-CH₃, 6-OCH₃, 8-OCH₃

Полученные 2,4-диокси-3-(γ -хлоркротил)-хинолины (II) белые кристаллические вещества, хорошо растворимые в спирте и очень хорошо в пиридине.

Когда с γ -хлоркротилмалоновым эфиром был введен в реакцию *o*-толидин, при циклизации были получены продукты (III) и (IV), т. е. в одном случае в реакцию вступала одна аминогруппа толидина (III), а в другом—обе аминогруппы (IV):

Таким образом, в первом случае получался 2,4-диокси-3-(γ -хлоркротил)-6-(3-метил-4-аминофенил)-8-метилхинолин (III), а во втором—бис-[2,4-диокси-3-(γ -хлоркротил)-8-метил]-6,6'-бихинолил (IV). Оба соединения являются светло-желтыми кристаллическими веществами, причем (IV) в отличие от (III) хорошо растворимо в спирте; это и использовано для их разделения.

Экспериментальная часть

2,4-Диокси-3-(γ -хлоркротил)-хинолины. В колбу, снабженную мешалкой, обратным холодильником и термометром, доходящим до дна колбы, помещалось 0,11 моля эфира γ -хлоркротилмалоновой кислоты [4], 0,1 моля ароматического амина и 50 мл вазелинового масла. Смесь в течение одного часа нагревалась на открытом огне при температуре реакционной смеси 200—220°. После охлаждения кристаллический продукт отфильтровывался и на фильтрате промывался петролейным эфиром. Полученные хинолиндиолы представляли собой белые кристаллические вещества. Данные о синтезированных соединениях сведены в таблицу.

Таблица

Y	Выход в %	Т. пл. в °С	Эмпирическая формула	А н а л и з в %					
				С		Н		Cl	
				найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено
H	84,6	197	C ₁₄ H ₁₂ ClNO ₂	62,27	62,52	4,96	4,81	14,34	14,20
6-CH ₃	71,4	194	C ₁₅ H ₁₄ ClNO ₂	63,52	63,75	5,13	5,31	13,07	13,4
8-CH ₃	63,8	179	C ₁₅ H ₁₄ ClNO ₂	63,45	63,75	5,20	5,31	13,46	13,4
6-OCH ₃	67,4	203	C ₁₅ H ₁₄ ClNO ₃	60,34	60,11	4,42	5,36	12,75	12,67
8-OCH ₃	80,1	170	C ₁₅ H ₁₄ ClNO ₃	59,89	60,11	5,23	5,36	12,41	12,67

2,4-Диокси-3-(γ-хлоркротил)-6-(3-метил-4-аминофенил)-8-метилхинолин и бис-[2,4-диокси-3-(γ-хлоркротил)-8-метил]-6,6'-бихинолил. В колбу помещены 27,4 г (0,11 моля) γ-хлоркротилмалонового эфира, 10,7 г (0,05 моля) *o*-толидина и 50 мл вазелинового масла. При перемешивании смесь нагревалась до 200–220° в течение одного часа. После охлаждения содержимое колбы фильтровалось, фильтр промывался легким бензином (фракция до 75°). К полученному кристаллическому веществу прибавлялось 200 мл этанола, после чего смесь нагревалась и в горячем виде отфильтровывалась. Часть вещества в спирте растворялась.

Не растворившиеся в спирте 9,2 г вещества с т. пл. 295° охарактеризованы как 2,4-диокси-3-(γ-хлоркротил)-6-(3-метил-4-аминофенил)-8-метилхинолин.

Найдено %: Cl 9,59; N 7,46
C₂₁H₂₁O₂N₂Cl. Вычислено %: Cl 9,64; N 7,59.

Из спиртового раствора выделено 8,9 г вещества с т. пл. 205°, которое охарактеризовано как бис-[2,4-диокси-3-(γ-хлоркротил)-8-метил]-6,6'-бихинолил.

Найдено %: Cl 12,82; N 5,47
C₂₈H₂₈O₄N₂Cl₂. Вычислено %: Cl 13,52; N 5,33.

В ы в о д ы

1. Реакция γ-хлоркротилмалонового эфира с ароматическими аминами (анилин, *o*- и *p*-анизидины и -толуидины) в нейтральной среде при 200–220° приводит к получению 2,4-диокси-3-(γ-хлоркротил)-хинолина (II) и его 6-CH₃-, 8-CH₃-, 6-OCH₃- и 8-OCH₃-производных. Взаимодействие в тех же условиях с *o*-толидином дает 2,4-диокси-3-(γ-

-хлоркротил)-6-(3-метил-4-аминофенил)-8-метилхинолин и бис-[2,4-диокси-3-(γ-хлоркротил)-8-метил]-6,6'-бихинолил.

Ереванский государственный университет
Кафедра органической химии

Поступило 22 VI 1963

Լ. Վ. Գյուլբուդաղյան, Վ. Ա. Գրիգորյան և Ա. Ա. Պոզոսյան

2,4-ԽԻՆՈԼԻՆԱԴԻՈԼԻ ՆՈՐ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐ

I: Քի բացի 3-(γ-քլորկրոտիլ)-2,4-դիօքսիխինոլինցների սինթեզը

Ա մ փ ո փ ու մ

Մեզինից մեկն անցյալում սինթեզել էր 4-խինալդինոլին մի շարք ածանցյալներ, որոնց մեջ նոր ռադիկալի ներմուծումը կատարվել է 3-րդ դիրքում: Այս միացությունների համար որպես ելանյութ են ծառայել α-մոնոտեղակալված ազոտաքաղաքթոլենների էսթերները և արոմատիկ ամինները:

Այս աշխատանքով մենք նպատակ էինք դրել ստանալ 2,4-դիօքսիխինոլինի նոր ածանցյալներ՝ նախկինում սինթեզված 4-խինալդինոլինների մեթիլխումբը փոխարինել հիդրօքսիլ խմբով և այսպիսով անցնել կարբոստիբիլի նոր ածանցյալներին: Վերջիններս սինթեզել ենք մոնոտեղակալված մալոնաթթվական էսթերների և արոմատիկ ամինների փոխազդեցությամբ: Ռեակցիայի մեջ են մտցվել γ-քլորկրոտիլմալոնաթթվի էթիլ էսթերը, իսկ արոմատիկ ամիններից անիլինը, օրթո- և պարա-տոլուիդինները, ինչպես և օրթո- ու պարա-անիզիդինները: Ստացվել են համապատասխանորեն 2,4-դիօքսի-3-(γ-քլորկրոտիլ)-խինոլինը և նրա 6-CH₃, 8-CH₃, 6-OCH₃ և 8-OCH₃ ածանցյալները, որոնց մասին սովորաբար բերված են աղյուսակում:

γ-Քլորկրոտիլմալոնաթթվական էսթերի հետ օ-տոլուիդինի փոխարեն ռեակցիայի մեջ մտցվել է օ-տոլիդինը: Պարզվել է, որ ռեակցիան ընթացել է երկու կերպ: Մի դեպքում ռեակցիայի մեջ է մտել օ-տոլիդինի մեկ ամինախումբը, իսկ մյուս դեպքում՝ երկուսը:

Այսպիսով ստացվել են երկու նյութեր՝ 2,4-դիօքսի-3-(γ-քլորկրոտիլ)-6-(3-մեթիլ-4-ամինոֆենիլ)-8-մեթիլխինոլին (III) և բիս-[2,4-դիօքսի-3-(γ-քլորկրոտիլ)-8-մեթիլ]-6,6'-բիխինոլին (IV), երկուսն էլ բաց դեղին գույնի բյուրեղներ են, IV-ը բավականին լուծվում է սպիրտում, իսկ III-ը մնում է չլուծված:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Л. В. Гюльбудагян, Р. В. Карапетян, Изв. АН АрмССР, ХН 16, 73 (1963); Л. В. Гюльбудагян, Л. М. Акопян, С. М. Маркарян, Изв. АН АрмССР, ХН 15, 191. (1962).
2. W. R. Vaughan, J. Am. Chem. Soc. 68, 324 (1946); P. Baumgarten, W. Kurgel, Ber. 60, 832 (1927).
3. R. H. Baker, G. R. Lappin, B. Rigel, J. Am. Chem. Soc. 68, 1284 (1946); Էրմ. патент 505798 [С. 1, 2679 (1931)].
4. Г. Т. Татевосян, М. И. Меликян, М. Г. Тутерян, Изв. АН АрмССР, Ф.МЕТИ 5—8, 40 (1944).