приводит к образованию метилового спирта.

Между тем известно, что при термическом окислении метана (выше 400°C), наряду с формальдегидом (главным промежуточным продуктом реакции при термическом окислении), в заметных количествах образуется и метиловый спирт [3, 4]. Известно также, что с увеличением давления метана в исходной смеси выход метилового спирта возрастает [5]. Основываясь на данных работы [5], Иост [6] приходит к заключению, что в этих условиях метиловый спирт образуется в реакции, порядок которой на единицу выше порядка реакции образования формальдегида. Исходя из этого, Иост, а позже и Воеводский [7], постулируют следующую схему образования метилового спирта при окислении метана:

Таким образом постулируется бимолекулярная реакция метильного перекисного радикала с метаном, аналогичная реакции (1), но приводящая к образованию метилового спирта.

К сожалению специальных исследований, четко подтверждающих или опровергающих данную гипотезу, не проводилось, и не установлено, каков истинный механизм образования метилового спирта, какова роль элементарной реакции, приводящей к образованию метилового спирта в общей схеме окисления метана. Выполненные кинетические исследования посвящены в основном установлению роли метилового спирта, как промежуточного продукта, в процессе вырванного разветвления [4, 8].

Согласно изложенному, если постулированная Иостом и Воеводским реакция (3) на самом деле протекает, она должна конкурировать с реакцией (1). Однако реакция (1) в свою очередь конкурирует с реакцией (2). В связи с этим интересно сопоставить данные по конкуренции реакций (1) и (2) с экспериментальными данными по накоплению метилового спирта и формальдегида при высокотемпературном окислении метана и, тем самым, судить о возможной конкуренции гипотетической реакции (3) с реакцией (1). В работе [4], где изучалась кинетика накопления формальдегида и метилового спирта при инициированном окислении метана в струевых условиях при $T=650^\circ\text{C}$ и содержании метана 25% в исходной смеси (опыты проводились при атмосферном давлении), в продуктах реакции формальдегида обнаруживается в 10 раз больше чем метилового спирта. Поскольку данных по накоплению гидроперекиси в указанной работе нет, интересно оценить, во сколько раз в этих условиях количество формальдегида должно превосходить количество гидроперекиси метила. Отношение скоростей образования этих продуктов выразится следующим уравнением:

$$\frac{W_{(2)}}{W_{(1)}} = \frac{K_2(\text{CH}_3\text{OO})}{K_1(\text{CH}_3\text{OO})(\text{CH}_4)} = \frac{K_2}{K_1} \frac{1}{(\text{CH}_4)}$$

$\frac{K_2}{K_1}$; определенное при фотохимическом окислении метана [9], составляет $2,5 \cdot 10^{22} e^{-\frac{8500}{RT}}$.

Отсюда, при указанных выше условиях $\frac{W_{(2)}}{W_{(1)}} \approx 125$, т. е. в про-

дуктах реакции формальдегида должно быть в 125 раз больше, чем гидроперекиси метила. Поскольку в этих условиях формальдегида образуется всего в 10 раз больше метилового спирта, то отсюда гипотетическая реакция (3) должна протекать в $\approx 12,5$ раз быстрее реакции (1). Если эту разницу в скоростях реакций (1) и (3) приписать энергиям активации, то окажется, что $E_1 - E_3 \approx 4$ ккал/моль. Конечно, могут отличаться и предэкспоненциальные множители констант скоростей указанных реакций.

Таким образом, исходя из приведенной оценки, можно заключить, что если бимолекулярная реакция метильного перекисного радикала с метаном может приводить и к образованию метилового спирта, то при низких температурах, наряду с гидроперекисью метила, должен обнаруживаться метиловый спирт, по крайней мере, в соизмеримых количествах.

Представляется интересным, с этой точки зрения, исследование фотохимической реакции окисления метана.

Следует отметить, что при фотохимической генерации метильных радикалов в присутствии кислорода и доноров водорода в продуктах реакции обнаруживается метиловый спирт [10]. Этот факт также говорит о возможности образования метилового спирта при фотохимическом окислении метана.

Экспериментальная часть

Опыты проводились на фотохимической вакуумной струевой установке, подобной описанной ранее [11]. Источник света — ртутно-кварцевая лампа ПРК-2, помещалась внутри реактора, состоящего из цилиндрических кварцевых трубок, связанных между собой коаксиально. Конструкция такого реактора подробно описана в работе [9].

С целью исключения вторичных процессов, опыты проводились при малых временах контакта, исчислявшихся секундами. Продукты реакции по ходу процесса вымораживались в стеклянных ловушках, погруженных в жидкий азот. Для накопления продуктов реакции в больших количествах в отдельных опытах к установке (после ловушек, погруженных в этом случае в охлаждающую смесь с температурой -104°C) подключался стеклянный циркуляционный насос с магнитным приводом. Таким образом, осуществлялось многократное

прохождение смеси через реактор и тем самым обеспечивалось непрерывное облучение реагирующей смеси в струевых условиях в течение долгого времени (время контакта в этих условиях не контролировалось). Опыты проводились при $T = 250^\circ\text{C}$. Кислород в реагирующей смеси во всех случаях составлял 10%. Гидроперекись метила в продуктах реакции определялась йодометрически, а формальдегид — колориметрически, с использованием хромотроповой кислоты [9].

Для установления наличия метилового спирта в продуктах реакции применялись инфракрасная спектроскопия и газожидкостная хроматография. Систематические анализы на метиловый спирт производились хроматографически, на хроматографе ХЛ-3. Колонка была заполнена триэтиленгликолем. Температура колонки 84°C , а температура испарителя 200°C . Скорость потока газа-носителя (гелия) поддерживалась постоянной и равнялась $6,9$ л/час, при давлении на входе в колонку $1,5$ кг/см². Конденсат, полученный в опытах, вводился в колонку хроматографа в виде водных растворов.

Результаты и их обсуждение

Для установления наличия метилового спирта в продуктах реакции методом инфракрасной спектроскопии реагирующая смесь при давлении 100 мм рт. ст. в циркуляционных условиях в течение 8 часов подвергалась облучению. Вымороженные продукты реакции в вакууме испарялись в заранее эвакуированную кювету спектрофотометра ИКС-14. На рисунке 1 приводится спектрограмма продуктов реакции (а), полученная в характерной области полос поглощения деформационных и валентных колебаний O—H и C—O связей в молекулах первичных спиртов [12]. Для сравнения снят также спектр паров чистого метилового спирта, не содержащих других примесей (б). Как видно из сопоставления приведенных спектрограмм, характерные полосы поглощения в обоих случаях совпадают. Добавление паров спирта непосредственно к продуктам реакции привело только к увеличению интенсивностей полос поглощения. Данные представлены на рисунке 2.

Ввиду наличия в продуктах реакции молекул гидроперекиси метила, которые также содержат O—H и C—O связи, можно предположить, что в приведенных спектрограммах могло иметь место наложение полос поглощения. Поэтому строгим доказательством присутствия метилового спирта в продуктах реакции служит хроматографический анализ.

Опыты в дальнейшем проводились в струевых условиях (не в циркуляционных) при давлении реагирующей смеси в 50 мм рт. ст.

Для сопоставления, на рисунке 3 приводятся хроматограммы метилового спирта, полученные при вводе в колонку водных растворов чистого спирта (1), конденсата, полученного в спирте, и того же конденсата, в котором гидроперекись метила разлагалась с помощью

MnO_2 (3). Как видно из сопоставления хроматограмм (2) и (3), разложение гидроперекиси метила привело только к увеличению количества метилового спирта (известно, что MnO_2 разлагает гидроперекись метила до метилового спирта и формальдегида [13]).

Рис. 1. Спектрограмма метилового спирта, полученная на ИКС-14. а) в продуктах реакции, б) чистого метилового спирта.

Рис. 2. Спектрограмма метилового спирта, полученная на ИКС-14. а) в продуктах реакции; б) в продуктах реакции с добавкой чистого метилового спирта.

Таким образом, совокупность полученных данных говорит о том, что при фотохимическом окислении метана в продуктах реакции, наряду с гидроперекисью метила и формальдегидом, обнаруживается и метиловый спирт.

Рис. 3. Хроматограммы метилового спирта. 1 — чистого; 2 — полученного в опыте; 3 — после разложения гидроперекиси метила (в этом случае пробы взяты вдвое меньше).

Рис. 4. Кинетика накопления продуктов реакции. 1 — метилового спирта; 2 — гидроперекиси метила; 3 — формальдегида.

На рисунке 4 представлены данные по кинетике накопления метилового спирта (1), гидроперекиси метила (2) и формальдегида (3). Как видно, выход всех трех продуктов линейно возрастает с увеличением времени контакта. Наблюдаемая кинетика накопления гидро-

перекиси метила и формальдегида хорошо согласуется с существующими данными [2, 9].

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что все три продукта образуются одновременно, по независимым путям.

Таким образом, при фотохимическом окислении метана параллельно с гидроперекисью метила и формальдегидом в значительном количестве образуется метиловый спирт. Для того, чтобы установить какая именно реакция приводит к образованию метилового спирта необходимы подробные кинетические исследования. Такие исследования нами начаты. По предварительным данным оказалось, что метиловый спирт образуется и при комнатной температуре; кроме того, выход его с увеличением температуры возрастает вплоть до 300°C.

В заключение выражаем свою благодарность А. Мушегяну за помощь при проведении спектрального анализа.

Лаборатория химической физики
АН АрмССР

Поступило 12 VII 1966

ՄԵՔԱՆԻ՝ ՄՆԴԻԿԻ ԳՈԼՈՐՇԻՆԵՐՈՎ ԶԳԱՅՈՒՆԱՑՎԱԾ ՕՔՍԻԴԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՄԵՔԻԼԱՅԻՆ ԱԼԿՈՂՈԼԻ ԳՈՅԱՑՈՒՄ

Մ. Դ. Մուսերիձե, Ա. Ա. Մանթաշյան և Ա. Բ. Նալբանդյան

Ա. մ. փ. ռ. փ. ռ. ի. մ

Համաձայն ածխաջրածինների օքսիդացման շղթայական սխեմայի, մեթանի ֆոտոքիմիական օքսիդացման գլխավոր միջանկյալ պրոդուկտներ պետք է հանդիսանան միայն մեթիլի հիդրոպերօքսիդը և ֆորմալդեհիդը (որոնք և իրականում գոյանում են): Միաժամանակ հայտնի է, որ մեթանի ջերմային օքսիդացման ընթացքում (400°-ից բարձր ջերմաստիճաններում) գլխավոր միջանկյալ պրոդուկտ ֆորմալդեհիդի հետ միասին նկատելի քանակներով առաջանում է նաև մեթիլային ալկոհոլ (որը իրոք առաջանում է):

Ներկա աշխատանքում ցույց է տրված, որ մեթանի՝ սնդիկի գոլորշիներով ղգալունացված ֆոտոքիմիական օքսիդացման ընթացքում մեթիլի հիդրոպերօքսիդի և ֆորմալդեհիդի հետ միասին գոյանում է նաև մեթիլային ալկոհոլ: Փորձերը կատարված են $T=250^{\circ}\text{C}$, $P=50$ մմ Hg (CH_4-45 մմ Hg, O_2-5 մմ Hg) պայմաններում:

Ուսումնասիրել ենք պրոդուկտների կուտակման կինետիկան շիթային պայմաններում: Ստացված տվյալներից հետևում է, որ մեթիլային ալկոհոլը գոյանում է անկախ ճանապարհներով մեթիլի հիդրոպերօքսիդի և ֆորմալդեհիդի հետ միաժամանակ: Գարզելու համար, թե ինչպիսի՞ր ոճակցիայի հետևանքով է առաջանում ալկոհոլը, անհրաժեշտ են մանրամասն կինետիկական հետազոտություններ:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. *И. И. Семенов*, О некоторых проблемах химической кинетики и реакционной способности, АН СССР, Москва, 1958; *В. Я. Штерн*, Механизм окисления углеводородов в газовой фазе, АН СССР, Москва, 1960; *Н. В. Фок, А. Б. Налбандян*, Сборник, Вопросы химической кинетики, катализа и реакционной способности, АН СССР, Москва, 1955.
2. *А. А. Мантян*, Кандидатская диссертация, ИХФ, АН СССР, Москва, 1962.
3. *D. M. Newitt, A. E. Haffner*, Proc. Roy. Soc., A, 134, 591 (1932). *Л. В. Кармилова*, Кандидатская диссертация, ИХФ, АН СССР, Москва, 1954.
4. *Л. В. Кармилова, Н. С. Ениколопян, А. Б. Налбандян*, ЖФХ 20, 798 (1956).
5. *D. M. Newitt, P. Srego*, Proc. Roy. Soc., A, 154, 329 (1936); *D. M. Newitt, J. V. Gardner*, Proc. Roy. Soc., A, 147, 555 (1934).
6. *W. Jost*, Z. Elektrochem., 41, 232 (1935); *В. Иост*, Взрыв и горение в газах, ИЛ, Москва, 1952.
7. *В. В. Воеводский*, Докторская диссертация, ИХФ АН СССР, Москва, 1954.
8. *Н. С. Ениколопян*, Докторская диссертация, Москва, ИХФ АН СССР, 1959.
9. *А. А. Мантян, Р. И. Мошкина, А. Б. Налбандян*, Изв. АН АрмССР, ХН, 14, 158, 1961.
10. *M. Barber, J. Farren, J. W. Linnet*, Proc. Roy. Soc., 274, 306 (1963).
11. *А. А. Мантян, А. Б. Налбандян*, Изв. АН АрмССР, ХН, 14, 517 (1961).
12. *Л. Беллами*, Инфракрасные спектры молекул, ИЛ, Москва, 1957.
13. *Э. Дж. Э. Хавкинс*, Органические перекиси, „Химия“, Москва—Ленинград (1964).