Химия винилацетилена

LXXI. Разделение винилацетиленовых карбинолов, ацетиленовых кетоспиртов и их эфиров тонкослойной хроматографией на окиси алюминия

С. А. Мелконян, Л. Г. Григорян, В. Н. Жамагорцян и С. А. Вартамян

С помощью тонкослойной хроматографии с незакрепленным слоем окиси алюминия разделены винилацетиленовые карбинолы, ацетиленовые кетоспирты и их эфиры различного строения.

Показана возможность применения данного метода для исследования реакций винилацетиленовых соединений.

Тонкослойная хроматография с незакрепленным слоем адсорбента была использована для разделения гетероциклических соединений [1], аминокислот [2], ацетиленовых спиртов, гликолей [3] и т. д.

В данной работе метод тонкослойной хроматографии с незакрепленным слоем окиси алюминия был применен для разделения и идентификации винилацетиленовых карбинолов [4], ацетиленовых кетоспиртов и их соответствующих эфиров [5] различного строения, тем самым показана возможность применения данного метода для исследования реакций винилацетиленовых соединений. Полученные данные приведены в таблицах 1, 2 и 3.

Как видно из таблиц, значения R_F этих соединений хотя отличаются друг от друга в зависимости от их строения, но это отличие колеблется в пределах $\pm 0,04-0,05$. Намного важнее тот факт, что полученные из винилацетиленовых карбинолов ацетиленовые кетоспирты по величине R_F значительно отличаются от самих винилацетиленовых карбинолов (см. табл. 1 и 2).

Аналогичное явление наблюдается при сравнении величин R_F ацетиленовых кетоспиртов и их соответствующих эфиров.

Интересно отметить тот факт, что при замещении водорода гидроксильной группы каким-нибудь радикалом (CH_3 , C_6H_5), величина R_F увеличивается почти вдвое, что позволяет легко разделить эти соединения и контролировать процесс их образования (см. рис. 2 и 3).

В качестве примера нами была изучена реакция получения 8-метилнонин-3-ол-5-она-2 [5].

На рисунке 3 показана хроматограмма данной реакционной смеси, из которой видно, что смесь состоит из непрореагировавшего исходного карбинола (I), полученного ацетиленового кетоспирта (II) и аце-

тата (III), строение которых доказано данными элементарного анализа и ИК-спектров.

Таблица 1

Таблица 2

№	Соединения			R_F
	R	R'	R''	
1	н-C ₄ H ₉	H	H	0,76
2	изо-C ₄ H ₉	H	H	0,73
3	CH ₃	CH ₃	H	0,67
4	CH ₃	C ₂ H ₅	H	0,72
5	CH ₃	изо-C ₄ H ₉	H	0,75
6			H	0,65
7			CH ₃	0,74
8			H	0,78
9			CH ₃	0,70

№	Соединение		R_F
	R	R'	
1	н-C ₄ H ₉	H	0,42
2	изо-C ₄ H ₉	H	0,43
3	CH ₃	CH ₃	0,44
4	CH ₃	C ₂ H ₅	0,44
5	CH ₃	C ₄ H ₉	0,55

Таблица 3

№	Соединение			R_F
	R	R'	R''	
1	H	H	CH ₃	0,80
2	C ₂ H ₅	H	CH ₃	0,78
3	CH ₃	CH ₃	CH ₃	0,77
4	CH ₃	CH ₃	C ₄ H ₉	0,75

Экспериментальная часть

В качестве хроматографических пластинок применялись матовые стекла размером $12 \times 18 \times 0,2$ см. На них наносился тонкий слой окиси алюминия второй степени активности.

Рис. 1. Система растворителей эфир—бензол (2:3) (проявление парами йода): 1 — *n*-пропилвинилэтинилкарбинол, R_F 0,76 (табл. 1, № 1); 2 — октин-3-ол-5-он-2 (табл. 2, № 1), R_F 0,42; 3 — смесь веществ (табл. 1, № 1 и табл. 2, № 1), R_F 0,76 и R_F 0,42 соответственно; 4 — *i*-бутилвинилэтинилкарбинол, R_F 0,73 (табл. 1, № 2); 5 — 8-метилноннн-3-ол-5-он-2, R_F 0,43 (табл. 2, № 2); 6 — смесь веществ (табл. 1, № 2, и табл. 2, № 2) R_F 0,73 и 0,43 соответственно.

Рис. 2. Система растворителей эфир—бензол (2:3) (проявление парами йода): 1 — 5-метоксиоктин-3-он-2, R_F 0,80 (табл. 3, № 2); 2 — октин-3-ол-5-он-2, R_F 0,42 (табл. 2, № 1); 3 — смесь веществ (табл. 2, № 1 и табл. 3, № 2), R_F 0,42 и 0,80 соответственно; 4 — 5-метил-5-бутоксигексин-3-он-2-, R_F 0,75 (табл. 3, № 4); 5 — 5-метилгексин-3-ол-5-он-2, R_F 0,44 (табл. 2, № 3); 6 — смесь веществ (табл. 2, № 3, и табл. 3, № 4), R_F 0,44 и 0,75 соответственно.

Рис. 3. Система растворителей эфир—бензол (2:3) (проявление парами йода): 1 — ацетат (III), R_F 0,21; 2 — винилацетиленовый карбинол (I), R_F 0,73; 3 — ацетиленовый кетоспирт (II), R_F 0,43; 4 — реакционная смесь, R_F 0,21 (III); R_F 0,43 (II) и R_F 0,74 (I).

Институт органической химии
АН АрмССР

Поступило 2 X 1964

ՎԻՆԻԼԱՑԵՏԻԼԵՆԻ ՔԻՄԻԱՆ

LXXI. Վինիլացետիլենային սպիրտների, ացետիլենային կետոսպիրտների և նրանց եթերների բաժանումը քրոմատոգրաֆիայով բարակ շերտով ալյումինիումի օքսիդի վրա

Ս. Ս. Մելիսյան, Լ. Գ. Գրիգորյան, Վ. Ն. Ժամազյան
և Ս. Հ. Վարդանյան

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Ճուլը է տրված չամրացած, բարակ շերտով ալյումինիումի օքսիդի վրա քրոմատոգրաֆիայի միջոցով տարբեր կառուցվածքի վինիլացետիլենային սպիրտների, ացետիլենային կետոսպիրտների և նրանց համապատասխան եթերների միմյանցից բաժանելու հնարավորությունը:

Բաժանումը կատարվում է ապակյա թիթեղի վրա, որպես լուծիչ օգտագործելով եթերի և բենզոլի խառնուրդը 2:3 հարաբերությամբ: Կետերն է հալտ են բերվում յոդի գույրը 2:3 հարաբերությամբ:

Բերված են տարբեր կառուցվածքի 10 վինիլացետիլենային միացությունների քրոմատոգրաֆիական հաստատունները (R_F): Ցույց է տրված, որ վինիլացետիլենային սպիրտների ՕН-խմբի ջրածնի փոխարինումը որևէ ազդեցություն չունի R_F-ի կրկնակի մեծանալուն:

Ցույց է տրված նաև վինիլացետիլենային միացությունների ռեակցիաների ուսումնասիրության հնարավորությունը սովյալ մեթոդով:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. E. A. Mistrukow, Coll. 26, 2071 (1961).
2. M. Motter, Anal. Chim. Acta, 13, 46 (1955).
3. А.А. Ахрем, А. И. Кузнецова, Ю. А. Титов, И. С. Левина, Изв. АН СССР, ОХН, 1962, 657.
4. И. Н. Назаров, Изв. АН СССР, 1938, 683.
5. С. А. Вартамян, Л. Г. Григорян, В. Н. Жамагорцян, Изв. АН АрмССР, ХН, 18 300 (1965).