Исследования в области аминов и аммониевых соединений

XXXVI. Термическое и щелочное расщепление четвертичных аммониевых солей, содержащих 2,3-диметилбутен-2-ильную и циклопентен-2-ильную группы

А. Т. Бабаян, Г. Т. Мартиросян, Д. В. Григорян и Э. А. Григорян

Изучено термическое и щелочное расщепление четвертичных аммониевых солей, содержащих 2,3-диметилбутен-2-ильную и циклопентен-2-ильную группы. Показано, что эти группы по легкости отщепления превосходят 3-метилбутен-2-ильную при термическом расщеплении и уступают ей при щелочном.

Ранее было изучено термическое и щелочное расщепление четвертичных аммониевых солей, содержащих β, γ -непредельные группы. Был выяснен ряд закономерностей по влиянию заместителей как в аммониевом комплексе, так и в β, γ -непредельной группе на ход реакции [1, 2].

Настоящая работа посвящена изучению реакции термического и щелочного расщепления четвертичных аммониевых солей, содержащих 2,3-диметилбутен-2-ильную и циклопентен-2-ильную группы. Результаты реакции термического расщепления приведены в таблице 2, щелочного расщепления — в таблице 3.

Как видно из данных таблицы 2, термическое расщепление четвертичных аммониевых солей, содержащих как 2,3-диметилбутен-2-ильную, так и циклопентен-2-ильную группы, протекает гладко, без побочных реакций и приводит к соответствующим диенам с высокими выходами.

При термическом расщеплении соли II (табл. 2) в качестве безазотистого продукта реакции образуется 2,3-диметилбутадиеп, а при расщеплении соли IV — циклопентадиен. Следовательно, в этой реакции 2,3-диметилбутен-2-ильная и циклопентен-2-ильная группы по легкости отщепления превосходят 3-метилбутен-2-ильную [2].

Как и следовало ожидать, при щелочном расщеплении солей II и IV (см. табл. 3) в качестве безазотистого продукта реакции в обоих случаях получается изопреп, т. е. при реакции щелочного расщепления эти группы по легкости отщепления уступают 3-метилбутен-2-ильной.

Нужные для получения исходных четвертичных аммониевых солей третичные амины 1-диметиламино- и 1-диэтиламино-2,3-диметилбутены-2 были синтезированы присоединением диметиламина и

диэтиламина к 2,3-диметилбутадиему в присутствии каталитических количеств натрия [3]. Попытки получить 1-диметиламино-циклопентен-2 аналогичным путем не дали положительного результата; этот амин мы получили по следующей схеме:

Суммарный выход 50%. Данные о полученных четвертичных аммониевых солях приведены в таблице 1.

Экспериментальная часть

Расщепление йодистого триметил(2,3-диметилбутен-2-ил)-аммония (I). а) *Термическое.* 13,4 г (0,05 моля) соли нагревалось в колбе Вюрца, соединенной с холодильником и приемником, в течение 20 минут при 200—210°C. В отгоне получено 3,64 г (88,6%) 2,3-диметилбутадиена с т. кип. 64—65°/680 мм, n_D^{20} 1,4400 [4]. Остаток в реакционной колбе (9,6 г) промыт ацетоном. Получено 9,2 г (выход почти количественный) йодгидрата триметиламина с температурой плавления 255°; не дает депрессии температуры плавления с известным образцом.

б) *Щелочное.* Смесь 12,7 г (0,047 моля) соли, 4 г едкого натра, 10 мл воды и 10 мл полиэтиленгликоля кипятилась на масляной бане. Реакция начинается при 98°. К концу расщепления температура реакционной смеси была доведена до 123°. Выделившийся при расщеплении триметиламин — 0,041 моля (87,2%) улавливался титрованным раствором соляной кислоты; хлоргидрат плавится при 274° и не дает депрессии температуры плавления в смеси с известным образцом. Получено 2,9 г (75,2%) 2,3-диметилбутадиена с т. кип. 64—66°/680 мм, n_D^{20} 1,4396.

Термическое расщепление хлористого диметил-(3-метилбутен-2-ил)-(2,3-диметилбутен-2-ил)аммония (II). Опыт проведен аналогично первому. Из 19,4 г (0,086 моля) соли при нагревании (135—150°) было получено 7 г (0,0852 моля, 99%) 2,3-диметилбутадиена с т. кип. 63—65°/680 мм, n_D^{20} 1,4380; d_4^{20} 0,7234, 12,3 г (0,0822 моля, 95,5%) хлоргидрата 1-диметиламино-3-метилбутена-2, подщелочением которого получено 7,65 г (0,0677 моля, 78,8%) свободного основания с т. кип. 115—118°/680 мм, n_D^{20} 1,4280. Пикрат плавится при 101° и не дает депрессии температуры плавления в смеси с известным образцом.

Щелочное расщепление хлористого диэтил-(3-метилбутен-2-ил)-(2,3-диметилбутен-2-ил)аммония (IIa). Смесь 15,6 г (0,06 моля) соли, 4,8 г едкого натра и 19 мл воды кипятилась на масляной бане. Реакция начинается при температуре реакционной смеси 105°. С водяным паром перегоняются продукты расщепления, которые со-

Четвертичные аммониевые соли

И с х о д н ы е		Полученная соль	Выход в %	Т. пл. в °С	Молекулярная формула	% полного галонда	
а м и н	алкилгалогенид					найденно	вычислено
$(\text{CH}_3)_2\text{NCH}_2\text{C}(\text{CH}_3)=\text{C}(\text{CH}_3)_2$	CH_3J	$(\text{CH}_3)_2\overset{+}{\text{N}}\underset{\text{J}}{-}\text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)=\text{C}(\text{CH}_3)_2^*$ I	98	215—16	$\text{C}_9\text{H}_{20}\text{NJ}$	46,64	47,21
.	$\text{ClCH}_2\text{CH}=\text{C}(\text{CH}_3)_2$	$(\text{CH}_3)_2\overset{+}{\text{N}}\underset{\text{Cl}}{-}\begin{cases} \text{CH}_2\text{CH}=\text{C}(\text{CH}_3)_2 \\ \text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)=\text{C}(\text{CH}_3)_2 \end{cases}$ II	96	108—10	$\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{NCl}$	14,91	15,32
$(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{NCH}_2\text{C}(\text{CH}_3)=\text{C}(\text{CH}_3)_2$	.	$(\text{C}_6\text{H}_5)_2\overset{+}{\text{N}}\underset{\text{Cl}}{-}\begin{cases} \text{CH}_2\text{CH}=\text{C}(\text{CH}_3)_2 \\ \text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)=\text{C}(\text{CH}_3)_2 \end{cases}$ IIa	96	—	$\text{C}_{15}\text{H}_{20}\text{NCl}$	13,85	13,68
$(\text{CH}_3)_2\text{N}$	CH_3J	$(\text{CH}_3)_2\overset{+}{\text{N}}\underset{\text{J}}{-}$	94	181—82	$\text{C}_9\text{H}_{18}\text{NJ}$	50,45	50,04
.	$\text{ClCH}_2\text{CH}=\text{C}(\text{CH}_3)_2$	$(\text{CH}_3)_2\overset{+}{\text{N}}\underset{\text{Cl}}{-}\begin{cases} \text{CH}_2\text{CH}=\text{C}(\text{CH}_3)_2^{**} \\ \text{cyclopentane ring} \end{cases}$ IV	80	126—27	$\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{NCl}$	16,95	16,39

* Соль получена прикапыванием йодистого метила в эфирный раствор аммина.

** Соль получена при долгом стоянии эквимолекулярной смеси аммина и галондного алкила.

Таблица 2

Термическое расщепление четвертичных аммониевых солей

Исходная соль	Выход продуктов расщепления в %/%	
	неаминных	аминных
$\begin{array}{c} (\text{CH}_3)_3\text{N}^+-\text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)=\text{C}(\text{CH}_3)_2 \\ \text{J} \\ \text{I} \end{array}$	$\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}_2$ (89)	$(\text{CH}_3)_3\text{N}$ (100)
$\begin{array}{c} (\text{CH}_3)_2\text{N}^+ \begin{array}{l} \text{CH}_2\text{CH}=\text{C}(\text{CH}_3)_2 \\ \text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)=\text{C}(\text{CH}_3)_2 \end{array} \\ \text{Cl}^- \\ \text{II} \end{array}$	$\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}_2$ (99)	$(\text{CH}_3)_2\text{NCH}_2\text{CH}=\text{C}(\text{CH}_3)_2$ (79)
$\begin{array}{c} \text{Cyclopentane ring}-\text{N}^+(\text{CH}_3)_3 \\ \text{J} \\ \text{III} \end{array}$	(91)	$(\text{CH}_3)_3\text{N}$ (95)
$\begin{array}{c} \text{Cyclopentane ring}-\text{N}^+ \begin{array}{l} \text{CH}_2\text{CH}=\text{C}(\text{CH}_3)_2 \\ (\text{CH}_3)_2 \end{array} \\ \text{Cl}^- \\ \text{IV} \end{array}$	(78)	$(\text{CH}_3)_2\text{NCH}_2\text{CH}=\text{C}(\text{CH}_3)_2$ (79)

Таблица 3

Щелочное расщепление четвертичных аммониевых солей

Исходная соль	Выходы продуктов расщепления в %/%	
	неаминных	аминных
$\begin{array}{c} (\text{CH}_3)_3\text{N}^+-\text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)=\text{C}(\text{CH}_3)_2 \\ \text{J} \\ \text{I} \end{array}$	$\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}_2$ (75)	$(\text{CH}_3)_3\text{N}$ (87)
$\begin{array}{c} (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{N}^+ \begin{array}{l} \text{CH}_2\text{CH}=\text{C}(\text{CH}_3)_2 \\ \text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)=\text{C}(\text{CH}_3)_2 \end{array} \\ \text{Cl}^- \\ \text{IIa} \end{array}$	$\text{CH}_2=\text{CHC}(\text{CH}_3)=\text{CH}_2$ (67)	$(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NCH}_2\text{C}(\text{CH}_3)=\text{C}(\text{CH}_3)_2$ (93)
$\begin{array}{c} \text{Cyclopentane ring}-\text{N}^+(\text{CH}_3)_3 \\ \text{J} \\ \text{III} \end{array}$	(67)	$(\text{CH}_3)_3\text{N}$ (99)
$\begin{array}{c} \text{Cyclopentane ring}-\text{N}^+ \begin{array}{l} \text{CH}_2\text{CH}=\text{C}(\text{CH}_3)_2 \\ (\text{CH}_3)_2 \end{array} \\ \text{Cl}^- \\ \text{IV} \end{array}$	$\text{CH}_2=\text{CHC}(\text{CH}_3)=\text{CH}_2$ (71)	$(\text{CH}_3)_2\text{N}-\text{Cyclopentane ring}$ (92)

бираются в охлаждаемом льдом приемнике. Отгон подкислен соляной кислотой, верхний слой отделен, высушен и перегнан. Получено 2,6 г (0,04 моля, 66,61%) изопрена с т. кип. $33^{\circ}/680$ мм, n_D^{20} 1,4208.

Солянокислый слой обработан щелочью, экстрагирован эфиром, экстракт высушен и перегнан. Получено 8,6 г (0,056 моля, 93,3%) 1-диэтиламино-2,3-диметилбутена-2 с т. кип. $58^{\circ}/14$ мм, n_D^{20} 1,4445, оксалат которого плавится при $78-79^{\circ}$ и не дает депрессии температуры плавления в смеси с известным образцом [3].

Расщепление йодистого триметил-(циклопентен-2-ил)аммония (III). а) *Термическое.* Опыт проведен аналогично первому. Из 15,8 г (0,06 моля) соли при нагревании ($185-190^{\circ}$) получено 3,6 г (0,0545 моля, 90,8%) циклопентадиена с т. кип. $37-38^{\circ}$, n_D^{20} 1,4485 [5] и 10,7 г (0,0572 моля, 95,3%) йодгидрата триметиламина, который плавится при 255° и не дает депрессии температуры плавления в смеси с известным образцом.

б) *Щелочное.* Опыт проводили аналогично второму. Из 26,1 г (0,102 моля) соли, 8 г едкого натра, 16 мл воды и 16 мл полиэтиленгликоля получено 4,5 г (0,067 моля, 67%) циклопентадиена с т. кип. $36-39^{\circ}/680$ мм, n_D^{20} 1,4470, и 0,10082 моля (98,8%) триметиламина, пикрат которого плавится при 216° и не дает депрессии температуры плавления в смеси с известным образцом.

Расщепление хлористого диметил-(3-метилбутен-2-ил)-(циклопентен-2-ил)аммония (IV). а) *Термическое.* Из 13,9 г (0,0645 моля) соли нагреванием при $145-160^{\circ}$ получено 3,3 г (0,05 моля, 77,5%) циклопентадиена с т. кип. $35-38^{\circ}/680$ мм, n_D^{20} 1,4490 и 5,8 г (0,051 моля, 79%) 1-диметиламино-3-метилбутена-2 с т. кип. $116-119^{\circ}$, n_D^{20} 1,4295.

б) *Щелочное.* Из 26 г (0,12 моля) соли, 9,6 г едкого натра, 19 мл воды и 12 мл полиэтиленгликоля получено 5,8 г (71%) изопрена с т. кип. $32-33^{\circ}/680$ мм, n_D^{20} 1,4208 и 12,4 г (92,2%) 1-диметиламиноциклопентена-2 с т. кип. $125-127^{\circ}/680$ мм, n_D^{20} 1,4520, пикрат которого плавится при 182° и не дает депрессии температуры плавления в смеси с известным образцом.

Получение 1-диметиламиноциклопентена-2. Через раствор 51 г (0,7727 моля) циклопентадиена в 100 мл четыреххлористого углерода, при охлаждении до $-15, -10^{\circ}$ был пропущен ток сухого хлористого водорода до поглощения 31 г. На следующий день к реакционной смеси добавлено 150 мл эфира, и при охлаждении льдом пропущен диметиламин до поглощения 72 г. Смесь оставлена на ночь. На следующий день фильтрованием отделен хлоргидрат диметиламина (35,7 г). Фильтрат обработан соляной кислотой до кислой реакции. Из солянокислого слоя подщелочением получено 42,3 г (0,381 моля, 49,3%) 1-диметиламиноциклопентена-2 с т. кип. $44^{\circ}/32$ мм, d_4^{20} 0,8530; n_D^{20} 1,4540. Пикрат плавится при 182° . По литературным:

данным [6], т. кип. 129—131°/760 мм, 37°/30 мм, n_D^{20} 1,4549; т. пл. пикрата 162°.

Расхождение температур плавления пикратов побудило нас определить содержание азота. Найдено %: N 16,08, $C_{13}H_{16}O_7N_4$. Вычислено %: N 16,47.

Институт органической химии
АН АрмССР

Поступило 21 VII 1964

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՄՈՆԻՈՒՄԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

XXXVI. 2,3--Դիմեթիլբուտեն-2-ի և ցիկլոպենտեն-2-ի խմբեր պարունակող չորրորդային ամոնիումային աղերի ջերմային և հիմնային ճեղքումը

(Ս. Թ. Բաբայան, Գ. Թ. Մարտիրոսյան, Զ. Վ. Գրիգորյան և Է. Ա. Գրիգորյան)

Ներկա աշխատանքում ուսումնասիրել ենք 2,3-դիմեթիլբուտեն-2-ի և ցիկլոպենտեն-2-ի խմբեր պարունակող չորրորդային ամոնիումային աղերի (աղյուսակ 1) ջերմային և հիմնային ճեղքման ռեակցիաները: Ջերմային ճեղքման արդյունքները բերված են 2, իսկ հիմնային ճեղքման ռեակցիայի արդյունքները՝ 3 աղյուսակում: Համաձայն աղյուսակներում բերված տվյալների, վերը նշված խմբեր պարունակող չորրորդային ամոնիումային աղերի ջերմային և հիմնային ճեղքումն ընթանում է հարթ, առանց կողմնակի ռեակցիաների և հանգեցնում է համապատասխան դիմենների և երրորդային ամինների գոյացման:

Ցուլց է տրված, որ վերը նշված խմբերն իրենց պոկման դյուրինությունը գերազանցում են 3-մեթիլբուտեն-2-ի խմբին՝ ջերմային ճեղքման և զիջում վերջինին՝ հիմնային ճեղքման ժամանակ:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. А. Т. Бабаян, Г. Т. Мартirosян, ЖОХ, 31, 819 (1961); А. Т. Бабаян, Ж. Т. Гегелян, М. Г. Инджикян, ЖОХ, 31, 611 (1961); А. Т. Бабаян, Г. Т. Мартirosян, С. Т. Кочарян, Изв. АН АрмССР, ХН, 16, 37 (1963); А. Т. Бабаян, М. Г. Инджикян, А. А. Григорян, Р. Б. Минасян, ЖОХ, 33, 1766 (1963).
2. А. Т. Бабаян, Г. Т. Мартirosян, ДАН, АрмССР, 32, 2, 87 (1961).
3. Г. Т. Мартirosян, Э. А. Григорян, А. Т. Бабаян, Изв. АН АрмССР, ХН, 18, 161 (1965).
4. П. Вацулик, „Химия мономеров“, ИЛ, Москва, 1960, т. I, стр. 661.
5. G. Kraemer, A. Spltker, Ber. 29, 552 (1896).
6. P. Maitte, Bull. soc. chim. France 1959, 499.