Химия винилацетиленов

LXV. Дегидратация симметричных и несимметричных ацетиленовых гликолей в соответствующие винилацетиленовые спирты и диениновые углеводороды с помощью серной кислоты

С. А. Вартамян, С. К. Пиренян и Р. В. Токиаджян

Подобраны оптимальные условия дегидратации симметричных и несимметричных ацетиленовых гликолей (I) в винилацетиленовые карбинолы (II).

Известно, что винилацетиленовые спирты [1], симметричные и несимметричные ацетиленовые гликоли [2] и третичные диацетиленовые гликоли [3] дегидратируются при нагревании с разными дегидратирующими агентами. В случае дегидратации тетраметилбутиндиола было установлено, что наряду с основным продуктом реакции — 2,5-диметилгексадиен-1,5-ином-3 — образуется также продукт односторонней дегидратации 2,5-диметилгексен-1-ин-3-ол-5 [4].

Ранее нами было показано [3], что дегидратация диацетиленового гликоля 2,7-диметилоктадиин-3,5-диола-2,7 с помощью катионита КУ—1Н⁺ в растворе бензола или толуола приводит к получению смеси 2,7-диметилоктен-1-диин-3,5-ола-7 и 2,7-диметилоктадиен-1,7-диин-3,5. В присутствии серной кислоты основным продуктом реакции является винилацетиленовый карбинол.

В настоящей работе показано, что симметричные и несимметричные ацетиленовые гликоли (I) также подвергаются дегидратации в присутствии серной кислоты с образованием смеси винилацетиленовых карбинолов (II) и диениновых углеводородов (III).

Реакция дегидратации ацетиленовых гликолей (I) может протекать путем первоначального отщепления одной молекулы воды с образованием винилацетиленовых спиртов (II) и последующей дегидратации последних, с образованием дивинилацетиленовых углеводородов (III), по схеме А. Не исключено также протекание дегидратации гликоля (I) по схеме Б.

- где:
- а. $R_1=R_4=H$, $R_2=R_3=CH_3$; б. $R_1=H$, $R_2=R_3=R_4=CH_3$;
 - в. $R_1=R_2=R_3=R_4=CH_3$; г. $R_1=H$, $R_2=CH_3$, R_3 и $R_4=-(CH_2)_4-$;
 - д. R_1 и $R_2=R_3$ и $R_4=-(CH_2)_4-$.

Как видно из данных таблицы, при большей продолжительности реакции углеводороды (III) получают в большем количестве, чем спирты (II), а с уменьшением продолжительности реакции количество спирта (II) в смеси увеличивается. При сравнительно низкой температуре (50°) и при нагревании в течение одного часа большая часть гликоля возвращается обратно; при этом спирта образуется больше диенина; при нагревании же в течение 6 часов спирт и диенин образуются в почти равных количествах. Из вышесказанного следует, что реакция дегидратации ацетиленовых гликолей протекает, по-видимому, по схеме А.

Установлено, что в зависимости от строения исходного гликоля, количества и концентрации серной кислоты, температуры реакции и продолжительности опыта соотношение диенинов (III) и ениновых спиртов (II) строго меняется. В случае гликоля (Ia) дегидратация с продолжительностью опыта 8 часов приводит к получению диенина (III) с выходом 50—55% и спирта (II) с выходом 40—42%. При менее длительном нагревании (2—5 часов) в тех же условиях в смеси продуктов реакции диенин (III) составляет 5—18%, а карбинол (II) 53—58%. При дегидратации гликоля (Iб) с продолжительностью опыта 1 час выход соответствующего карбинола (II) составляет 63—65%, а диенина (III) — 14—15%. При более длительном времени опыта (3—4 часа) оба соединения получают почти в равных количествах. Интересно отметить, что при дегидратации этого гликоля отщепление первой молекулы воды происходит исключительно за счет этильного радикала, с образованием спирта (IIб).

В ИК-спектре спирта (IIб) найдены: частота, характерная для сопряженной тройной связи, в области 2162 см^{-1} , частота сопряженной двойной связи в области 1615 см^{-1} , гидроксильной группы в областях 3423 см^{-1} , 3388 см^{-1} . Частота, характерная для изопропенильной группы, не обнаружена.

В случае дегидратации симметричного гликоля (Iв) соответствующий карбинол (II) получается с выходом 47%.

При дегидратации гликоля (Iг) наряду с диенином (IV), (5—20%), получается смесь двух изомерных карбинолов (V) и (VI) (45—60%) в соотношении 2 : 1:

Гликоль I	К-во в г	К-во 40% H ₂ SO ₄ в г	Т-ра реак- ции в °C	Продолжит. в часах	Полученный продукт		Т. кип. в °C/мм
					II и III в г	выход в %	
1a	30	40	70	8	IIa 12 IIa 11	53,5 42	46/40 65/10
1a	30	40	70	6	IIIa 4 IIa 14	17,8 53,4	—
1a	30	40	70	2	Ia 3,3 IIIa 0,8 IIa 15	— 3,6 57,2	—
1б	15	20	70	3	IIIб 3,9 IIб 3,7	33,8 27,8	65/40 76/10
1б	15	20	70	1	IIIб 2,9 IIб 5,4	25,1 40,5	—
1б	15	40	70	1	IIIб 1,7 IIб 8,3	14,8 62,5	—
1в	15	40	70	1,5	IIIв 7,5 IIв* 3,2	63,5 23,8	60/10 85—86/10
1в	15	40	50	1	IIIв 1,7 IIв 3,4 Iв 9	14,4 25,3 —	—
1в	14	40	50	6	IIIв 5,1 IIв 5,9	46,2 47,1	—
1г	15	40	70	2	IV 2 V 5,5 VI 2,6	16,6 40,7 19,3	61/1 79—80/1 т. пл. 57—58
1д	10	40	15 мин 90 45 " 70	1	IIIд 6,3	75,2	118/1
1д	20	40	1 час 90 1 час 70	2	IIIд 13,7	81,8	—

* В литературе указано т. кип. 117—120 при 15 мм; п²⁵_D 1,4611 [8].

Таблица

n _D ²⁰	Молекулярная формула	А н а л и з в %				Ссылка на литературу
		С		Н		
		найдено	вычислено	найдено	вычислено	
1,4860	C ₈ H ₁₀	—	—	—	—	[2]
1,4730	C ₈ H ₁₂ O	—	—	—	—	[4]
—	—	—	—	—	—	—
—	C ₈ H ₁₄ O ₂	—	—	—	—	—
1,4910	C ₉ H ₁₂	—	—	—	—	[2]
1,4750	C ₉ H ₁₄ O	78,27	78,26	10,18	10,14	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
1,4970	C ₁₀ H ₁₄	—	—	—	—	[2]
1,4790	C ₁₀ H ₁₆ O	—	—	—	—	[8]
—	—	—	—	—	—	—
—	C ₁₀ H ₁₈ O ₂	79,18	78,94	10,27	10,52	—
1,5285	C ₁₁ H ₁₄	—	—	—	—	[2]
1,5090	C ₁₁ H ₁₆ O	—	—	—	—	[9]
—	C ₁₁ H ₁₈ O	—	—	—	—	[7]
1,5565	C ₁₄ H ₁₈	—	—	—	—	[2]
—	—	—	—	—	—	—

Смесь карбинолов (V) и (VI) разделена и очищена методом тонкослойной хроматографии на пластинке (13×18 см) с использованием Al_2O_3 (фракция 0,25 меш, II степени активности) в качестве абсорбента и смеси бензол-эфир (5:1) в качестве растворителя (соединение (VI) $R_{F_1} = 0,61$, соединение (V) $R_{F_2} = 0,77$). Очищенные таким образом фракции подвергнуты спектральному анализу. В ИК-спектре карбинола (V) найдены частоты, характерные для сопряженной тройной связи в области 2187 см^{-1} , для сопряженной двойной связи в области 1613 см^{-1} и для гидроксильной группы в областях 3415 см^{-1} и 3369 см^{-1} . Частота, характерная для изопропенильной группы, не обнаружена. Строение карбинола (V) доказано также путем расщепления в ацетон и циклогексенилацетилен. Ацетон идентифицирован в виде 2,4-динитрофенилгидразона (т. пл. 128°) [5]. Константы Δ' -циклогексенилацетилена хорошо совпали с литературными данными [6].

Карбинол (VI) — кристаллическое вещество с т. пл. $57-58^\circ$ [7]. В ИК-спектре карбинола (VI) обнаружены частоты, характерные для сопряженной тройной связи в области 2187 см^{-1} , для сопряженной двойной связи в области 1615 см^{-1} , для гидроксильной группы в областях 3280 , 3343 см^{-1} и изопропенильной группы в области 3093 см^{-1} .

Дегидратация гликоля (Id), независимо от условий реакции, приводит почти исключительно к соответствующему диенину (IIIд) с выходом $75-82\%$.

Все вышеописанные карбинолы (II) дегидратируются в соответствующие диенины (III) в присутствии 40% -ной серной кислоты или разных катионитов в H^+ -форме [1-3].

Экспериментальная часть

Дегидратация третичных симметричных и несимметричных гликолей проводилась следующим образом: в трехгорлую колбу, снабженную механической мешалкой, обратным холодильником и термометром, помещались гликоль (I) и 40% -ная серная кислота, и смесь при перемешивании нагревалась до требуемой температуры (см. таблицу). По окончании реакции масляный слой отделялся, водный нейтрализовался поташом и также экстрагировался эфиром. Эфирные экстракты соединялись, нейтрализовались раствором соды, промывались водой, высушивались сульфатом магния, и после удаления эфира остаток перегонялся в вакууме. Константы полученных соединений, выходы, а также условия реакции приведены в таблице.

ՎԻՆԻԼԱՑԵՏԻԼԵՆԻ ՔԻՄԻԱՆ

LXV. Սիմետրիկ և ոչսիմետրիկ ացետիլենային գլիկոլների դեհիդրատացումը համապատասխան վինիլացետիլենային սպիրտների և դիենային ածխաջրածիւցների ծծմբական բրվի օգնությամբ

Ս. Հ. Վարդանյան, Ս. Կ. Փիրեանյան և Ռ. Վ. Թոփաշյան

Ա մ փ ո փ ու մ

Մեր նախորդ աշխատանքներից մեկում պարզված է, որ դիացետիլենային գլիկոլները, կախված ռեակցիայի պայմաններից, կատոնիտների կամ ծծմբական թթվի հետ տաքացնելիս ենթարկվում են դեհիդրատացման, առաջացնելով համապատասխան վինիլդիացետիլենային կարբինոլների և դիվինիլդիացետիլենային ածխաջրածիւցների խառնուրդ:

Ներկա աշխատանքում պարզված է, որ ացետիլենային սիմետրիկ և ոչսիմետրիկ գլիկոլները 40%⁰-նոց ծծմբական թթվի հետ տաքացնելիս առաջացնում են ենինային կարբինոլների և դիենինային ածխաջրածիւցների խառնուրդ: Յուրյ է տրված, որ կախված ելանյութ գլիկոլից, թթվի քանակից և կոնցենտրացիայից, ռեակցիայի ջերմաստիճանից և փորձի տեղում թլունից, դեհիդրատացումը հնարավոր է հիմնականում ուղղել համապատասխան վինիլացետիլենային կարբինոլների ստացման ուղղությամբ:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. С. А. Вартамян, С. К. Пиренян, Р. В. Токмаджян, Изв. АН АрмССР, ХН, 17, 513 (1964).
2. С. А. Вартамян, С. К. Пиренян, Р. В. Токмаджян, Изв. АН АрмССР, ХН, 18, 175 (1965).
3. С. А. Вартамян, С. К. Пиренян, Р. В. Токмаджян, Изв. АН АрмССР, ХН, 18, 126 (1965).
4. G. Dupont, Ann. chim. et phys., 30, 513 (1913).
5. Н. Хейльброн, Г. М. Бэнбери, Словарь орг. соед., Москва, ИЛ, 1949, стр. 13.
6. J. C. Hamlet, Н. В. Henbest, E. R. H. Jones, J. Chem. Soc. 1951, 2652.
7. И. Н. Назаров, Изв. АН СССР, ОМОН, серия хим. № 3, 683 (1938).
8. A. F. Thomson, Jr., Ch. Margnetti, J. Am. Chem. Soc., 64, 573 (1942).
9. С. А. Вартамян, Г. А. Чухаджян, В. Н. Жамагорця, Изв. АН АрмССР, ХН, 12, 107 (1959).