ОБЩАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

УДК 532.13+678.763.2

СВЕТОРАССЕЯНИЕ И ВЯЗКОСТЬ РАСТВОРОВ
 НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛИХЛОРОПРЕНА

А. В. ГЕВОРКЯН и Р. А. КАРАПЕТЯН

В статье приведены результаты исследования светорассеяния и вязкости растворов ряда образцов низкотемпературного (+10°) полихлоропрена в бензоле и тетра-хлорметане. Изменение микроструктуры полихлоропрена в температурном интервале (40—10°) практически не сказывается на свойствах макромолекул в растворе, о чем свидетельствуют найденные уравнения типа Марка—Куна—Хаувинка: в бензоле $[\eta] = 1,76 \cdot 10^{-4} \bar{M}_w^{0,73}$ и в тетрахлорметане $[\eta] = 1,90 \cdot 10^{-4} \bar{M}_w^{0,70}$.

Снижение температуры при эмульсионной полимеризации диено-вых мономеров приводит к некоторому изменению микроструктуры полученного полимера [1]. Не исключена возможность, что указанное обстоятельство может отразиться также на конформационных и тер-модинамических свойствах макромолекул в растворе, влияя тем са-мым, в частности, на величину постоянных в известном уравнении Марка—Куна—Хаувинка $[\eta] = KM^a$. Представляет определенный науч-ный и практический интерес экспериментальная проверка такой воз-можности на примере растворов низкотемпературного полихлоропрена. Этот интерес значительно усиливается тем фактом, что в ряде слу-чаев, при получении технических образцов этого полимера, с целью улучшения его физико-механических свойств прибегают к низкотем-пературной полимеризации.

Экспериментальные результаты и обсуждение

Исследуемые образцы полимера получены методом эмульсионной полимеризации при 10°, с применением нормального нонилмеркаптида калия в качестве регулятора [2]. Инициатором служил персульфат калия. В настоящей работе использовались нефракционированные об-разцы. Очистку и приготовление растворов для измерения проводили согласно описанному ранее методу (см. напр. [3]).

Исследовались светорассеяние и вязкость растворов шести раз-личных образцов низкотемпературного полихлоропрена в бензоле и тетрахлорметане.

Инкремент показателя преломления для системы полихлоропрен — тетрахлорметан — $dn/dc \sim 0,1$, соответственно оптическая постоянная — $H \sim 0,8 \cdot 10^{-7}$. Так как в рассматриваемом интервале молекулярных весов асимметрия светорассеяния пренебрежимо мала, измерение интенсивности рассеянного света проводили только под углом 90° .

Из-за малой величины M ($< 1 \cdot 10^6$) при определении характеристической вязкости растворов $[\eta]$ не учитывались также сдвиговые эффекты [4].

Все измерения проводились при температуре 20° .

На рисунках 1, 2 представлены результаты измерений вязкости и светорассеяния растворов полимеров.

Рис. 1. Зависимость $\frac{\eta_{уд.}}{c}$ от c для растворов низкотемпературного полихлоропрена: $\circ$ — в бензоле; $\bullet$ — в тетрахлорметане.

Рис. 2. Зависимость $\frac{Hc}{R_{90}^2}$ от c для растворов низкотемпературного полихлоропрена в тетрахлорметане.

Молекулярные характеристики, полученные экстраполяцией этих кривых к $c \rightarrow 0$, представлены в сводной таблице результатов измерения.

На рисунке 3 изображена зависимость характеристической вязкости растворов $[\eta]$ от молекулярного веса $\bar{M}_w$ (в двойном логарифмическом масштабе). Прямые, проведенные методом наименьшей суммы квадратов, позволяют написать следующие уравнения:

$$[\eta] = 1,76 \cdot 10^{-4} \bar{M}_w^{0,73} \quad (\text{в бензоле}). \quad (1)$$

$$[\eta] = 1,90 \cdot 10^{-4} \bar{M}_w^{0,70} \quad (\text{в } \text{CCl}_4). \quad (2)$$

Ранее, одним из авторов, для этого же полимера, с температурой полимеризации 40° были установлены [5, 6]:

$$[\eta] = 1,60 \cdot 10^{-4} \bar{M}_w^{0,70} \quad (\text{в бензоле}), \quad (1)$$

$$[\eta] = 1,82 \cdot 10^{-4} \bar{M}_w^{0,68} \quad (\text{в CCl}_4). \quad (2)$$

Таблица
Результаты измерения светорассеяния
и вязкости растворов низко-
температурного полихлоропрена

№ об- разцов	$\bar{M}_w \cdot 10^{-5}$	[η], дл/г	
		в бен- золе	в CCl ₄
1	1,22	0,72	0,66
2	1,41	0,82	0,75
3	1,56	0,86	0,78
4	2,44	1,18	1,08
5	3,06	1,37	1,25
6	4,57	1,92	1,73

Рис. 3. Зависимость $\lg [\eta]$ от $\lg \bar{M}_w$ для растворов низкотемпературного полихлоропрена: ●—в бензоле; ○—в тетрахлорметане.

Рис. 4. Зависимость $[\eta] M_w^{-1/2}$ от $M_w^{1/2}$ для растворов низкотемпературного полихлоропрена: ●—в бензоле, ○—в тетрахлорметане.

Сравнение этих уравнений показывает, что некоторое изменение микроструктуры молекулярной цепочки полихлоропрена, вызванное понижением температуры, практически не сказывается на свойствах макромолекул в разбавленном растворе, что кажется нам вполне естественным для такого статически свернутого гибкого полимера как полихлоропрен [7]. Непосредственным подтверждением последнего может служить постоянство значения K_0 (или „невозмущенных раз-

меров“ $(\bar{h}^2)_0^{1/2}$ т. к. $K_0 = \Phi_0 \left(\frac{\bar{h}_0^2}{M} \right)^{1/2}$ равно 1,30 · 10⁻³ (ср. [5, 9]), най-

денное графической экстраполяцией от неидеальных растворителей (см. рис. 4) [9].

В свете сказанного можно заключить, что некоторые данные, полученные в работе [10] для низкотемпературного полихлоропрена марки СС, являются мало вероятными и необоснованными.

Из приведенных уравнений видно, что при почти одинаковых значениях $[\eta]$ (что неоднократно наблюдалось на опыте) молекулярный вес полученного полимера с температурой несколько падает. Эта тенденция, по-видимому, обусловлена тем, что, как было экспериментально показано, в случае применения меркаптанов или меркаптитов в качестве регуляторов длины молекулярной цепочки, с понижением температуры расход последних заметно усиливается.

Всесоюзный научно-исследовательский и
проектный институт полимерных продуктов

Поступило 25 X 1967

ՅԱԾԻ ԶԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ՊՈԼԻՔԼՈՐԱՊՐԵՆԻ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱՅՐՈՒՄԸ ԵՎ ՄԱԾՈՒՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա. Վ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԵՎ Ռ. Ա. ԿԱՐԱԳԵՏՅԱՆ

Ա մ փ ո փ ս լ մ

Ներկա աշխատանքում բերված են ցածր ջերմաստիճանային պոլիքլորապրենի ($+10^\circ$) մի քանի նմուշների լուծույթների լուսացրման և մածուցիկության ուսումնասիրության արդյունքները բնագրում և CCl_4 -ում:

Ցույց է տրված, որ պոլիքլորապրենի միկրոստրուկտուրայի որոշ փոփոխությունը, ջերմաստիճանի $40-10^\circ$ ինտերվալում, պրակտիկորեն չի ազդում մակրոմոլեկուլի հատկությունների վրա լուծույթում: Այդ մասին են վկայում մեր կողմից գտնված Մարկի-հոլենի-Պաուլիենկի տիպի հավասարումների՝ բնագրում — $[\eta] = 1,76 \cdot 10^{-4} \bar{M}_w^{0,73}$ և CCl_4 -ում — $[\eta] = 1,90 \cdot 10^{-4} \bar{M}_w^{0,70}$.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. J. Maupard, W. Mochel, J. Pol. Sci., 13, 251 (1954).
2. Р. А. Карапетян, Р. В. Багдасарян, Л. Г. Мелконян, Арм. хим. ж., 21, 1968.
3. А. В. Геворкян, Р. В. Багдасарян, Л. Г. Мелконян, Изв. АН АрмССР, Физика, 1, 75, 81 (1966).
4. А. В. Геворкян, Арм. хим. ж., 19, 914 (1966).
5. Л. Г. Мелконян, Р. В. Багдасарян, А. В. Геворкян, ДАН, АрмССР, 41, 36 (1965).
6. А. В. Геворкян, Р. В. Багдасарян, Л. Г. Мелконян, Арм. хим. ж., 19, 245 (1966).
7. А. В. Геворкян, Изв. АН АрмССР, Физика, 1, 195 (1966).
8. А. В. Геворкян, Е. С. Егинян, Изв. АН АрмССР, Физика, 3, 19 (1968).
9. W. H. Stockmayer, M. Fixman, J. Pol. Sci., 1c, 137 (1963).
10. W. E. Mochel, J. B. Nichols, J. Am. Chem. Soc., 71, 4082 (1949).