ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

УДК 547.373

ХИМИЯ ПРОСТЫХ ЭФИРОВ С НЕНАСЫЩЕННЫМИ
 РАДИКАЛАМИ

Х. ДЕЙСТВИЕ РЕАКТИВА ГРИНЬЕРА НА АЛКИН-2-ИЛАЛКИЛОВЫЕ ЭФИРЫ.
 ПОЛУЧЕНИЕ γ,γ -ДИЗАМЕЩЕННЫХ АЛЛЕНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ

Г. М. МКРЯН, С. М. ГАСПАРЯН, Э. А. АВЕТИСЯН и Ш. Л. МНДЖОЯН

Описанная ранее реакция алкилмагниибромидов с простыми эфирами, содержащими радикалы с тройной связью в β,γ -положении, применена к ряду алкин-2-илалкиловых эфиров. В результате изомерного замещения алкоксильных групп алкильными радикалами реактива Гриньяра получены γ,γ -дизамещенные алленовые углеводороды с выходами 52—67%.

Разработанный общий способ выгодно отличается от известных способов и позволяет получать дизамещенные алленовые углеводороды с радикалами различной длины цепи в γ,γ -положении.

Было показано [1], что при действии алкилмагниибромидов на простые эфиры с бутин-2-ильным радикалом в качестве основного продукта реакции образуются γ,γ -дизамещенные алленовые углеводороды с 45—59%-ными выходами:

Реакция алкилмагниибромидов с диэфирами, а именно, 1,4-диалкоксибутинами-2 [2], привела к соответствующим 3-алкоксибутадиенам-1,2 и 2,3-диалкилбутадиенам-1,3

В результате протекания ступенчатой реакции, приводящей к сравнительно легкому замещению одной алкоксильной группы, удалось выделить соответствующие γ -алкил- γ -алкоксиметилзамещенные аллены с выходами 55—62%. Для объяснения образования γ,γ -дизамещенных алленов был предложен радикальный механизм реакции [1, 2].

С целью расширения области применения вышеуказанной реакции и разработки общего способа получения γ,γ -дизамещенных алленовых углеводородов с различной длиной цепи алкильных радикалов, мы синтезировали и подвергли действию реактива Гриньяра ряд алкин-2-илалкиловых эфиров (I). В результате реакции с алкилмагниибромидами получены шесть γ,γ -дизамещенных алленов общей формулы (II)

Синтез исходных эфиров (I) осуществлялся действием хлорметилалкиловых эфиров на натриевые производные соответствующих однозамещенных ацетиленов в жидком аммиаке по известному способу [3].

Реакция алкилмагнибромидов с бутин-2-илалкиловыми эфирами проводилась в диизоамиловом или дибутиловом эфире при 100—105°С, с дальнейшим повышением температуры реакционной смеси для полной отгонки продукта реакции. Во всех случаях, независимо от длины цепи алкильного радикала эфира и радикала алкилмагнибромидов, получаются γ,γ -дизамещенные алленовые углеводороды, т. е. продукты изомерного замещения; при этом нормальные продукты замещения (двухзамещенные ацетиленовые углеводороды), как и в случае реакции алкилмагнибромидов с бутин-2-илалкиловыми эфирами [1], отсутствуют.

Полученные алленовые углеводороды идентифицированы окислением в соответствующие кетоны и уксусную кислоту, а также снятием ИК-спектров.

Таким образом, новый способ получения дизамещенных алленовых углеводородов с радикалами разной длины цепи в γ,γ -положении является общим, и может быть рекомендован для их лабораторного получения.

Экспериментальная часть

Действие алкилмагнибромидов на алкин-2-илалкиловые эфиры. К раствору реактива Гриньяра, полученного из 2,4 г (0,1 г-ат) магния и 0,1 моля бромистого алкила в 50 мл абсолютного диизоамилового эфира, прибавлялось 0,1 моля соответствующего свежеперегнанного алкин-2-илалкилового эфира. Смесь при перемешивании нагревалась при 100—105° в течение 7 часов. Затем обратный холодильник заменялся прямоточным и продукт реакции (алленовый углеводород) отгонялся из реакционной смеси. В конце отгонки температура реакционной смеси доводилась до температуры кипения растворителя. После сушки безводным углекислым калием из отгона фракционированием выделялся соответствующий γ,γ -диалкилзамещенный аллен. Оставшаяся в реакционной колбе масса разлагалась ледяной водой, подкисленной соляной кислотой. Выделившийся масляный слой экстрагировался эфиром. После сушки и отгонки эфира фракционированием выделялся спирт, соответствующий алкоксильной группе исходного алкин-2-илалкилового эфира. Например, в одном из опытов для получения 3-метилгептадиена-1,2 к раствору метилмагнибромидов, полученного из 2,4 г (0,1 г-ат) магния и 9,5 г (0,1 моля) бромистого метила в 50 мл диизоамилового эфира,

прибавлено 16,8 г (0,1 моля) свежеперегнанного 1-бутоксигептина-2 (т. кип. 101° при 15 мм). В результате опыта выделено 9,8 г (59,4%) вещества, кипящего при 121—123°/680 мм, представляющего собой 3-метилгептадиен-1,2; n_D^{20} 1,4392; d_4^{20} 0,7602. ИК-спектр, снятый на приборе ИКС-14, показал наличие только алленовой группировки ($>C=C=CH_2$, полоса поглощения 1955 cm^{-1}); двузамещенная ацетиленовая связь не обнаружена. После разложения оставшейся в реакционной колбе смеси водой и дальнейшей обработки выделено 6,8 г (61%) бутилового спирта (т. кип. 112—114° при 680 мм). Обратно получено 6,1 г исходного 1-бутоксигептина-2 (т. кип. 101° при 15 мм, n_D^{20} 1,4386).

Окисление 3-метилгептадиена-1,2 проводилось бихроматом калия в присутствии серной кислоты по известной прописи [4]. Получен метилбутилкетон с т. кип. 121—123° при 680 мм, n_D^{20} 1,4155 [5], семикарбазон которого плавился при 117—118°, что соответствует литературным данным [6]. Выделена также уксусная кислота с т. кип. 115—116° при 680 мм.

Аналогично получены и другие дизамещенные алленовые углеводороды, выходы и физические константы которых приведены в таблице. Из них γ -этил- γ -бутилаллен получен действием этилмагнийбромиды как на 1-этокси-, так и на 1-бутоксигептин-2. 3-Этилгексадиен-1,2 получен впервые.

Таблица

R	R'	Молекулярная формула	RC $\equiv$ CCH ₂ OR*			R'MgBr	Т. кип. в °С, 680 мм	n_D^{20}	d_4^{20}	MR _D		Выход в %
			R	R''	R'					найдено	вычислено	
C ₂ H ₅	CH ₃	C ₆ H ₁₀	C ₂ H ₅	C ₄ H ₉	CH ₃	68—69	1,4300	0,7286	29,04	28,97	58,6	
C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	C ₇ H ₁₂	C ₂ H ₅	C ₄ H ₉	C ₂ H ₅	95—97	1,4320	0,7339	33,74	33,59	59,1	
C ₂ H ₇	CH ₃	C ₇ H ₁₂	C ₃ H ₇	C ₄ H ₉	CH ₃	94—96	1,4325	0,7358	33,79	33,59	59,4	
C ₂ H ₇	C ₂ H ₅	C ₈ H ₁₄	C ₃ H ₇	C ₄ H ₉	C ₂ H ₅	120—122	1,4360	0,7629	37,63	38,21	67,08	
C ₄ H ₉	CH ₃	C ₈ H ₁₄	C ₄ H ₉	C ₄ H ₉	CH ₃	121—123	1,4392	0,7602	38,05	38,21	59,39	
C ₄ H ₉	C ₂ H ₅	C ₉ H ₁₆	C ₄ H ₉	C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	143—146	1,4364	0,7662	42,24	42,82	52,1	
C ₄ H ₉	C ₂ H ₅	C ₉ H ₁₆	C ₄ H ₉	C ₄ H ₉	C ₂ H ₅	143—146	1,4368	0,7668	42,25	42,82	53,3	

Физические константы полученных дизамещенных алленов близки к литературным данным [7].

Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт полимерных продуктов

Поступило 8 X. 1966

ՉՀԱԳԵՑԱՍ ԹԱԴԻԿԱԼՆԵՐՈՎ ԵԹԵՐՆԵՐԻ ՔԻՄԻԱ

X. ԳՐԻՆՑԱՐԻ ԹԵԱԿՏԻՎԻ ԱԶԴՈՒՄԸ ԱԿԻՆ-2-ԻԱԿԻԼԵԹԵՐՆԵՐԻ ՎՐԱ:

ԴՂ-ԵՐԿՏԵՂԱԿԱԿԱՍ ԱԼԵՆԱՑԻՆ ԱՇԽԱԶՐԱՄԻՆՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄ

Գ. Մ. ՄԿՐՏԱՆ, Ս. Մ. ԳԱՍՊԱՐՑԱՆ, Է. Ա. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ և Շ. Լ. ՄՆՋՈՅԱՆ

Ա մ փ ո փ ու ռ

Նախկինում նկարագրված ալկիլմագնեզիումբրոմիդների և β , γ -դիրքում եռակի կապով ռադիկալներ պարունակող եթերների ռեակցիան գործադրված է մի շարք ալկին-2-իլալկիլեթերների նկատմամբ: Գրինյարի ռեակտիվի ալկիլ ռադիկալներով ալկոքսի խմբերի իզոմերային տեղակայման հետևանքով ստացվում են γ , γ -երկտեղակալված ալենային ածխաջրածիններ՝ 52—87%₀ ելքերով:

Այս և նախորդ հաղորդումների տվյալների հիման վրա առաջարկված է երկտեղակալված ալենային ածխաջրածինների ստացման ընդհանուր եղանակ, որը դրականապես տարբերվում է գրականության մեջ հայտնի եղանակներից և հնարավորություն է տալիս ստանալու ալենային ածխաջրածիններ, որոնք γ , γ -դիրքում պարունակում են շղթայի տարբեր երկարությամբ ռադիկալներ:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Գ. Մ. Մկրյան, Ս. Մ. Մնջոյան, Գ. Մ. Գասպարյան, *Արմ. քիմ. թ.*, 19, 37 (1966).
2. Գ. Մ. Մկրյան, Ս. Մ. Գասպարյան, Յ. Ա. Աւետիսյան, Ս. Մ. Մնջոյան, *ՋՕՐՄ*, 3, 808 (1967).
3. R. Epsztein, *Bull. soc. chim. France*, 1956, 158; P. P. Montijn, H. M. Smidt, J. H. V. Boom, H. J. T. Bos, L. Brandsman, Y. E. Arens, *Rec. trav. chim.*, 84, 271 (1965).
4. А. Альбуцкий, *ЖРХО*, 19, 365 (1887).
5. L. Clarke, *J. Am. Chem. Soc.*, 34, 681 (1921); E. Erlenmeyer, J. A. Wanklyn, *Lieb. Ann.*, 135, 145 (1865).
6. A. Michael, *J. Am. Chem. Soc.*, 41, 416 (1919).
7. А. А. Петров, А. В. Федорова, *Усп. хим.*, 33, 3 (1964).