МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ПЕРЕГРУППИРОВКИ

VI ПЕРЕГРУППИРОВКА ДИХЛОРВИНИЛОВЫХ СОЕДИНЕНИИ, СОДЕРЖАЩИХ ω -ОКСИ-, АЦЕТОКСИ-, АЛКОКСИ- И ФТАЛИМИДО- ГРУППИРОВКИ, В α -ХЛОР- ω -ЗАМЕЩЕННЫЕ КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ ПРИ ОКИСЛЕНИИ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ

В. А. ГАРИБЯН, М. Т. ДАНГЯН и Г. М. ШАХНАЗАРЯН

Ереванский государственный университет

Поступило 19 VIII 1968

Присутствие в молекулах дихлорвиниловых соединений ω -окси-, ацетокси-, алкокси- и фталимидо-групп не препятствует нормальному течению перегруппировки при окислении надкислотами, в результате чего получаются ω -окси-(ацетокси-, алкокси-, фталимидо)- α -хлоркарбоновые кислоты.

Окислением дымящей азотной кислотой из δ -окси(ацетокси)- α -хлорвалериановых кислот получена α -хлорглутаровая кислота, а из β -ацетокси(метокси)- α -хлорпропионовых кислот—гидрат щавелевой кислоты.

Библ. ссылок 9.

Настоящая работа является продолжением наших ранних исследований в области перегруппировки дихлорвиниловых соединений при эпексидировании надкислотами [1]. В сообщении приведены результаты перегруппировки при эпексидировании дихлорвиниловых соединений, содержащих окси-, алкокси-, ацетокси-, фталимидо группировки.

В литературе отсутствуют данные о влиянии каких-либо функциональных групп на перегруппировку галогенэпоксидов. Можно предполагать, что перегруппировка при эпексидировании галогенвиниловых соединений будет зависеть от присутствующих функциональных групп; при этом не исключена возможность подавления перегруппировки (миграции галогена). Влияние этих групп будет обуславливаться как их нуклеофильностью, так и отдаленностью от галогенэпоксидной группировки.

α -Хлоркарбоновые кислоты с вышеуказанными группами представляют значительный интерес с точки зрения их реакционной способности и взаимного влияния функциональных групп в молекуле.

Окислению надуксусной кислотой подвергнуты 1,1-дихлор-3-ацетоксипропен-1, 1,1-дихлор-5-ацетоксипентен-1, 1,1-дихлор-3-метоксипропен-1, 1,1-дихлор-5-оксипентен-1, 1,1-дихлор-5-фталимидопентен-1.

В отличие от метода, описанного в литературе [2], 1,1-дихлор-5-фталимидопентен-1 получен конденсацией 1,1,5-трихлорпентена-1 с фталимидом калия в присутствии небольшого количества поташа при температуре кипения диметилформамида; выход 87%.

1,1-Дихлор-3-ацетоксипропен-1 и 1,1-дихлор-5-ацетоксипентен-1 получены видоизмененным методом [3].

Из вышеперечисленных β- и δ-замещенных дихлорвиниловых соединений окислением надуксусной кислотой получены α-хлор-β- или δ-замещенные карбоновые кислоты: α-хлор-β-метоксипропионовая кислота из 1,1-дихлор-3-метоксипропена-1, α-хлор-β-ацетоксипропионовая кислота из 1,1-дихлор-3-ацетоксипропена-1, α-хлор-δ-оксивалериановая кислота из 1,1-дихлор-5-оксипентена-1, α-хлор-δ-ацетоксивалериановая кислота из 1,1-дихлор-5-ацетоксипентена-1, α-хлор-δ-фталимидовалериановая кислота из 1,1-дихлор-5-фталимидопентена-1.

При титровании α-хлор-δ-ацетоксивалериановой кислоты раствором щелочи в присутствии фенолфталеина на холоду и при нагревании получались те же данные, что исключает присутствие лактона.

Имея целью изучение направленности перегруппировки при различных заместителях, мы в некоторых случаях не пытались выделить из реакционной смеси продукты присоединения хлора по двойной связи, которые, как известно [1в], при соотношении надуксусная кислота—исходное вещество 4:1 получаются в очень малых количествах.

Таким образом установлено, что перечисленные функциональные группы не препятствуют нормальному течению перегруппировки дихлорвиниловых соединений при окислении надкислотами и что в условиях реакции указанные группы не претерпевают изменений.

Полученные ω-замещенные α-хлоркарбоновые кислоты идентифицированы сопоставлением их физико-химических констант с литературными. Их окислением концентрированной азотной кислотой (d > 1,42) получены из δ-окси(ацетокси)-α-хлорвалериановых кислот α-хлорглутаровая кислота, а из β-метокси(ацетокси)-α-хлорпропионовых кислот, вопреки ожиданиям — щавелевая кислота

Структуры некоторых из синтезированных веществ подтверждены данными ИК спектров, а индивидуальность — ТСХ.

Следует указать также, что другие способы превращения дихлорвиниловых соединений в α -хлоркарбоновые кислоты, как например, сопряженное хлорирование в присутствии серной кислоты [4] или действие дымящей азотной кислоты [5] на ди- и трихлорвиниловые соединения, имеют недостатки, особенно при наличии других функциональных групп; наряду с α -хлор- и α,α -дихлоркарбоновыми кислотами образуются побочные сульфо- и нитросоединения, идет хлорирование и окисление функциональных групп, что осложняет очистку продуктов и снижает их выход.

Экспериментальная часть*

1,1-Дихлор-3-ацетоксипропен-1. Смесь 83 г (0,57 моля) 1,1,3-трихлорпропена-1, 55 г безводного ацетата натрия, 20 мл ледяной уксусной кислоты и 3 г абсолютного пиридина кипятят в течение 16 часов. Охлажденную смесь вливают в 50 мл воды, отделяют маслянистый слой, водный — экстрагируют хлороформом, присоединяют к основной части и высушивают сульфатом магния. Удаляют хлороформ и остаток перегоняют, собирая перегоняющийся при 58—60°/10 мм 1,1-дихлор-3-ацетоксипропен-1. Выход 76,7 г (78,9%), n_D^{20} 1,4662. Литературные данные [3а]: т. кип. 71—72°/14 мм, n_D^{20} 1,4650.

1,1-Дихлор-5-ацетоксипентен-1. Смесь 73 г (0,44 моля) 1,1,5-трихлорпентена-1, 35 г безводного ацетата натрия, 12 мл ледяной уксусной кислоты и 2 г абсолютного пиридина кипятят в течение 20 часов. Обрабатывают аналогично предыдущему. Выделяют перегоняющийся при 84°/4 мм 1,1-дихлор-5-ацетоксипентен-1. Выход 61 г (75%), n_D^{20} 1,4645. Литературные данные [3б]; т. кип. 58°/1,5 мм, 83—85°/5 мм, n_D^{20} 1,4690.

1,1-Дихлор-5-фталимидопентен-1. Смесь 41 г (0,23 моля) 1,1,5-трихлорпентена-1, 52,1 г фталимида калия, 55 мл свежеперегнанного диметилформамида и 0,5 г поташа кипятят в течение 18 часов. Полученную массу несколько раз промывают водой и перекристаллизовывают из бензола. Получают 57 г (87%) 1,1-дихлор-5-фталимидопентена-1 с т. пл. 105—106°. Литературные данные [2]: т. пл. 102—103° (из бензола), 107° (из спирта).

α -Хлор- β -ацетоксипропионовая кислота. К смеси 15,7 г (0,095 моля) 1,1-дихлор-3-ацетоксипропена-1 и 100 мл уксусного ангидрида медленно, при перемешивании и охлаждении, прибавляют предварительно приготовленную смесь 41 мл 30%-ной перекиси водорода и 100 мл уксусного ангидрида. Реакционную смесь нагревают при 50—60°, пока капля метилрота обесцвечивается пробой реакционной смеси (72,5 часа). Отгоняют уксусную кислоту под уменьшенным давлением, а остаток подвергают фракционированию из колбы с дефлегматором. При 120°/3 мм перегоняется α -хлор- β -ацетоксипропионовая кислота.

* В экспериментальной работе участвовала А. И. Оганесян.

Выход 8,1 г (53,3%), n_D^{20} 1,4552. Литературные данные [46]: т. кип. 112°/1,5 мм, n_D^{20} 1,4570.

α -Хлор- β -метоксипропионовая кислота. Опыт проведен, аналогично предыдущему, с 12,5 г (0,088 моля) 1,1-дихлор-3-метоксипропена-1 и предварительно приготовленной смесью 30,6 мл 30%-ной перекиси водорода и 100 мл уксусного ангидрида. После окончания реакции (54 часа, по метилроту) и удаления уксусной кислоты в слабом вакууме остаток обрабатывают насыщенным раствором соды, экстрагируют эфиром и высушивают хлористым кальцием. Водный слой подкисляют, экстрагируют эфиром и высушивают сульфатом магния. При перегонке кислых продуктов выделена α -хлор- β -метоксипропионовая кислота; т. кип. 85—87°/3 мм, выход 5,8 г (46,5%), n_D^{20} 1,4562. Литературные данные [46]: т. кип. 79°/1,5 мм, n_D^{20} 1,4569.

Перегонкой нейтральных продуктов выделено 2,5 г (14,4%) 1,1,1,2-тетрахлор-3-метоксипропана; т. кип. 60—65°/6 мм, n_D^{20} 1,4853. Литературные данные [6]: т. кип. 58,5—59°/4 мм, n_D^{20} 1,4868.

α -Хлор- δ -оксивалериановая кислота. Опыт проведен, аналогично предыдущим, с 20 г 1,1-дихлор-5-оксипентена-1 и предварительно приготовленной смесью 58,5 мл 30%-ной перекиси водорода и 277 мл уксусного ангидрида. После завершения реакции (144 часа, по метилроту) и удаления уксусной кислоты в слабом вакууме остаток растворяют в эфире, экстрагируют 10%-ным раствором соды, подкисляют водный раствор, экстрагируют эфиром и высушивают над сульфатом натрия. α -Хлор- δ -оксивалериановую кислоту перегоняют при 154—156°/3 мм, выход 9,9 г (49,6%), n_D^{20} 1,4672, d_4^{20} 1,2788. M_{rD} найдено 33,2, вычислено 33,1. Найдено %: Cl 22,60. $C_5H_5ClO_2$. Вычислено %: Cl 23,27.

Эфирный раствор вторично экстрагируют 10%-ным раствором щелочи, водный слой подкисляют, экстрагируют эфиром, высушивают сульфатом натрия. Выделяют 1,2 г вещества, перегоняющегося при 134°/3 мм, n_D^{20} 1,5020, структура которого не выяснена. Оставшийся эфирный раствор высушивают и, фракционируя, собирают 2,9 г 1,1-дихлор-5-оксипентена-1; т. кип. 70—72°/3 мм, n_D^{20} 1,4885. Литературные данные [7]: т. кип. 56—60°/2,5 мм, n_D^{20} 1,4923.

α -Хлор- δ -ацетоксивалериановая кислота. К 20 г 1,1-дихлор-5-ацетоксипентена-1 медленно, при перемешивании и охлаждении, прибавляют предварительно приготовленную смесь 40,8 мл 30%-ной перекиси водорода и 100 мл уксусного ангидрида. После завершения реакции (30 часов, по метилроту и йодометрически) и удаления уксусной кислоты остаток растворяют в эфире, обрабатывают насыщенным раствором соды, затем 10%-ным раствором щелочи и оставшийся эфирный раствор высушивают хлористым кальцием. Из щелочного раствора после соответствующей обработки (подкисления, экстрагирования эфиром) ничего не выделяется.

Раствор соды подкисляют, экстрагируют эфиром и эфирный слой высушивают сульфатом натрия. Перегонкой выделяют α -хлор- δ -ацетоксивалериановую кислоту; т. кип. $151-153^\circ/2$ мм. Выход 9,9 г (50,2%), n_D^{20} 1,4645, d_4^{20} 1,2926. M_{RD} найдено 42,09, вычислено 42,58. Найдено %: Cl 18,79. $C_7H_{11}ClO_4$. Вычислено %: Cl 18,25. Для лактона вычислено %: Cl 26,40.

В ИК спектре имеются полосы поглощения в областях 1740 см^{-1} ($C=O$), $1160-1320\text{ см}^{-1}$ ($C-O$) и $2940-3400\text{ см}^{-1}$ (ОН кислотная).

На титрование 0,16 г α -хлор- δ -ацетоксивалериановой кислоты на холоду и при нагревании израсходовано то же количество щелочи (7,1 мл 0,102 н раствора КОН).

Перегонкой веществ нейтрального характера выделен 1,1,1,2-тетрахлор-5-ацетоксипентан; т. кип. $127-134^\circ/2$ мм. Выход 2,7 г, n_D^{20} 1,4909, d_4^{20} 1,3670. M_{RD} найдено 55,95, вычислено 55,65. Найдено %: Cl 52,49. $C_7H_{11}Cl_4O_2$. Вычислено %: Cl 52,98.

Тонкослойная хроматография на окиси алюминия со смесью растворителей эфир—хлороформ (2:1) дала одно пятно, $R_f = 0,50$. Остаток 2,1 г.

α -Хлор- δ -фталимидовалериановая кислота. Опыт проведен, аналогично предыдущим, с 20 г (0,07 моля) 1,1-дихлор-5-фталимидопентена-1 и предварительно приготовленной смесью 38 мл 30%-ной перекиси водорода и 144 мл уксусного ангидрида. После завершения реакции (56 часов, по метилроту) и удаления уксусной кислоты в слабом вакууме остаток растворяют в эфире и, экстрагируя 10%-ным раствором щелочи, выделяют вещества кислого характера. Водный раствор подкисляют, экстрагируют эфиром, высушивают сульфатом натрия. α -Хлор- δ -фталимидовалериановую кислоту перегоняют при $126-128^\circ/14$ мм. Выход 12,5 г (63,3%), т. пл. 118° (бензол). Литературные данные [2]: т. пл. $118-119^\circ$.

Окисление α -хлор- δ -окси(ацетокси)валериановых кислот концентрированной азотной кислотой (α -хлорглутаровая кислота). Смесь 7 г α -хлор- δ -ацетоксивалериановой и 9,2 г азотной ($d = 1,42$) кислот оставляют на несколько дней при комнатной температуре в закрытой колбе. Отфильтровывают α -хлорглутаровую кислоту и промывают хлороформом. Выход 4,5 г (77%), т. пл. 96° . Литературные данные [8]: т. пл. $96-97^\circ$.

Аналогично вышеуказанному, из 1,5 г α -хлор- δ -оксивалериановой и 1,97 г азотной ($d = 1,42$) кислот получено 1,1 г (67%) α -хлорглутаровой кислоты; т. пл. $96,5^\circ$.

Окисление α -хлор- β -ацетокси(метокси)пропионовых кислот концентрированной азотной кислотой. Аналогично предыдущим, из 1,8 г (0,01 моля) α -хлор- β -ацетоксипропионовой и 2,88 г азотной ($d = 1,42$) кислот получено 0,95 г (70%) гидрата щавелевой кислоты; т. пл. 101° . Литературные данные [9]: т. пл. $101,5^\circ$.

Таким же образом из 1 г α -хлор- β -метоксипропионовой и 1,6 г азотной ($d = 1,44$) кислот получено 0,5 г (56%) гидрата щавелевой кислоты; т. пл. 101°. Смешанная проба с заводомым образцом депрессии температуры плавления не дает.

ՄՈՒՆԿՈՒԿԱՑԻՆ ՎԵՐԱԽՄՐԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

VI. ω -օֆտի-, ԱԼԿՕֆտի-, ԱՑԵՏՕֆտի- եւ ՅՔԱԼԻՄԻԴԱՑԻՆ ԽՄԲԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԴԻՔԼՈՐՎԻՆԻԿԱՑԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԽՄՐԱՎՈՐՈՒՄ α -ՔԼՈՐ- ω -ՏԵՂԱԿԱԿԱՆՎԱՅ ԿԱՐՐՈՆԱԲՔՈՒՆԵՐԻ ՊԵՐՔԱՑԱԽԱԲՔՎՈՎ ՕՔՍԻԿԱՑԵՆԻՄ

Վ. Ա. ՂԱՐԻՐԱՅԱՆ, Մ. Տ. ԴԱՆԴՅԱՆ Ե Գ. Մ. ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Պերքացախաթթվով $X(CH_2)_nCH=CCl_2$ (I) (Iա, $n=1$, $X=OCH_3$, Iբ, $n=1$, $X=CH_2COO$. Iգ, $n=3$, $X=OH$. Iդ, $n=3$, $X=CH_2COO$. Iե, $n=3$, $X=C_6H_4(CO)_2N$) միացութիւնների օքսիդացմամբ գոյանում են միջանկյալ դիքլորէպօքսիդալին միացութիւնների վերահամարվորման պրոդուկտներ α -քլոր- ω -տեղակալված կարբոնաթթուներ՝ $X(CH_2)_nCHClCOOH$ (IIա-ե); Այսպիսով, ω -դիրքում վերոհիշյալ խմբերի առկայութիւնը չի խանգարում վերահամարվորման նորմալ ընթացքին, Նշված խմբերը ռեակցիայի պայմաններում փոփոխութիւն չեն ենթարկվում:

Միացող ազոտական թթվով օքսիդացնելու միջոցով ω -օքսի (ացետօքսի)- α -քլորվալերիանաթթուներից ստացված է α -քլորգլուտարաթթու, իսկ ω -ացետօքսի(մեթօքսի)- α -քլորպրոպիոնաթթուներից՝ թրթնչկաթթվի հիդրատը:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Г. М. Шахназарян, В. А. Гарибян, М. Т. Дангян, а) ЖОрХ, 4, 771 (1968); б) Арм. хим. ж., 21, 956 (1968); в) Арм. хим. ж., 21, 962 (1968).
2. Р. Х. Фрейдлина, Р. Г. Петрова, Изв. АН СССР, ОХН, 1957, 451.
3. а) А. Н. Несмеянов, Р. Х. Фрейдлина, В. Н. Кост, Изв. АН СССР, ОХН, 1956, 1202; б) А. Н. Несмеянов, Л. И. Захаркин, Р. Х. Фрейдлина, Изв. АН СССР, ОХН, 1955, 40.
4. а) А. Н. Несмеянов, В. Н. Кост, Р. Х. Фрейдлина, ДАН СССР, 103, 1029 (1955); б) А. Н. Несмеянов, В. Н. Кост, Т. Т. Васильева, Р. Х. Фрейдлина, Изв. АН СССР, ОХН, 1958, 152.
5. Л. И. Захаркин, Изв. АН СССР, ОХН, 1957, 1064; Е. И. Васильева, Р. Х. Фрейдлина, Изв. АН СССР, ОХН, 1960, 1215.
6. А. Н. Несмеянов, Р. Х. Фрейдлина, Л. И. Захаркин, Усп. хим., 25, 696 (1956).
7. А. Н. Несмеянов, Л. И. Захаркин, Р. Х. Фрейдлина, Изв. АН СССР, ОХН, 1955, 42.
8. Япон. пат. 2460 (1965) [РЖхим., 1966, 24Н27П]; Пат. США № 3256325 (1965); [РЖХим. 1967, 17Н66П].
9. Словарь орг. соед., ИЛ, Москва, 1949, т. III, стр. 322.