ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

УДК 542.91+542.952.4

ХИМИЯ ВНИЛАЦЕТИЛЕНА

LXXXV. АЦЕТИЛЕН — АЛЛЕН — КУМУЛЕНОВАЯ ПЕРЕГРУППИРОВКА
 ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ ГАЛОГЕНА АМИНАМИ
 В ВНИЛАЦЕТИЛЕНОВЫХ ГАЛОГЕНИДАХ

С. А. ВАРТАНЯН, М. Р. БАРХУДАРЯН и Ш. О. БАДАНЯН

Институт органической химии АН Армянской ССР

Поступило 2 VII 1968

Замещение галогена аминами в винилацетиленовых галогенидах протекает через ацетилен—аллен—кумуленовую перегруппировку с образованием кумуленовых аминов. Последние в присутствии сернистой ртути и серной кислоты гидратируются в α,β -ненасыщенные- β' -аминокетоны.

Табл. 4, библиографические ссылки 6.

Ранее нами было показано, что замещение галогена аминами во вторичных и третичных винилацетиленовых галогенидах протекает через ацетилен—аллен—кумуленовую перегруппировку с образованием кумуленовых аминов [1, 2]. В случае изопропенилацетиленовых галогенидов нам не удалось выделить кумуленовые амины, так как последние в условиях опыта гидратируются в α,β -непредельные- β' -аминокетоны [3].

Для установления зависимости и направленности реакции перегруппировки от природы галогена и строения винилацетиленовых галогенидов в настоящей работе изучено замещение галогена аминами в метилпропил-, метил-*трет*-бутил- и этилбутилвинилацетиленовых галогенидах (I). Оказалось, что реакция в случае указанных галогенидов протекает также через ацетилен—аллен—кумуленовую перегруппировку и в качестве единственного продукта реакции (при соотношении галогенида и амина = 1 : 3) получают соответствующие кумуленовые амины (II).

1. $R=R_1=CH_3$, $R_2=C_2H_5$, $X=Cl, Br$.
2. $R_1=CH_3$, $R_2=C_2H_5$, $R=C_2H_5$, $X=Cl$;
3. $R=R_1=CH_3$, $R_2=mp-C_4H_9$, $X=Cl, Br$;
4. $R_1=CH_3$, $R_2=mp-C_4H_9$, $R=C_2H_5$, $X=Cl, Br$;
5. $R_1=C_2H_5$, $R_2=C_4H_9$, $R=CH_3$, $X=Cl, Br$;
6. $R=R_1=C_2H_5$, $R_2=C_4H_9$, $X=Cl$;
7. $R_1=R_2=C_2H_5$, $R=CH_3$, $X=Br$;
8. $R=R_1=CH_3$, $R_2=C_4H_9$, $X=Br$.

Строение полученных аминов (II) доказано спектральным анализом и химическим путем. В ИК спектрах найдены поглощения при частотах 2060, 1697; 1644 см^{-1} , характерные для кумуленовой группировки [1—4].

При гидрировании кумуленовых аминов (II) со смесью катализаторов никеля Ренея с окисью платины (2:1) под давлением 15 атм. получены соответствующие насыщенные амины (III).

1. $\text{R}_1 = \text{CH}_3$, $\text{R}_2 = \text{C}_3\text{H}_7$; 2. $\text{R}_1 = \text{CH}_3$, $\text{R}_2 = m\text{-C}_6\text{H}_5$; 3. $\text{R}_1 = \text{C}_2\text{H}_5$, $\text{R}_2 = \text{C}_4\text{H}_9$.

При гидратации аминов (II) 10%-ным водным раствором серной кислоты в присутствии сернистой ртути получают α, β -ненасыщенные- β -аминокетоны (IV).

1. $\text{R}_1 = \text{CH}_3$, $\text{R}_2 = \text{C}_3\text{H}_7$; 2. $\text{R}_1 = \text{CH}_3$, $\text{R}_2 = m\text{-C}_6\text{H}_5$; 3. $\text{R}_1 = \text{C}_2\text{H}_5$, $\text{R}_2 = \text{C}_4\text{H}_9$.

Строение полученных аминокетонов (IV) доказано ИК спектральным анализом. В спектрах найдены поглощения при частотах 1690 см^{-1} (для карбонильной группы) и 1610 см^{-1} (для сопряженной двойной связи).

Экспериментальная часть

Этилбутилвинилэтинилкарбинол. Из 150 г (1,31 моля) этилбутилкетона и 200 мл винилацетилена в присутствии 100 г порошкообразного едкого кали известным способом [5] получено 180 г (81,2%) этилбутилвинилэтинилкарбинола. Т. кип. 78—79° при 3 мм; n_D^{20} 1,4770; d_4^{20} 0,8616; MR_D найдено 54,43, вычислено 52,35. Найдено %: С 79,00; Н 10,55. $\text{C}_{11}\text{H}_{18}\text{O}$. Вычислено %: С 79,52; Н 10,84.

Этилбутилвинилэтинилхлорметан. Известным способом [6] из 40 г этилбутилвинилэтинилкарбинола и 10 г газообразного хлористого водорода получено 32 г (72,5%) этилбутилвинилэтинилхлорметана. Т. кип. 88—89° при 12 мм; n_D^{20} 1,4840; d_4^{20} 0,9322; MR_D найдено 54,28, вычислено 55,40. Найдено %: Cl 18,93. $\text{C}_{11}\text{H}_{17}\text{Cl}$. Вычислено %: Cl 19,24.

Метил-трет-бутилвинилэтинилхлорметан. Из 70 г метил-трет-бутилвинилэтинилкарбинола [7] и 18 г газообразного хлористого водорода аналогично получено 60 г (75,8%) метил-трет-бутилвинилэтинилхлорметана. Т. кип. 73—74° при 15 мм; n_D^{20} 1,4880; d_4^{20} 0,9798; MR_D найдено 50,12, вычислено 50,78. Найдено %: Cl 19,83. $\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{Cl}$. Вычислено %: Cl 20,08.

Диалкилвинилацетиленовые бромиды (I, X=Br). Известным способом [2] из 0,2 моля диалкилвинилацетиленового карбинола, 2 г сухого пиридина и 0,1 моля трехбромистого фосфора при 2° получены диалкилвинилацетиленовые бромиды (I), константы которых приведены в таблице 1.

Таблица 1

R ₁	R ₂	Выход, %	Т. кип., °C/мм	Молекулярная формула	n _D ²⁰	d ₄ ²⁰	MR _D		Br, %	
							найдено	вычислено	найдено	вычислено
CH ₃	C ₂ H ₅	45,9	68—69/10	C ₉ H ₁₃ Br	1,5050	1,2054	49,46	49,06	39,43	39,80
CH ₃	C ₄ H ₉	45,1	70—72/5	C ₁₀ H ₁₅ Br	1,5100	1,1816	54,42	53,68	36,64	37,21
CH ₃	(CH ₃) ₂ C	43,5	68—69/8	C ₁₀ H ₁₅ Br	1,5140	1,1816	54,78	53,68	36,42	37,21
C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	39,1	79—80/13	C ₉ H ₁₃ Br	1,5160	1,1927	50,90	49,06	39,22	39,80
C ₂ H ₅	C ₄ H ₉	31,8	77—78/3	C ₁₁ H ₁₇ Br	1,5030	1,1425	59,25	58,29	34,31	34,94

Синтез кумуленовых аминов (II). Смесь 0,1 моля свежеперегнанного галогенида и 0,3 моля диметил- или диэтиламина в присутствии 0,1 моля воды в запаянной ампуле оставлялась при комнатной температуре в течение 5—7 дней. После удаления непрореагировавшего амина остаток подкислялся соляной кислотой так, чтобы температура реакционной смеси не превышала 30°. Непрореагировавший хлорид (бромид) экстрагировался эфиром. Водный раствор органических оснований нейтрализовался поташом, экстрагировался эфиром, высушивался сульфатом магния и после отгонки эфира остаток разгонялся в вакууме. Из соответствующих хлоридов и бромидов получены одни и те же 1-диалкиламино-5,5-диалкил-2,3,4-пентатриены (II). Константы полученных аминокумуленов приведены в таблице 2.

Гидрирование 1-диметиламино-5,5-диалкил-2,3,4-пентатриенов. Маленький металлический баллон, содержащий 0,1 моля 1-диметиламино-5,5-диалкил-2,3,4-пентатриена и 20 мл абсолютного этилового спирта в присутствии смеси катализатора никеля с окисью платины (в соотношениях 2:1), заполнялся водородом под давлением в 15 атм. Содержимое баллона встряхивалось 5 дней при комнатной температуре. После обычной обработки выделены насыщенные амины (III), константы которых приведены в таблице 3.

Гидратация 1-диметиламино-5,5-диалкил-2,3,4-пентатриенов. Смесь 0,1 моля 1-диметиламино-5,5-диалкил-2,3,4-пентатриена, 50 мл 10%-ной серной кислоты и 2 г сернокислой ртути нагревалась при 60° в течение 8 часов, затем нейтрализовывалась поташом, экстрагировалась эфиром, высушивалась сульфатом магния и после отгонки эфира остаток разгонялся в вакууме. Константы полученных аминокетонов (IV) приведены в таблице 4.

R_1	R_2	R_3	Выход, %	Т. кип., °C/мм
CH_3	C_2H_7	CH_3	78,0	75—76/3
CH_3	$(CH_3)_3C$	CH_3	61,0	83—84/5
C_2H_5	C_4H_9	CH_3	70,0	103—104/5
CH_3	C_3H_7	C_2H_5	30,4	100/4
CH_3	$(CH_3)_3C$	C_2H_5	25,5	105—106/4
C_2H_5	C_4H_9	C_2H_5	38,4	123—124/5

Таблица 2

Молекулярная формула	n_D^{20}	d_4^{20}	MR_D		N, %		Т. кип. пикрата. °C
			найдено	вычислено	найдено	вычислено	
$C_{11}H_{19}N$	1,5200	0,8806	56,96	55,54	8,16	8,48	94—95
$C_{12}H_{21}N$	1,5150	0,8771	61,54	60,15	7,58	7,82	—
$C_{13}H_{23}N$	1,5100	0,8700	66,35	64,77	7,13	7,25	—
$C_{13}H_{23}N$	1,4990	0,8717	65,01	64,77	6,94	7,25	—
$C_{14}H_{25}N$	1,5000	0,8678	70,16	69,39	6,24	6,76	—
$C_{15}H_{27}N$	1,5010	0,8656	75,22	74,00	6,30	6,63	—

Таблица 3

R ₁	R ₂	Выход, %	Т. кип., °С/мм	Молекулярная формула	n _D ²⁰	d ₄ ²⁰	MR _D		N, %	
							найдено	вычислено	найдено	вычислено
CH ₃	C ₃ H ₇	69,3	194—195/670	C ₁₁ H ₂₃ N	1,4310	0,7874	56,22	56,94	7,93	8,18
CH ₃	(CH ₃) ₃ C	70,0	207—208/670	C ₁₂ H ₂₇ N	1,4400	0,7993	61,00	61,56	7,31	7,56
C ₂ H ₅	C ₄ H ₉	75,6	227—228/670	C ₁₃ H ₂₉ N	1,4390	0,7962	65,74	66,17	6,98	7,03

Таблица 4

R ₁	R ₂	Выход, %	Т. кип., °С/мм	Молекулярная формула	n _D ²⁰	d ₄ ²⁰	MR _D		N, %	
							найдено	вычислено	найдено	вычислено
CH ₃	C ₃ H ₇	70,5	95—96/5	C ₁₁ H ₂₁ ON	1,4665	0,9121	55,62	56,48	7,51	7,64
CH ₃	(CH ₃) ₃ C	69,0	99—100/5	C ₁₂ H ₂₃ ON	1,4720	0,9310	59,25	61,10	7,03	7,11
C ₂ H ₅	C ₄ H ₉	68,6	116—117/5	C ₁₃ H ₂₅ ON	1,4690	0,9152	64,13	65,72	6,87	6,63

ՎԻՆԻԼԱՑԵՏԻԼԵՆԻ ՔԻՄԻԱ

LXXXV. ԱՑԵՏԻԼԵՆ-ԱԼԵՆ-ԿՈՒՄՈՒԼԵՆԱՑԻՆ ՎԵՐԱԽՄՐԱՎՈՐՈՒՄ ՎԻՆԻԼԱՑԵՏԻԼԵՆԱՑԻՆ ՀԱԼՈԳԵՆԻՐԵՐՈՒՄ ՀԱԼՈԳԵՆԸ ԱՄԵՆՈՎ ՏԵՂԱԿԱԼԵԼԻՄ

Ս. Հ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, Մ. Ռ. ԲԱՐԽՈՒԴԱՐՅԱՆ Լ Ե. Հ. ԲԱԴԱՆՅԱՆ

Ա մ փ ն փ ու լ մ

Ցույց է տրվել, որ վինիլացետիլենային հալոգենիդներում հալոգենի ամիններով տեղակալման ռեակցիան ընթանում է վերախմբավորմամբ, որը բերում է կոմուլինային ամինների առաջացմանը: Ուսումնասիրվել են վերջիններիս հիդրման և հիդրատացման ռեակցիաները:

ЛИТЕРАТУРА

- С. А. Вартамян, Ш. О. Баданян, Изв. АН АрмССР, ХН, 15, 307 (1962); С. А. Вартамян, Ш. О. Баданян, А. В. Мушегян, Изв. АН АрмССР, ХН, 16, 547 (1963); 17, 505 (1964). С. А. Вартамян, Ш. О. Баданян, А. В. Мушегян, Арм. хим. ж., 19, 864 (1966).

2. С. А. Вартамян, М. Р. Бархударян, Ш. О. Баданян, ЖОрХ, 3, 1967 (1967): Арм. хим., ж., 20, 819 (1967).
3. С. А. Вартамян, М. Р. Бархударян, Ш. О. Баданян, Арм. хим. ж., 21, 14 (1968).
4. W. M. Schubert, T. H. Litticoet, W. A. Lanke, J. Am. Chem. Soc., 76, 1929 (1954); P. Montijn, J. H. van Boort, L. Brandsma, J. F. Arens, Rec. trav. chim., 86, 115, 129 (1967).
5. С. А. Вартамян, Г. А. Чухаджян, В. Н. Жамагорцян, Изв. АН АрмССР, ХН, 12, 107 (1959).
6. И. Н. Назаров, Я. М. Якбиков, Изв. АН СССР, ОХН, 1942, 66.
7. И. Н. Назаров, Изв. АН СССР, ОХН, 1938, 683.